

VÝSLEDKY

I. OPAKOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ LÁTKY, VÝROKY

1. a) $(4; 6]$ b) $(-6; -3) \cup (\frac{-1-\sqrt{13}}{2}, \frac{-1+\sqrt{13}}{2})$ c) $[1; 2]$ d) $\frac{4}{3}$
 e) $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} ((-\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{\pi}{6} + 2k\pi) \cup (\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi))$
 f) $(-\infty, 3) \cup (3, 2 + \sqrt{6}]$ g) $[\frac{1}{2}, \infty)$
 h) $\{0, \frac{2}{3}\}$ i) $(-10; -7) \cup (10; \infty)$ j) $\{7, \frac{\sqrt{7}}{7}\}$
4. a) $c > 1/4 \implies x \in \mathbb{R}; c \in (0, 1/4] \implies x \in (-\infty, \frac{-1-\sqrt{1-4c}}{2c}) \cup (\frac{-1+\sqrt{1-4c}}{2c}, \infty); c = 0 \implies x > -1;$
 $c < 0 \implies x \in (\frac{-1+\sqrt{1-4c}}{2c}, \frac{-1-\sqrt{1-4c}}{2c})$
 b) $c > 0 \implies x \in \emptyset; c = 0 \implies x \in \mathbb{R}; c < 0 \implies x < \log(-1/c)$
 c) $c < 0 \implies x \in \mathbb{R}; c = 0 \implies x \in \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\};$
 $c \in (0, 1) \implies x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (-\arccos c + k\pi, \arccos c + k\pi); c \geq 1 \implies x \in \emptyset$
 d) $x \in (-e^{\pi/2-c}, e^{-\pi/2-c}) \cup (e^{-\pi/2-c}, e^{\pi/2-c})$
5. a) $\forall m \in M \forall z \in Z : S(m, z) \implies L_1(m, z),$
 b) $\forall z \in Z \exists m \in M : L_1(m, z),$
 c) $\forall z \in Z \forall m_1 \in M \forall m_2 \in M : S(m_1, z) \& S(m_2, z) \implies m_1 = m_2,$
 d) $\forall m \in M \forall z_1 \in Z \forall z_2 \in Z : S(m, z_1) \& S(m, z_2) \implies z_1 = z_2$ (NE);
 e) $\exists z \in Z \exists m \in M : S(m, z);$
 f) $\exists m \in M \exists z \in Z : S(m, z)$ (ANO);
 g) Existuje nevěrná manželka (aspoň jedna):
 $\exists z \in Z \exists m_1 \in M \exists m_2 \in M (m_1 \neq m_2 \& S(m_1, z) \& L_2(m_2, z)),$
 existují nevěrné manželky (aspoň dvě):
 $\exists z_1 \in Z \exists z_2 \in Z \exists m_1 \in M \exists m_2 \in M \exists m_3 \in M \exists m_4 \in M$
 $(z_1 \neq z_2 \& m_1 \neq m_2 \& m_3 \neq m_4 \& S(m_1, z_1) \& L_2(m_2, z_1) \& S(m_3, z_2) \& L_2(m_4, z_2)).$
 h) Existuje svobodný muž.
 i) Existuje žena, která žádnému muži neopětuje lásku.
 j) Existuje žena, jíž žádný muž neopětuje lásku.
 k) Každá žena, která někoho miluje, nemiluje některého muže, který miluje ji.
6. a) (i), (ii), (iii) neplatí b) (i), (ii) platí; (iii) neplatí c) (i) platí; (ii), (iii) neplatí
 d) (i), (ii), (iii) platí
7. e) Platí, negace $\exists x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} \exists z \in \mathbb{N} (z > x \& y \geq z);$
 f) Platí, negace $\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \mathbb{N} \exists z \in \mathbb{N} (z > x \& y \geq z);$
 g) Neplatí, negace $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} \exists z \in \mathbb{N} (z > x \& y \geq z);$
 h) Platí, negace $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} \exists z \in \mathbb{N} (z < x \& y \leq z);$
 i) Platí, negace $\exists x \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists y \in \mathbb{R} (|y - x| < \delta \& y \geq x + \frac{\varepsilon}{3}).$
8. a) $f(y) = 15$ pro všechna $y \in (2, 12);$
 b) Funkce f je na konstantní na $\mathbb{R}.$

II. DŮKAZOVÁ TECHNIKA, OPERACE S MNOŽINAMI, BINÁRNÍ RELACE A ZOBRAZENÍ

3. a) ano b) ano c) ne d) ano e) ne
7. Δ je reflexivní, symetrická; není tranzitivní, antisymetrická, slabě antisymetrická
8. (i) platí, (ii) neplatí, (iii) neplatí, (iv) neplatí
9. a) $D(f) = (-\infty, -1] \cup [1, \infty), R(f) = (-\infty, -1] \cup (0, 1]$
 b) $D(g) = [0, \infty) \setminus \{16\}, R(g) = (-\infty, -2) \cup [0, \infty)$

III. AXIOMY TĚLES, USPOŘÁDANÝCH TĚLES, SUPREMA, INFIMA

3. a) $\sup A = 0, \min A = -1$; b) $\max B = \frac{3}{2}, \min B = 0$; c) C_1 nemá supremum ani infimum (není zdola, ani shora omezená), C_2 není shora omezená, $\min C_2 = 3, \max C_3 = 0, C_3$ není zdola omezená; d) $\max D_1 = \frac{5}{6}, \inf D_1 = 0, D_2$ není shora omezená, $\inf D_2 = 0$; e) E není shora omezená, $\inf E = 0$; f) F není shora omezená, $\inf F = 0$.

IV. LIMITY POSLOUPNOSTÍ

1. a) rostoucí, zdola omezená, shora neomezená b) klesající, zdola omezená, shora omezená c) není monotónní, zdola omezená, zhora omezená
 2. a) 0 b) 0 c) 0 d) 0
 3. a) 0 b) 2 c) 2 d) 0 e) 0 f) Nemá limitu g) $\frac{1}{2}$ h) 1 i) $\frac{81}{2^{13}-1}$ j) $\frac{1}{3}$ k) $\frac{1}{2}$ l) 0 m) $\frac{1}{2}$ n) 0 o) 0 p) 1 q) 0
 4. a) 0 b) 2 c) 0 d) $-\frac{4}{5}$ e) 5 f) $\frac{1}{3}$ g) $\frac{\pi}{2}$ h) $\sqrt{1+\sqrt{2}}$ i) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ j) $\frac{3}{2}$
 5. a) $\frac{1}{k+1}$ b) $\frac{2^k}{k+1}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 0
 6. a) e^3 b) $\frac{1}{e}$ c) 0
 7. a) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = e, \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -e$ b) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 3, \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$
 c) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 2, \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$
 8. a) neexistuje b) ∞ c) 4 d) 0 e) $-\infty$ f) ∞ g) 1
 9. a) $-\frac{7^7}{3^6}$ b) 30 c) 2 d) $-54 \cdot 5^{10} \cdot \sqrt[6]{21}$ e) -5^{35} f) $\frac{11}{9}$

V. ŘADY

1. a) Konverguje (K) b) K c) K pro $x < 0$, Diverguje (D) pro $x \geq 0$ d) K pro $x \leq 0$, D pro $x > 0$
 e) K f) D g) K h) K i) D j) K k) K l) D
 2. a) D b) K c) D d) D
 3. a) ne AK b) AK c) ne AK
 4. a) K, ale ne absolutně b) AK c) D d) K, ale ne absolutně e) D f) AK g) K, ale ne absolutně
 5. a) D b) K, ale ne absolutně c) K, ale ne absolutně d) K, ale ne absolutně e) AK

VI. LIMITA FUNKCÍ

1. a) $+\infty$ b) $\frac{3^{10}}{2^{10}}$ c) ∞ d) 0
 2. a) 0 pro $n < 1, 1$ pro $n = 1, \text{ pro } n > 1$ sudé limita neexistuje a pro $n > 1$ liché je limita ∞ b) 0 pro $n < 1, -\frac{1}{12}$ pro $n = 1, \text{ pro } n > 1$ sudé limita neexistuje a pro $n > 1$ liché je limita $-\infty$ c) $\frac{12}{5}$ d) $-\frac{1}{16}$
 3. a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) 1 e) $\frac{3}{2}$ f) neexistuje g) $\frac{1}{2}$ h) 0 i) e^3 j) e k) 1 l) $-\frac{1}{12}$ m) $\frac{1}{4}$
 n) $\frac{4}{3}$ o) e^{-1} p) $\frac{2}{3}$ q) e^2
 4. a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ c) 0 d) 1 e) $\frac{3}{2}$ f) $\cos a$ g) 0 h) $\sqrt{2}$ i) neexistuje j) $3 \log 2$ k) 1 l) -1 m) $\frac{1}{2}$
 n) 1 o) 2
 5. a) $\sqrt{2}$ b) $\frac{1}{3 \log 3}$ c) limita neexistuje (zprava $\sqrt{2}$, zleva $-\sqrt{2}$) d) $\frac{9}{2}$ e) $\frac{3}{4}$ f) -6 g) \sqrt{e}
 6. a) $-\frac{1}{5}$ b) 2
 7. a) AK b) D c) K, ale ne absolutně d) AK e) K
 8. a) -1 b) $\sqrt[3]{6}$ c) $\sqrt{2}$ d) 1

VII. SPOJITOSTI A DERIVACE

1. a) f je definována a spojitá na \mathbb{R} , $f'(x) = 5$ pro $x \in (1, 4)$; $f'(x) = 2x$ pro $x \in (-\infty, 1) \cup (4, \infty)$; $f'_+(1) = f'_-(4) = 5, f'_l(1) = 2, f'_r(4) = 8$.
 b) $D_f = \mathbb{R}$, f je spojitá v každém bodě $\mathbb{R} \setminus (\mathbb{Z} \setminus \{3, 3\})$, v bodech $\mathbb{Z} \setminus \{3, 3\}$ je spojitá zprava a nespojitá zleva. $f'(x) = \frac{2}{3}x[x(x^2 - 9)^{-2/3}]$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$; $f'(-3) = f'(3) = \infty$; pro $k \in \mathbb{Z} \setminus \{-3, 3\}$ je $f'_+(k) = \frac{2}{3}k^2(k^2 - 9)^{-2/3}$
 a) $f'_-(k) = \begin{cases} \infty, & |k| > 3, \\ -\infty, & |k| < 3. \end{cases}$
 c) $D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, f je spojitá v každém bodě D_f . $f'(x) = -2 \sin 2x \cdot (\operatorname{tg} x - 1) \cdot \operatorname{sgn}(\cos 2x) +$

$|\cos 2x| \frac{1}{\cos^2 x}$ pro $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (-\frac{\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{4} + k\pi) \cup (-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi) \cup (\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$; $f'(\frac{\pi}{4} + k\pi) = 0$, $f'_+(\frac{\pi}{4} + k\pi) = -4$, $f'_-(\frac{\pi}{4} + k\pi) = 4$ pro $k \in \mathbb{Z}$.

$$d) f'(x) = \begin{cases} 2x(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}) + \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

e) $D_f = \mathbb{R}$, f spojitá v každém bodě $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, v bodech $\{2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ je spojitá zprava a nespojitá zleva, v bodech $\{(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ je spojitá zleva a nespojitá zprava. Pro $k \in \mathbb{Z}$ máme: $f'(x) = 0$ pro $x \in (2k\pi, (2k+1)\pi)$; $f'(x) = \sin x$ pro $x \in ((2k-1)\pi, 2k\pi)$; $f'_+(2k\pi) = f'_-((2k+1)\pi) = 0$; $f'_-(2k\pi) = f'_+((2k+1)\pi) = +\infty$.

f) f je definována a spojitá na \mathbb{R} , $f'(x) = (e + |x|)^x \cdot (\log(e + |x|) + \frac{|x|}{e+|x|})$ pro $x \in \mathbb{R}$ (pozor, $f'(0) = 1$ je potřeba spočítat zvlášť)

2. a) f je definována a spojitá na $(0, \infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, nelze spojitě rozšířit. $f'(x) = (\frac{1}{x})^{\frac{1}{x}+2} \cdot (\log x - 1)$ pro $x > 0$.

b) f je definována a spojitá na $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi)$. $\lim_{x \rightarrow 2k\pi^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi^-} f(x) = +\infty$, lze tedy spojitě rozšířit na $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi)$. $f'(x) = (\sin x)^{\cos x} \cdot (\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \log \sin x)$ pro $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi)$. Po dodefinování je $f'_+(2k\pi) = 1$.

c) f je definována a spojitá na $(-1, 1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$. $f'(x) = -\frac{1}{\arccos x \cdot \sqrt{1-x^2}}$ pro $x \in (-1, 1)$, $f'_+(-1) = -\infty$.

d) f je definována a spojitá na $(0, +\infty)$. $f'(x) = \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}}$ pro $x > 0$, $f'_+(0) = 0$.

e) f je definována a spojitá na \mathbb{R} , $f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^{2x} + 1}$ pro $x \in \mathbb{R}$.

VIII. APLIKACE DERIVACÍ

1. $\max f(x) = f(2) = 4$, $\min f(x) = f(-3) = -16$

2. a) maximum neexistuje (ani lokální), globální minimum v bodě $\frac{7}{5}$ b) globální maximum v bodě 1, globální minimum v bodě 0, lokální maximum v bodě -1

5. a), b), c) : viz. výsledky zkouškové písemky z roku 2008/2009, varianty E, D, B

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kalenda/pis-fsv/0809/pis.htm>

d), e) : viz. sepsané úlohy od Petra Pošty (sepsáno v roce 2010/11)

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pposta/priklady/PrubFR.pdf>