


## Odchyly 2 podprostorů II




def.:

- odchylka nenulových vektorů  $\vec{u}, \vec{v} \in V$  — číslo  $\alpha \in \langle 0, \pi \rangle$ ;

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

- odchylka netriv. podprostorů  $\alpha, \beta \subset E_n$  — odchylka jejich zaměření

$$\varphi(\alpha, \beta) := \varphi(V_\alpha, V_\beta)$$



$\bigvee V_1, V_k \dots$  vektorové podprostory  $V_n$

$$V_1 = [\vec{a}]$$

$\Rightarrow \exists! \vec{a}' \in V_k; \vec{a} - \vec{a}'$  je kolmý na každý vektor  $\vec{x} \in V_k$   
a navíc:  
 $\vec{a} \cdot \vec{a}' \geq 0$

Pozn.: vlastně  $\exists!$  Oř projekce  $\vec{a}$  do  $V_k$

důk.: •  $\vec{a} \in V_k \Rightarrow \vec{a}' = \vec{a}$

•  $\vec{a} \notin V_k$  Gram-Schmidt: ortogonalizujeme  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k, \vec{a}$  (jsou LNZ)

$$\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \overset{(1)}{\vec{u}_k}, \vec{u}_{k+1} \quad \left( [\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k] = [\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k] \right)$$

$$\vec{a} = a_1 \vec{u}_1 + a_2 \vec{u}_2 + \dots + a_k \vec{u}_k + a_{k+1} \vec{u}_{k+1}$$

$$\vec{a}' = a'_1 \vec{u}_1 + \dots + a'_k \vec{u}_k$$

$$\vec{a} - \vec{a}' = (a_1 - a'_1) \vec{u}_1 + \dots + (a_k - a'_k) \vec{u}_k + a_{k+1} \vec{u}_{k+1} \underbrace{\perp \vec{x}}_{\text{stáčí ověřit na bázi } V_k, \text{ t.j. na } \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}} \quad \forall x \in V_k$$

t.j. pořadujeme:  
 $\underbrace{\vec{a} - \vec{a}'}_{\perp \vec{u}_i} \perp \vec{u}_i \quad i=1, 2, \dots, k$

$$0 = (\vec{a} - \vec{a}') \cdot \vec{u}_i = (a_i - a'_i) \cdot \underbrace{\vec{u}_i \cdot \vec{u}_i}_{\|\vec{u}_i\|^2 \neq 0} \quad \Rightarrow a_i - a'_i = 0$$

$$\text{t.j. } \vec{a}' = a_1 \vec{u}_1 + \dots + a_k \vec{u}_k$$

nalezen, a to jediný

- ověřme ještě:  $\vec{a} \cdot \vec{a}' \geq 0$

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \|\vec{u}_i\|^2 & i=j \end{cases}$$

$$(a_1 \vec{u}_1 + \dots + a_k \vec{u}_k + a_{k+1} \vec{u}_{k+1}) \cdot (a_1 \vec{u}_1 + \dots + a_k \vec{u}_k) =$$


$$= a_1^2 \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1 + \dots + a_k^2 \vec{u}_k \cdot \vec{u}_k *$$

$$= a_1^2 \|\vec{u}_1\|^2 + \dots + a_k^2 \|\vec{u}_k\|^2 \geq 0$$

□

### Kolmost podprostorů

- $W \subset V_n \Rightarrow$  množina  $\{\vec{x} \in V_n ; \vec{x} \perp \vec{w} \forall \vec{w} \in W\}$  naz. ortogonální doplněk podpr.  $W$  ve  $V_n$



$U \cap W$  je vekt. přímka

$$U \perp W \checkmark$$

$$\vec{u} \in U \cap W$$

$$\begin{matrix} \vec{u} \in U \\ \vec{u} \in W \end{matrix} \not\Rightarrow \vec{u} \perp \vec{u}$$

def.  $U, W \subset V_n$

netriv.

Jeli  $U^\perp \subseteq W$  nebo  $W \subseteq U^\perp$ , pak  $U, W$  naz. <sup>0</sup> říkáme, že jsou ~~kolmé~~ navzájem kolmé (ve  $V_n$ )

píšeme  $U \perp W$  (nebo  $W \perp U$ ).

- ukažme, že nezáleží na pořadí  $U, W$   
není tedy třeba rozlišovat, zda je  $U$  kolmé na  $W$ ,  
nebo  $W$  kolmé na  $U$ .

$$U^\perp \subseteq W$$

||

$$W^\perp \subseteq U$$

$$W \subseteq U^\perp$$

||

$$U \subseteq W^\perp$$

(protože aplikaci  $\perp$  na inkluzi:

$$U^\perp \subseteq W / \perp$$

$$\underbrace{(U^\perp)^\perp}_{U} \supseteq W^\perp$$

- Pokud  $U^\perp = W$  (tj. od téhle plynne také, že  $W^\perp = U$ ), tak  
říkáme, že podpr.  $U, W$  jsou totálně kolmé.

- Def. odchylky 2 vekt. podprostorů obecně

$U, W$  netriv. vekt. podprostory  $(V_n, \cdot)$

Pak odchylkou podpr.  $U, W$ , ozn.  $\delta(U, W)$ , rozumíme:

$$1) U \cap W = \{\vec{0}\} \Rightarrow \text{def. } \delta(U, W) := \min \left\{ \delta([\vec{u}], [\vec{w}]) \mid \begin{array}{l} \vec{u} \in U \\ \vec{w} \in W \\ \vec{u}, \vec{w} \neq \vec{0} \end{array} \right\}$$

$$2) U \cap W \neq \{\vec{0}\} \Rightarrow \text{def. } \delta(U, W) := \delta \left( \underbrace{U \cap (U \cap W)^\perp}_{\text{jelí některý z nich} \xrightarrow{=} \{\vec{0}\}}, \underbrace{W \cap (U \cap W)^\perp}_{\text{klademe}} \right)$$

$\delta(U, W) := 0$

korektnost def. 2): ověřme, že  $\underbrace{[U \cap (U \cap W)^\perp]}_{(U \cap W)} \cap \underbrace{[W \cap (U \cap W)^\perp]}_{(U \cap W)} = \vec{0}$

$\xrightarrow{\text{ano, je:}} \vec{0}$