

# JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY: T-TEST, KOLMOGOROVŮV-SMIRNOVŮV TEST

27.11.2018

---

## ÚVODNÍ NASTAVENÍ.

- Z internetové stránky [www.karlin.mff.cuni.cz/~hudecova/education/](http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hudecova/education/) si stáhněte data **lq.txt** a můžete si stáhnout i zdrojový kód k dnešnímu cvičení **cviceni9.R**.
- Otevřete si program R Studio.
- Změňte si pracovní adresář pomocí **Session → Set working directory → Choose directory** nebo napište přímo  
`setwd("H:/nmsa331")`
- Vyčistěte si pracoviště od starých objektů, které zůstaly uloženy:  
`rm(list=ls())`
- Načtěte si data **Hosi.txt**. Pro jistotu se podívejte na prvních několik řádků (příkaz **head**) a ujistěte se, že se Vám data dobře načetla. Můžete zavolat i **summary**.
- Do proměnné **alpha** is uložte testovací hladinu 0.05, na které budeme provádět většinu dnešních testů.

## JEDNOVÝBĚROVÝ T-TEST

1. Opět se budeme zabývat porodní hmotností, ale tentokrát budeme pracovat pouze s (náhodným) podvýběrem o rozsahu  $n = 100$  pozorování.

```
set.seed(27112018);
hmot100 <- sample(Hosi$por.hmot, 100)
```

Abychom měli všichni stejný podvýběr, zvolili jsme si pevné nastavení generátoru pseudonáhodných čísel pomocí **set.seed**. Uložte si do **n** rozsah výběru **hmot100**.

2. Na [internetové stránce ČSÚ](#) se v zásadě uvádí, že je průměrná porodní hmotnost novorozených chlapců rovna 3,3 kg. Ověřte, zda jsou naše data v souladu s tímto tvrzením.

- (a) Zformulujte vhodný pravděpodobnostní model a pokuste se graficky posoudit, zda je vhodný pro naše data.  
(b) Zformulujte nulovou a alternativní hypotézu.  
(c) Proveďte test pomocí funkce **t.test**.

```
t.test(hmot100, mu=3300)
```

Společně si řekneme, co jednotlivé části výstupu znamenají.

- (d) Rozhodněte o zamítnutí/nezamítnutí nulové hypotézy. Zformulujte závěr.
3. Nyní si jednotlivé části z výstupu funkce **t.test** spočítáme „ručně“. Jak víme, testová statistika má tvar

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S_n}$$

a má za nulové hypotézy  $t_{n-1}$  rozdělení. Spočteme ji tedy následovně:

```
(tstat=sqrt(n)*(mean(hmot100)-3300)/sd(hmot100))
```

a klasickým způsobem testování bychom její absolutní hodnotu porovnali s kritickou hodnotou  $qt(1 - alpha/2, df=n-1)$

Jaký závěr dostáváme z tohoto porovnání?

My ale máme ve výstupu p-hodnotu, která nám udává pravděpodobnost, s jakou bychom za nulové hypotézy dostali ještě „méně příznivý“ výsledek než je hodnota naší testové statistiky. Spočítáme ji tedy takto:

```
2*(1-pt(abs(tstat), df=n-1))
```

Konečně, intervalový odhad  $\mu$  spočítáme

```
mean(hmot100)-qt(1 - alpha/2, df=n-1)/sqrt(n)*sd(hmot100)
mean(hmot100)+qt(1 - alpha/2, df=n-1)/sqrt(n)*sd(hmot100)
```

Vzpomeňte si na dualitu mezi intervalovým odhadem a testem hypotézy (viz přednáška).

4. Někdy se nám může hodit umět přistupovat k jednotlivým položkám výsledku funkce `t.test`.

```
tt=t.test(hmot100,mu=3300)
names(tt)
tt$stat
tt$p.val
```

Zkuste si takto nechat vypsat interval spolehlivosti pro  $\mu$  a podívejte se, jakou test uvažuje alternativu.

5. Nechejte si vypsat interval spolehlivosti s pravděpodobností pokrytí 0, 99. Ve funkci `t.test` nastavte `conf.level = 0.99`. Pouze na základě tohoto intervalu rozhodněte o zamítnutí/nezamítnutí nulové hypotézy na testovací hladině 0, 01.
6. Podobně jako v bodě 2. otestujte, zda je pravdivé tvrzení, že je střední porodní hmotnost chlapců nižší než 3,5 kg.
  - Zformulujte nulovou a alternativní hypotézu a řádně interpretujte výsledek.
  - Všimněte si, jaký intervalový odhad nám nyní R nabízí.
7. Jak bychom ručně spočítali p-hodnotu z 6?
8. Ve 3. jsme konstruovali interval spolehlivosti na základě t-rozdělení uvedené  $T$  statistiky. Jaké je její limitní rozdělení pro  $n \rightarrow \infty$ ? Spočtěte asymptotický intervalový odhad  $\mu$  zkonztruovaný na základě tohoto limitního rozdělení. Porovnejte oba intervaly. Který z nich je širší?
9. Spočítejte také p-hodnotu příslušného asymptotického testu. Jaký model zde stačí předpokládat? A na základě kterého rozdělení se doporučuje počítat p-hodnotu (resp. kritickou hodnotu)?
10. Doposud jsme k testování používali jenom část dat, a to proto, abychom mohli provést následující porovnání: Provedte ještě jednou testy z 2. a 6. pro celá data a porovnejte je s výsledkem pro náš podvýběr. Co pozorujeme? Co z toho vyplývá pro praxi?

## KOLMOGOROVŮV-SMIRNOVŮV TEST

10. Načtěte si data `Iq.txt`, která se týkají hodnot IQ a známek na ZŠ náhodně vybraných žáků. Prohlédněte si data a proměnné, které máme k dispozici.
11. Bude nás zajímat IQ žáků, proto si hodnoty uložte do proměnné `IQ` a do `n` si uložte rozsah výběru.

```
IQ = Iq$iq;
n = length(IQ)
```

Jakými popisnými statistikami byste popsali data? Jaké obrázky ilustrují rozdělení dat?

12. Na [wikipedii](#) se uvádí, že IQ má v populaci normální rozdělení se střední hodnotou 100 a směrodatnou odchylkou 15. Zajímá nás, zda naše data podporují nebo vyvracejí toto tvrzení.
  - (a) Jaký model předpokládáme pro naše data? Formulujte nulovou a alternativní hypotézu, kterou budeme testovat.
  - (b) Provedeme Kolmogorovův-Smirnovův test
 

```
ks.test(IQ, y="pnorm", mean=100, sd=15)
```
  - (c) Jaký je náš závěr?
13. Z přednášky víme, že testová statistika má tvar  $K_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|$ , ale pro výpočet se používá

$$K_n^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left( \frac{i}{n} - F_0(X_{(i)}) \right), \quad K_n^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left( F_0(X_{(i)}) - \frac{i-1}{n} \right), \quad K_n = \max(K_n^+, K_n^-).$$

Ověříme tedy, že R počítá opravdu tuto testovou statistiku:

```
F0 <- function(x) pnorm(x, mean=100, sd=15)
IQ.sorted=sort(IQ)
Knplus <- max((1:n)/n - F0(IQ.sorted))
Knminus <- max(F0(IQ.sorted) - (0:(n-1))/n)
(Kn <- max(Knplus, Knminus))
```

Za nulové hypotézy má  $\sqrt{n}K_n$  asymptoticky rozdělení s distribuční funkcí

$$G(y) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} e^{-2k^2 y^2}.$$

Pomocí konečné approximace této distribuční funkce můžeme p-hodnotu testu spočítat

```
G <- function(y){
  k <- 1:10000; # approximace nekonečné sumy
  1 - 2*sum((-1)^(k+1)*exp(-2*k^2*y^2))
}
1 - G(sqrt(n)*Kn)
```

Kdybychom chtěli znát kritickou hodnotu, tak vlastně hledáme  $c$  takové, že  $P(\sqrt{n}K_n > c) = \alpha$ , tj.  $G(c) = 1 - y$ . To musíme vyřešit numericky:

```
fce <- function(x) G(x) - (1 - alfa)
(krit <- uniroot(fce, c(0.1,10))$root)
sqrt(n)*Kn
```

14. Celou situaci si graficky znázorníme. Vzpomeňte si na odvození tzv. pásu spolehlivosti pro distribuční funkci, které jste měli na přednášce.

```
empir.df <- ecdf(IQ);
plot(empir.df, ylab="", main="Porovnani distribucnich funkci",do.points=F)

# pas spolehlivosti
xgrid <- seq(min(IQ)-10, max(IQ)+10, length=10000);
dolni.pas <- pmax(empir.df(xgrid)-krit/sqrt(n),0)
horni.pas <- pmin(empir.df(xgrid)+krit/sqrt(n),1)
polygon(c(xgrid, rev(xgrid)), c(horni.pas, rev(dolni.pas)), col = "gray90", border="gray70",lty=2)

plot(empir.df, verticals=FALSE, add=T, lwd=2,do.points=FALSE)
lines(xgrid, F0(xgrid), col="blue", lwd=2); # graf F_0

# Bod nejvetsiho rozdilu
k0 <- which.max(F0(IQ.sorted) - (0:(n-1))/n);
abline(v=IQ.sorted[k0], col="red");

legend("bottomright", col=c("black", "grey70", "blue"), lty=c(1,2,1),
       legend=c("empiricka d.f.", "pas spolehlivosti", "d.f. za nulove hypotezy"))
```

15. Připomeňte si, že Kolmogorovův-Smirnovův test předpokládá, že je  $F_0$  specifikovaná úplně, včetně hodnot všech parametrů. V případě, že tomu tak není (pokud bychom parametry odhadovali z dat), tak nám K-S test nedává správnou p-hodnotu (rozdělení testové statistiky za nulové hypotézy je jiné). Ukážeme si to na malé simulaci, kdy budeme generovat data z  $N(100, 15^2)$  a budeme provádět K-S test jednak se zadanými parametry a jednak s parametry odhadnutými z dat.

```
nopak <- 10000
pval.zname <- numeric(nopak)
pval.nezname <- numeric(nopak)
n<-100

for(i in 1:nopak){
  Y <- rnorm(n, mean=100, sd=15);
  pval.zname[i] <- ks.test(Y, y="pnorm", mean=100, sd=15)$p.value;
  pval.nezname[i] <- ks.test(Y, y="pnorm", mean=mean(Y), sd=sd(Y))$p.value;
}

mean(pval.zname <= 0.05)
mean(pval.nezname <= 0.05)
```

Poslední dvě hodnoty nám odhadují hladinu testu (měla by být 0,05). Vidíme, že dostáváme dvě velmi rozličné hodnoty. Co lze tedy říci o K-S testu v případě, že bychom ho špatně používali s parametry odhadnutými z dat?

16. Dalším důležitým předpokladem K-S testu je spojité rozdělení dat. Pomocí následující simulace se podíváme na skutečnou hladinu testu, použijeme-li nesprávně K-S test (s distribuční funkcí  $G$ ) pro test shody s binomickým rozdělením  $\text{Bi}(N, p)$  na základě dat o rozsahu  $n$ .

```

nopak=10000
pval=numeric(nopak)
n=100

N=10
p=1/3
F0=function(x) pbinom(x, size=N, prob=p)

set.seed(123)
for(i in 1:nopak){
  x = rbinom(n,size=N,prob=p)
  xi=unique(c(x,0:N))
  Kn=max(abs(ecdf(x)(xi)-F0(xi)))
  pval[i]=1-G(sqrt(n)*Kn)
}
mean(pval<=0.05)

```

- Co lze na základě předchozí simulace říci o K-S testu, použijeme-li jej pro  $F_0$  s diskrétním rozdělením?
  - Zkuste v předchozí simulaci zvýšit  $N$  postupně na 100 a 2000 a poté naopak snížit na 5 a 1. Co sledujeme?
  - Zamyslete se, jaké je rozdělení testové statistiky  $\sqrt{n}K_n$  pro data s alternativním rozdělením pro případ, kdy  $F_0$  odpovídá alternativnímu rozdělení s parametrem  $p$ .
  - Zkuste v předchozí simulaci počítat p-hodnotu pomocí funkce `ks.test`:
- ```
pval[i]=ks.test(x,pbinom,size=N,prob=p)$p.val}
```
- Dostáváme stejný výsledek?

## SIMULACE

16. Provedeme simulace z rovnoměrného a exponenciálního rozdělení a budeme zkoumat skutečnou hladinu testu při použití asymptotického testu (tj. při použití t-testu na nenormální data).

```

n=100
opak=1000
p.rovn=numeric(opak)
p.exp=numeric(opak)

for(i in 1:opak){
  x1=runif(n)

```

```

p.rovn[i]=t.test(x1,mu=1/2)$p.val

x2=rexp(n,rate=1)
p.exp[i]=t.test(x2,mu=1)$p.val
}

mean(p.rovn<=0.05)
mean(p.exp<=0.05)

```

Zkuste změnit počet pozorování  $n$  (zmenšit a zvětšit). Pro jaké  $n$  je rozumné použít asymptotický test?

17. Podobné simulace provedeme za alternativy a budeme sledovat sílu testu.

```

n=100
opak=1000
p.rovn=numeric(opak)
p.exp=numeric(opak)

for(i in 1:opak){
  x1=runif(n,0,1.2)
  p.rovn[i]=t.test(x1,mu=1/2)$p.val

  x2=rexp(n,rate=1.2)
  p.exp[i]=t.test(x2,mu=1)$p.val
}

mean(p.rovn<=0.05)
mean(p.exp<=0.05)

```

Vyzkoušejte měnit parametry rozdělení a sledovat, jak se mění síla, pokud se od nulové hypotézy vzdalujeme. Podobně, nechejte parametry rozdělení fixní a sledujte, jak se mění síla, pokud zvyšujeme počet pozorování. Učiňte nějaký obecný závěr z tohoto zkoumání.

## SAMOSTATNÁ PRÁCE

1. Po dnešním cvičená byste měli umět odpovědět na následující otázky:
  - Můžeme použít Kolmogorův-Smirnovův test na otestování, zda se hmotnost chlapců řídí normálním rozdělením?
  - Můžeme použít Kolmogorův-Smirnovův test k otestování, zda se věk matky řídí Gama rozdělením s parametry  $p = 25$  a  $a = 1$ ?
  - Můžeme použít Kolmogorův-Smirnovův test k otestování, zda se počet studentů, kteří skutečně dorazí na cvičení z Matematické statistiky, řídí binomickým rozdělením s parametry  $n = 20$  a  $p = 0.9$ ?
2. Lze na základě dat uvedených v souboru `lq.txt` tvrdit, že průměrná známka žáků v sedmé třídě je horší než 1,5?

- Jaký model lze předpokládat pro tato data? Ověřte vhodným obrázkem.
  - Zformulujte nulovou a alternativní hypotézu.
  - Proveďte test a interpretujte výsledek.
3. Na přednášce jste kromě pásu spolehlivosti uvažovali i interval spolehlivosti pro  $F(x)$  pro dané pevné  $x$ . Zkuste si vytvořit podobný obrázek jako jsme měli ve 14, ale kromě pásu spolehlivosti vykreslete i intervaly spolehlivosti. Který pás je širší? Proč?