

## A.1 Topologické prostory a základní topologické pojmy

**Definice.** **Topologickým prostorem** rozumíme dvojici  $(X, \mathcal{T})$ , kde  $X$  je množina a  $\mathcal{T}$  je nějaký systém podmnožin množiny  $X$ , který má následující vlastnosti:

- (a)  $\emptyset \in \mathcal{T}$ ,  $X \in \mathcal{T}$ .
- (b) Je-li  $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$  libovolná podmnožina, pak  $\bigcup \mathcal{A} \in \mathcal{T}$ .
- (c) Pro každé dvě množiny  $U, V \in \mathcal{T}$  platí  $U \cap V \in \mathcal{T}$ .

Systém  $\mathcal{T}$  s těmito vlastnostmi nazýváme **topologií** na  $X$ . Místo  $(X, \mathcal{T})$  často píšeme jen  $X$  (víme-li, jakou topologii uvažujeme).

**Definice.** Nechť  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor.

- Množina  $A \subset X$  se nazývá **otevřená v**  $(X, \mathcal{T})$  (nebo též  **$\mathcal{T}$ -otevřená**, případně krátce **otevřená**), pokud  $A \in \mathcal{T}$ .
- Nechť  $A \subset X$  a  $x \in A$ . Bod  $x$  se nazývá **vnitřním bodem** množiny  $A$ , pokud existuje otevřená množina  $B$ , pro kterou platí  $x \in B \subset A$ .
- **Vnitřkem** množiny  $A \subset X$  nazýváme množinu všech jejích vnitřních bodů. Vnitřek  $A$  značíme  $\text{Int } A$ , případně podrobněji  $\text{Int}_{\mathcal{T}} A$ .
- Množina  $A \subset X$  se nazývá **okolím bodu**  $x \in X$ , pokud je  $x$  vnitřním bodem množiny  $A$ .
- Nechť  $A \subset X$  a  $x \in X$ . Bod  $x$  se nazývá **hraničním bodem** množiny  $A$ , pokud pro každé okolí  $U$  bodu  $x$  platí  $U \cap A \neq \emptyset$  a zároveň  $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ .
- **Hranicí** množiny  $A \subset X$  nazýváme množinu všech jejích hraničních bodů. Hranici  $A$  značíme  $\partial A$ , případně podrobněji  $\partial_{\mathcal{T}} A$ . (Někdy se hranice značí  $H(A)$  nebo též  $\text{bd } A$ .)
- Množina  $A \subset X$  se nazývá **uzavřená**, pokud obsahuje všechny své hraniční body, tj. pokud  $\partial A \subset A$ .
- **Uzávěrem** množiny  $A \subset X$  rozumíme množinu  $A \cup \partial A$ . Uzávěr množiny  $A$  značíme  $\overline{A}$ , případně  $\overline{A}^{\mathcal{T}}$ . (Někdy se uzávěr množiny  $A$  značí také  $\text{cl } A$ , případně  $\text{cl}_{\mathcal{T}} A$  nebo  $\mathcal{T} - \text{cl } A$ .)

**Tvrzení 1.** Nechť  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor a  $A \subset X$ .

- (i) Vnitřek množiny  $A$  je největší otevřená množina obsažená v  $A$ .
- (ii) Množina  $A$  je uzavřená, právě když  $X \setminus A$  je otevřená.
- (iii) Uzávěr množiny  $A$  je nejmenší uzavřená množina obsahující  $A$ .
- (iv) Nechť  $x \in X$ . Pak  $x \in \overline{A}$ , právě když pro každé okolí  $U$  bodu  $x$  platí  $U \cap A \neq \emptyset$ .

**Tvrzení 2** (vlastnosti uzavřených množin). Nechť  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor.

- (a)  $\emptyset$  a  $X$  jsou uzavřené množiny.
- (b) Je-li  $\mathcal{A}$  libovolný systém uzavřených podmnožin  $X$ , pak je  $\bigcap \mathcal{A}$  uzavřená množina.
- (c) Pro každé dvě množiny uzavřené množiny  $C, D \subset X$  je  $C \cup D$  uzavřená množina.

**Definice.** Nechť  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor a  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ .

- $\mathcal{B}$  se nazývá **bází topologie**  $\mathcal{T}$ , pokud pro každou  $U \in \mathcal{T}$  a každé  $x \in U$  existuje  $G \in \mathcal{B}$  splňující  $x \in G \subset U$ .
- $\mathcal{B}$  se nazývá **subbází topologie**  $\mathcal{T}$ , pokud pro každou  $U \in \mathcal{T}$  a každé  $x \in U$  existují  $G_1, \dots, G_k \in \mathcal{B}$  splňující  $x \in G_1 \cap \dots \cap G_k \subset U$ .

**Poznámka.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor a  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ .

- $\mathcal{B}$  je bázi  $\mathcal{T}$ , právě když pro každé  $U \in \mathcal{T}$  existuje  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$  splňující  $\bigcup \mathcal{A} = U$ .
- $\mathcal{B}$  je subbázi  $\mathcal{T}$ , právě když systém všech množin, které lze vyjádřit jako průnik konečně mnoha prvků  $\mathcal{B}$ , tvoří bázi  $\mathcal{T}$ .

**Tvrzení 3.** Necht'  $X$  je množina a  $\mathcal{B}$  nějaký systém podmnožin  $X$ .

- (i) Systém  $\mathcal{B}$  je bázi nějaké topologie na  $X$ , právě když jsou splněny následující dvě podmínky:
- $\bigcup \mathcal{B} = X$ ;
  - Pro každé  $U, V \in \mathcal{B}$  a každé  $x \in U \cap V$  existuje  $W \in \mathcal{B}$  splňující  $x \in W \subset U \cap V$ .
- (ii) Systém  $\mathcal{B}$  je subbázi nějaké topologie na  $X$ , právě když  $\bigcup \mathcal{B} = X$ .

**Definice.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor,  $a \in X$  a  $\mathcal{U}$  nějaký systém podmnožin  $X$ . Systém  $\mathcal{U}$  je **bázi okolí bodu**  $a$ , pokud platí:

- Každé  $U \in \mathcal{U}$  je okolím bodu  $a$ .
- Pro každé okolí  $V$  bodu  $a$  existuje  $U \in \mathcal{U}$  splňující  $U \subset V$ .

**Tvrzení 4.** Necht'  $X$  je množina a pro každé  $x \in X$  necht'  $\mathcal{U}_x$  je nějaký systém podmnožin  $X$ . Pak existuje topologie  $\mathcal{T}$  na  $X$  taková, že pro každé  $x \in X$  je  $\mathcal{U}_x$  bázi okolí bodu  $x$ , právě když jsou splněny následující podmínky:

- Pro každé  $x \in X$  a každé  $U \in \mathcal{U}_x$  platí  $x \in U$ .
- Je-li  $x \in X$  a  $U, V \in \mathcal{U}_x$ , pak existuje  $W \in \mathcal{U}_x$  splňující  $W \subset U \cap V$ .
- Pro každé  $x \in X$  a každé  $U \in \mathcal{U}_x$  existuje  $V \subset X$  splňující  $x \in V \subset U$  a navíc

$$\forall y \in V \exists W \in \mathcal{U}_y : W \subset V.$$

Topologie  $\mathcal{T}$  je pak jednoznačně určena a platí

$$\mathcal{T} = \{U \subset X; \forall x \in U \exists V \in \mathcal{U}_x : V \subset U\}.$$

**Příklad.** Necht'  $(X, \rho)$  je metrický prostor.

- Pro  $x \in X$  a  $r > 0$  označme  $U(x, r) = \{y \in X; \rho(x, y) < r\}$ . Pak

$$\mathcal{T} = \{U \subset X; \forall x \in U \exists r > 0 : U(x, r) \subset U\}$$

je topologie na  $X$ . Je to **topologie generovaná metrikou**  $\rho$ .

- Necht'  $x \in X$ . Každý z následujících systémů množin tvoří bázi okolí bodu  $x$ :

$$\{U(x, r); r > 0\}; \quad \{U(x, \frac{1}{n}); n \in \mathbb{N}\}; \quad \overline{\{U(x, \frac{1}{n}); n \in \mathbb{N}\}}.$$

## A.2 Spojitá zobrazení

**Definice.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  a  $(Y, \mathcal{U})$  jsou topologické prostory a  $f : X \rightarrow Y$  je zobrazení.

- Zobrazení  $f$  je **spojité v bodě**  $x \in X$ , pokud pro každé okolí  $V$  bodu  $f(x)$  v  $(Y, \mathcal{U})$  existuje  $U$  okolí bodu  $x$  v  $(X, \mathcal{T})$  splňující  $f(U) \subset V$ .
- Zobrazení  $f$  je **spojité na**  $X$ , je-li spojitě v každém bodě  $x \in X$ .

**Tvrzení 5** (charakterizace spojitosti). Necht'  $(X, \mathcal{T})$  a  $(Y, \mathcal{U})$  jsou topologické prostory a  $f : X \rightarrow Y$  je zobrazení. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (i)  $f$  je spojitá na  $X$ .
- (ii) Pro každou  $U \subset Y$  otevřenou je  $f^{-1}(U)$  otevřená v  $X$ .
- (iii) Pro každou  $F \subset Y$  uzavřenou je  $f^{-1}(F)$  uzavřená v  $X$ .
- (iv) Pro každou  $A \subset X$  platí  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ .

### A.3 Oddělovací axiomy

**Definice.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor. Prostor  $X$  se nazývá

- $T_0$ , pokud pro každé dva různé body  $a, b \in X$  existuje  $U \in \mathcal{T}$ , která obsahuje právě jeden z bodů  $a, b$ ;
- $T_1$ , pokud pro každé dva různé body  $a, b \in X$  existuje  $U \in \mathcal{T}$  taková, že  $a \in U$  a  $b \notin U$ ;
- $T_2$  (neboli **Hausdorffův**), pokud pro každé dva různé body  $a, b \in X$  existují  $U, V \in \mathcal{T}$  takové, že  $a \in U$ ,  $b \in V$  a  $U \cap V = \emptyset$ ;
- **regulární**, pokud pro každé  $a \in X$  a každou  $B \subset X$  uzavřenou splňující  $a \notin B$  existují  $U, V \in \mathcal{T}$  takové, že  $a \in U$ ,  $B \subset V$  a  $U \cap V = \emptyset$ ;
- $T_3$ , je-li  $T_1$  a regulární;
- **úplně regulární**, pokud pro každé  $a \in X$  a každou  $B \subset X$  uzavřenou splňující  $a \notin B$  existuje spojitá funkce  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  taková, že  $f(a) = 1$  a  $f|_B = 0$ ;
- $T_{3\frac{1}{2}}$  (neboli **Tichonovův**), je-li  $T_1$  a úplně regulární;
- **normální**, pokud pro každé dvě disjunktní uzavřené množiny  $A, B \subset X$  existují  $U, V \in \mathcal{T}$  takové, že  $A \subset U$ ,  $B \subset V$  a  $U \cap V = \emptyset$ ;
- $T_4$ , je-li  $T_1$  a normální.

**Poznámka.**

- Triviálně platí  $T_{3\frac{1}{2}} \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ .
- Platí i  $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ , není to však triviální, plyne to z Urysohnova lemmatu.
- Každý metrický prostor je  $T_4$ .

**Tvrzení 6** (Urysohnovo lemma). Necht'  $X$  je normální topologický prostor a  $A, B \subset X$  dvě disjunktní uzavřené množiny. Pak existuje spojitá funkce  $f : X \rightarrow [0, 1]$  splňující  $f|_A = 0$  a  $f|_B = 1$ .

### A.4 Podprostory, součiny a kvocienty

**Definice.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor a  $Y \subset X$ . Pak  $\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y; U \in \mathcal{T}\}$  je topologie na  $Y$  a prostor  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  je pak **topologický podprostor** prostoru  $(X, \mathcal{T})$ .

**Poznámka.** Podprostor prostoru, který je  $T_0, T_1, T_2, \text{ regulární, } T_3, \text{ úplně regulární nebo } T_{3\frac{1}{2}}$ , má opět tutéž vlastnost. (To je zřejmé.) Podprostor  $T_4$  prostoru nemusí být  $T_4$ . (To není zřejmé.)

**Definice.** Necht'  $(X_1, \mathcal{T}_1), \dots, (X_k, \mathcal{T}_k)$  jsou neprázdné topologické prostory. Jejich **kartézským součinem** rozumíme množinu  $X_1 \times \dots \times X_k$  opatřenou topologií, jejíž báze je

$$\{U_1 \times \dots \times U_k; U_1 \in \mathcal{T}_1, \dots, U_k \in \mathcal{T}_k\}.$$

**Definice.** Necht'  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ ,  $\alpha \in A$ , je libovolný neprázdný systém neprázdných topologických prostorů. Jejich **kartézským součinem** rozumíme množinu  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  opatřenou topologií, jejíž báze je

$$\left\{ \left\{ f \in \prod_{\alpha \in A} X_\alpha; f(\alpha_1) \in U_1, \dots, f(\alpha_k) \in U_k \right\}; \right. \\ \left. U_1 \in \mathcal{T}_{\alpha_1}, \dots, U_k \in \mathcal{T}_{\alpha_k}, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in A, k \in \mathbb{N} \right\}$$

**Tvrzení 7.** Necht'  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ ,  $\alpha \in A$ , je libovolný neprázdný systém neprázdných topologických prostorů a  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  jejich kartézský součin. Necht'  $(Y, \mathcal{U})$  je topologický prostor a  $f : Y \rightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  zobrazení. Zobrazení  $f$  je spojitě na  $Y$ , právě když pro každé  $\alpha \in A$  je zobrazení  $y \mapsto f(y)(\alpha)$  spojitě zobrazení  $Y$  do  $X_\alpha$ .

**Definice.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  je topologický prostor,  $Y$  množina a  $f : X \rightarrow Y$  zobrazení  $X$  na  $Y$ . **Kvocietová topologie** na  $Y$  indukovaná zobrazením  $f$  je topologie

$$\mathcal{T}_Y = \{U \subset Y; f^{-1}(U) \in \mathcal{T}\}.$$

**Definice.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  a  $(Y, \mathcal{U})$  jsou topologické prostory a  $f : X \rightarrow Y$  zobrazení  $X$  na  $Y$ . Říkáme, že  $f$  je **kvocietové zobrazení**, pokud  $\mathcal{U}$  je kvocietová topologie indukovaná zobrazením  $f$ .

**Tvrzení 8.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  a  $(Y, \mathcal{U})$  jsou topologické prostory a  $f : X \rightarrow Y$  spojitě zobrazení  $X$  na  $Y$ . Je-li  $f$  otevřené (tj. obraz každé otevřené množiny v  $X$  je otevřená množina v  $Y$ ) nebo uzavřené (tj. obraz každé uzavřené množiny v  $X$  je uzavřená množina v  $Y$ ), je kvocietové.

**Tvrzení 9.** Necht'  $(X, \mathcal{T})$  a  $(Y, \mathcal{U})$  jsou topologické prostory a  $f : X \rightarrow Y$  kvocietové zobrazení  $X$  na  $Y$ . Necht'  $(Z, \mathcal{W})$  je topologický prostor a  $g : Y \rightarrow Z$  je zobrazení. Pak  $g$  je spojitě, právě když  $g \circ f$  je spojitě.

## A.5 Kompaktní prostory

**Definice.** Topologický prostor  $(X, \mathcal{T})$  se nazývá **kompaktní**, pokud pro každý systém  $\mathcal{U}$  otevřených množin, který pokrývá  $X$  (tj. který splňuje  $\bigcup \mathcal{U} = X$ ) existuje konečný podsystém  $\mathcal{W} \subset \mathcal{U}$ , který také pokrývá  $X$  (tj.  $\bigcup \mathcal{W} = X$ ).

**Tvrzení 10.** Necht'  $X$  je kompaktní topologický prostor a  $Y \subset X$  jeho topologický podprostor.

- Je-li  $Y$  uzavřený, je  $Y$  kompaktní.
- Je-li  $X$  Hausdorffův a  $Y$  kompaktní, je  $Y$  uzavřený.

**Tvrzení 11.** Necht'  $X$  je kompaktní topologický prostor,  $Y$  topologický prostor a  $f : X \rightarrow Y$  spojitě zobrazení  $X$  na  $Y$ . Pak platí:

- (i)  $Y$  je kompaktní.
- (ii) Je-li  $Y$  Hausdorffův, je  $f$  uzavřené zobrazení (a tedy kvocietové).
- (iii) Je-li  $Y$  Hausdorffův a  $f$  je prosté, je  $f$  homeomorfismus (tj. i  $f^{-1}$  je spojitě).

**Tvrzení 12.** Každý Hausdorffův kompaktní topologický prostor je  $T_4$ , a tedy i  $T_{3\frac{1}{2}}$ .

**Věta 13** (Tichonovova věta). Kartézský součin libovolného systému Hausdorffových kompaktních topologických prostorů je kompaktní. Speciálně, prostory  $[-1, 1]^\Gamma$ ,  $[0, 1]^\Gamma$ ,  $\{0, 1\}^\Gamma$  a  $\{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 1\}^\Gamma$  jsou kompaktní pro každou množinu  $\Gamma$ .

## A.6 Konvergence posloupností a netů

**Definice.** Necht'  $X$  je topologický prostor,  $(x_n)$  posloupnost prvků  $X$  a  $x \in X$ . Říkáme, že posloupnost  $(x_n)$  **konverguje k  $x$  v prostoru  $X$** , jestliže pro každé okolí  $U$  bodu  $x$  existuje  $n_0 \in \mathbb{N}$  takové, že pro  $n \geq n_0$  platí  $x_n \in U$ . Bod  $x$  se pak nazývá **limitou posloupnosti**  $(x_n)$ , značíme  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  nebo  $x_n \rightarrow x$ .

**Poznámka:** Je-li  $X$  Hausdorffův, pak každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

**Tvrzení 14.** Necht'  $X$  je metrický prostor. Pak platí:

(1) Necht'  $A \subset X$ . Pak

$$\bar{A} = \{x \in X; \exists (x_n) \text{ posloupnost v } A : x_n \rightarrow x\}$$

(2) Necht'  $A \subset X$ . Pak  $A$  je uzavřená, právě když každé  $x \in X$ , k němuž konverguje nějaká posloupnost prvků  $A$ , je prvkem  $A$ .

(3) Necht'  $Y$  je topologický prostor,  $f : X \rightarrow Y$  zobrazení a  $x \in X$ . Zobrazení  $f$  je spojitě v bodě  $x$ , právě když platí

$$\forall (x_n) \text{ posloupnost v } X : x_n \rightarrow x \Rightarrow f_n(x) \rightarrow f(x).$$

**Definice.** Necht'  $(\Gamma, \preceq)$  je částečně uspořádaná množina. Říkáme, že je **usměrněná** (podrobněji nahoru usměrněná), pokud pro každou dvojici  $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$  existuje  $\gamma \in \Gamma$ , splňující  $\gamma_1 \preceq \gamma$  a  $\gamma_2 \preceq \gamma$ .

**Příklady usměrněných množin:**

- $\Gamma =$  množina všech konečných podmnožin  $\mathbb{N}$ ,  $A \preceq B \equiv^{\text{df}} A \subset B$ .
- $\Gamma =$  množina všech okolí bodu  $x$  v topologickém prostoru  $X$ ,  $U \preceq V \equiv^{\text{df}} U \supset V$ .

**Definice.** Necht'  $X$  je topologický prostor a  $(\Gamma, \preceq)$  je usměrněná množina.

- **Netem indexovaným množinou  $\Gamma$**  rozumíme každé zobrazení  $\alpha : \Gamma \rightarrow X$ .
- Říkáme, že net  $\alpha : \Gamma \rightarrow X$  **konverguje k bodu  $x \in X$** , pokud platí

$$\forall U \text{ okolí bodu } x \exists \gamma_0 \in \Gamma \forall \gamma \in \Gamma, \gamma \succeq \gamma_0 : \alpha(\gamma) \in U.$$

Bod  $x$  se nazývá **limitou netu**  $\alpha$ , píšeme  $\lim_{\gamma \in \Gamma} \alpha(\gamma) = x$  nebo  $\alpha(\gamma) \xrightarrow{\gamma \in \Gamma} x$ .

**Poznámka:** Je-li  $X$  Hausdorffův, pak každý net v  $X$  má nejvýše jednu limitu.

**Tvrzení 15.** Necht'  $X$  je topologický prostor. Pak platí:

(1) Necht'  $A \subset X$ . Pak

$$\bar{A} = \{x \in X; \exists \text{ net } \alpha : \Gamma \rightarrow A : \alpha(\gamma) \xrightarrow{\gamma \in \Gamma} x\}$$

(2) Necht'  $A \subset X$ . Pak  $A$  je uzavřená, právě když každé  $x \in X$ , k němuž konverguje nějaký net v  $A$ , je prvkem  $A$ .

(3) Necht'  $Y$  je topologický prostor,  $f : X \rightarrow Y$  zobrazení a  $x \in X$ . Zobrazení  $f$  je spojitě v bodě  $x$ , právě když platí

$$\forall \text{ net } \alpha : \Gamma \rightarrow X : \alpha(\gamma) \xrightarrow{\gamma \in \Gamma} x \Rightarrow f(\alpha(\gamma)) \xrightarrow{\gamma \in \Gamma} f(x).$$