

FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA 1

PŘÍKLADY PRO POROZUMĚNÍ LÁTCE – ZS 2021/2022

PŘÍKLADY KE KAPITOLE III

K ODDÍLU III.1 – MĚŘITELNOST VEKTOROVÝCH FUNKCÍ

Příklad 1. Nechť Γ je libovolná množina a Σ je σ -algebra podmnožin $\Gamma \times \Gamma$ generovaná všemi obdélníky (tj., množinami tvaru $A \times B$, kde $A, B \subset \Gamma$). Nechť dále $\Delta = \{(\gamma, \gamma), \gamma \in \Gamma\}$ je diagonála $\Gamma \times \Gamma$. Ukažte, že $\Delta \in \Sigma$, právě když mohutnost Γ je nejvýše rovna mohutnosti kontinua.

Návod: \Leftarrow : Předpoklad, že mohutnost Γ je nejvýše rovna mohutnosti kontinua, znamená, že můžeme předpokládat $\Gamma \subset \mathbb{R}$. Dále existují taková spočetná dělení (disjunktní pokrytí) $\mathcal{P}_n = \{A_{n,m}; m \in \mathbb{N}\}$ množiny \mathbb{R} , že pro každé n dělení \mathcal{P}_{n+1} zjemňuje \mathcal{P}_n a kdykoli pro každé n máme $A_{n,m_n} \in \mathcal{P}_n$, pak průnik $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_{n,m_n}$ je nejvýše jednobodový. \Rightarrow : Ukažte, že pro každé $M \in \Sigma$ existuje dělení $(A_j)_{j \in J}$ množiny Γ takové, že mohutnost J je nejvýše rovna mohutnosti kontinua a pro každé $j \in J$ platí buď $A_j \times A_j \subset M$ nebo $(A_j \times A_j) \cap M = \emptyset$. Nejprve dokažte, že obdélníky tuto vlastnost splňují, a potom, že se zachová na doplňky a spočetná sjednocení. Při důkazu zachování na spočetná sjednocení je důležité, že (i) spočetné sjednocení množin mohutnosti nejvýše kontinuum má opět mohutnost nejvýše kontinuum, a (ii) množina posloupností prvků množiny mohutnosti kontinua má také mohutnost kontinua.

Příklad 2. Nechť X je Banachův prostor mohutnosti větší než mohutnost kontinua, $\Omega = X \times X$ a Σ nechť je σ -algebra podmnožin Ω generovaná borelovskými obdélníky (tj. množinami $A \times B$, kde $A, B \subset X$ jsou borelovské množiny). Definujme dvě funkce $f, g : \Omega \rightarrow X$ předpisem

$$f(x, y) = x, \quad g(x, y) = y \quad \text{pro } (x, y) \in \Omega.$$

Ukažte, že f i g jsou borelovsky Σ -měřitelné, ale $f - g$ není borelovsky Σ -měřitelná.

Návod: Použijte Příklad 1.

Příklad 3. Nechť (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou mírou, X je Banachův prostor a $f : \Omega \rightarrow X$ je zobrazení. Bod $x \in X$ patří do **esenciálního oboru hodnot** f , pokud pro každé U , okolí x v X , vzor $f^{-1}(U)$ není množina míry nula.

- (1) Nechť μ je konečná míra a f je borelovsky Σ -měřitelná. Ukažte, že the esenciální obor hodnot f je separabilní.
- (2) Nechť f je esenciálně separabilně hodnotové (th., f má **esenciálně separabilní obor hodnot**). Ukažte, že esenciální obor hodnot f je separabilní.
- (3) Najděte příklad funkce, která nemá esenciálně separabilní obor hodnot, ale jejíž esenciální obor hodnot je prázdný (a tedy separabilní).

Návod: (1) Je-li esenciální obor hodnot neseperabilní, obsahuje pro nějaké $\varepsilon > 0$ nespočetnou ε -diskrétní množinu D . Pak $f^{-1}(U(d, \varepsilon/2))$, $d \in D$, je nespočetný systém měřitelných množin kladné míry. (3) Uvažte například funkci $f : [0, 1] \rightarrow \ell^2([0, 1])$ definovanou vzorcem $f(t) = e_t$, viz Příklad III.6(1).

Příklad 4. Ukažte, že následující dvě podmínky jsou ekvivalentní:

- (i) Existuje prostor (Ω, Σ, μ) s konečnou úplnou mírou, Banachův prostor X a borelovsky Σ -měřitelná funkce $f : \Omega \rightarrow X$, která není esenciálně separabilně hodnotová.
- (ii) Existuje množina Γ a nenulová konečná σ -aditivní míra definovaná na σ -algebře všech podmnožin Γ , která je nulová na jednobodových množinách (tj., existuje **reálně měřitelný kardinál**).

Návod: $(ii) \Rightarrow (i)$ Uvědomte si, že Γ musí být nespočetná a uvažte $f : \Gamma \rightarrow \ell^2(\Gamma)$ definovanou vzorcem $f(\gamma) = e_\gamma$. $(i) \Rightarrow (ii)$ Nechť R je esenciální obor hodnot f . Podle Příklad 3(1) je R separabilní, tedy $\Omega \setminus f^{-1}(R)$ má kladnou míru. Tedy bez újmy na obecnosti $R = \emptyset$. Neboli, každý bod $x \in X$ má okolí, jehož vzor má míru nula. S využitím skutečnosti, že každý metrický prostor má σ -disjunktní bázi otevřených množin můžeme najít disjunktní systémy \mathcal{U}_n otevřených množin se vzory nulové míry, že $\bigcup_n \bigcup \mathcal{U}_n = X$. Existuje n , že $\mu(f^{-1}(\bigcup \mathcal{U}_n)) > 0$. Položme $\Gamma = \mathcal{U}_n$ a $\nu(A) = \mu(f^{-1}(\bigcup A))$ pro $A \subset \Gamma$.

Příklad 5. Nechť (Ω, Σ) je měřitelný prostor, X je Banachův prostor a (f_n) je posloupnost silně Σ -měřitelných funkcí $f_n : \Omega \rightarrow X$ taková, že pro každé $\omega \in \Omega$ posloupnost $(f_n(\omega))$ slabě konverguje k nějakému $f(\omega)$. Ukažte, že f je silně Σ -měřitelná.

Návod: Ukažte, že f je slabě Σ -měřitelná a má separabilní obor hodnot (pomocí Mazurovy věty). Pak použijte Pettisovu větu.

Příklad 6. Nechť (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou mírou, X je Banachův prostor a (f_n) je posloupnost silně μ -měřitelných funkcí $f_n : \Omega \rightarrow X$ taková, že pro skoro všechna $\omega \in \Omega$ posloupnost $(f_n(\omega))$ slabě konverguje k nějakému $f(\omega)$. Ukažte, že f je silně μ -měřitelná.

Návod: Ukažte, že f je slabě μ -měřitelná a je esenciálně separabilně hodnotová (pomocí Mazurovy věty). Pak použijte Pettisovu větu.

Příklad 7. Nechť (Ω, Σ, μ) je interval $(0, \infty)$ s Lebesgueovou mírou, $X = L^p((0, \infty))$, přičemž $p \in [1, \infty)$. Nechť $\psi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{F}$ je funkce.

- (1) Ukažte, že funkce $\phi : t \mapsto \psi(t) \cdot \chi_{(0,t)}$ je μ -měřitelná právě když ψ je lebesgueovsky měřitelná.
- (2) Ukažte, že funkce $\phi : t \mapsto \psi \cdot \chi_{(0,t)}$ (i.e., $t \mapsto (u \mapsto \psi(u)\chi_{(0,t)}(u))$) je μ -měřitelná právě když $\psi|_{(0,T)} \in L^p((0, T))$ pro každé $T \in (0, \infty)$.
- (3) Předpokládejme, že ψ má hodnoty v $(0, \infty)$. Ukažte, že funkce $\phi : t \mapsto \chi_{(0,\psi(t))}$ je μ -měřitelná právě když ψ je lebesgueovsky měřitelná.

Návod: $(1) \Rightarrow$: $\phi(t) \in X$ pro každé t . Pro důkaz měřitelnosti ψ uvažte funkcionály reprezentované funkcemi $\chi_{(0,T)}$, $T \in (0, \infty)$. \Leftarrow : Dokažte slabou měřitelnost. $(2) \Rightarrow$: Podmínka je nutná k tomu, aby $\phi(t) \in X$ pro každé t . \Leftarrow : Dokažte slabou měřitelnost. $(3) \Rightarrow$: $\phi(t) \in X$ pro každé t . Pro důkaz měřitelnosti ψ uvažte funkcionály reprezentované funkcemi $\chi_{(0,T)}$, $T \in (0, \infty)$. \Leftarrow : Stačí dokázat slabou měřitelnost. Je snadno vidět, že ϕ je slabě měřitelná, pokud ψ je spojitá. Dále, pokud $\psi_n \rightarrow \psi$ skoro všude na $(0, \infty)$, pak pro příslušné funkce ϕ_n a ϕ platí $\phi_n(t) \rightarrow \phi(t)$ slabě pro skoro všechna t .

Příklad 8. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, \infty)$ s Lebesgueovou mírou, $X = L^\infty((0, \infty))$. Necht' $\psi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{F}$ je funkce.

- (1) Ukažte, že funkce $\phi : t \mapsto \psi(t) \cdot \chi_{(0,t)}$ je silně μ -měřitelná, právě když $\psi = 0$ skoro všude.
- (2) Ukažte, že funkce $\phi : t \mapsto \psi \cdot \chi_{(0,t)}$ (tj. $t \mapsto (u \mapsto \psi(u)\chi_{(0,t)}(u))$) je silně μ -měřitelná, právě když $\psi = 0$ skoro všude.
- (3) Předpokládejme, že ψ nabývá hodnot v $(0, \infty)$. Ukažte, že funkce $\phi : t \mapsto \chi_{(0,\psi(t))}$ je silně μ -měřitelná, právě když ψ je lebesgueovsky měřitelná a existuje spočetná množina $C \subset (0, \infty)$, že $\psi(t) \in C$ pro skoro všechna $t \in (0, \infty)$.

Návod: (1) \Leftarrow : Pokud $\psi = 0$ skoro všude, pak $\phi = 0$ skoro všude. \Rightarrow : $\|\phi(t) - \phi(u)\| \geq |\psi(u)|$ pro $t < u$. Pokud $\psi(t) \neq 0$ na množině, která nemá míru nula, pak existuje $n \in \mathbb{N}$, pro které je $|\psi(t)| > \frac{1}{n}$ na množině, která nemá míru nula. Proto ϕ není esenciálně separabilně hodnotové. (2) \Leftarrow : Pokud $\psi = 0$ skoro všude, then $\phi = 0$ skoro všude. \Rightarrow : Nejprve si uvědomme, že ψ musí být lebesgueovsky měřitelná. Dále, $\|\phi(t) - \phi(u)\| = \|\psi|_{(t,u)}\|$ pro $t < u$. Pokud $\psi \neq 0$ na množině kladné míry, existuje $n \in \mathbb{N}$, že množina $A = \{t; |\psi(t)| \geq \frac{1}{n}\}$ má kladnou míru. Necht' Z je sjednocení všech otevřených intervalů I , pro která má $I \cap A$ míru nula. Pak $Z \cap A$ má rovněž míru nula. Tedy $(0, \infty) \setminus Z$ je uzavřená množina kladné míry. Označme B množinu všech jednostranně izolovaných bodů $(0, \infty) \setminus Z$. Pak B je spočetná, a tedy $C = (0, \infty) \setminus (Z \cup B)$ je množina kladné míry. Navíc pro $u, t \in C$, $u < t$, má $(u, t) \cap A$ kladnou míru. Odtud plyne, že ϕ není esenciálně separabilně hodnotové. (3) \Leftarrow : Ukažte, že ϕ je esenciálně separabilně hodnotová a borelovsky μ -měřitelná. \Rightarrow : $\phi(t) \in X$ pro každé t . Pro důkaz měřitelnosti ψ uvažte funkcionály reprezentované funkcemi $\chi_{(0,T)}$, $T \in (0, \infty)$. Dále, charakteristické funkce v X tvoří diskrétní množinu, tedy v případě, že ϕ je esenciálně separabilně hodnotová, najdeme příslušnou množinu C .

Příklad 9. Necht' K je kompaktní Hausdorffův prostor a $X = \mathcal{C}(K)$ je prostor spojitých funkcí na K se supremovou normou. Necht' (Ω, Σ) je měřitelný prostor a $f : \Omega \rightarrow X$ zobrazení.

- (1) Předpokládejme, že f je slabě Σ -měřitelná. Ukažte, že pro každé $k \in K$ je funkce $\omega \mapsto f(\omega)(k)$ Σ -měřitelná.
- (2) Předpokládejme navíc, že K je metrizovatelný. Ukažte, že platí i obrácená implikace. Tj. f je slabě měřitelná, pokud pro každé $k \in K$ je funkce $\omega \mapsto f(\omega)(k)$ Σ -měřitelná.

Návod: (2) Podle Rieszovy věty musíme ukázat, že funkce $\omega \mapsto \int_K f(\omega)(k) d\mu(k)$ je měřitelná pro každou (znaménkovou či komplexní) Radonovu míru na K . Množina všech měr s touto vlastností obsahuje Diracovy míry (dle předpokladu). Dále je to vektorový podprostor a je uzavřená na limity slabě* konvergentních posloupností. Navíc absolutně konvexní obal Diracových měr je slabě* hustý v jednotkové kouli $B_{\mathcal{C}(K)^*}$ (podle věty o bipoláře). Nakonec, protože $\mathcal{C}(K)$ je separabilní, duální koule je metrizovatelná ve slabě* topologii, a tedy libovolná míra z jednotkové koule je slabou* limitou posloupností z absolutně konvexního obalu Dirakových měr.

Příklad 10. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $[0, 1]$ s Lebesgueovou mírou, $X = \mathcal{C}([0, 1])$ a $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{F}$ je funkce.

$$\Phi : t \mapsto f(t, \cdot)$$

je μ -měřitelná funkce $\Omega \rightarrow X$, právě když

- $u \mapsto f(t, u)$ je spojitá na $[0, 1]$ pro každé $t \in [0, 1]$;
- $t \mapsto f(t, u)$ je lebesgueovsky měřitelná pro každé $u \in [0, 1]$.

K ODDÍLU III.2 – INTEGROVATELNOST VEKTOROVÝCH FUNKCÍ

Příklad 11. Necht' (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou mírou a X je reflexivní Banachův prostor. Ukažte, že každá slabě integrovatelná funkce $f : \Omega \rightarrow X$ je pettisovsky integrovatelná.

Příklad 12. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, 1)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^p((0, 1))$, kde $p \in (1, \infty)$. Necht' $\psi : (0, 1) \rightarrow \mathbb{F}$ je lebesgueovsky měřitelná funkce. Definujme funkci $\phi : (0, 1) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \psi(t)\chi_{(0,t)}(u), \quad u \in (0, 1), t \in (0, 1).$$

- (1) Ukažte, že ϕ je pettisovsky integrovatelná, právě když $\int_0^1 \left(\int_u^1 |\psi| \right)^p du < \infty$.
- (2) Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná, právě když $\int_0^1 t^{1/p} |\psi(t)| dt < \infty$.
- (3) Je v tomto případě bochnerovská integrovatelnost ekvivalentní pettisovské integrovatelnosti?
- (4) Spočítejte příslušný Pettisův či Bochnerův integrál.

Návod: (1) Podle Příkladu 11 stačí ukázat slabou integrovatelnost. V důkaz použijte známý fakt, že $f \in L^p$, právě když pro každé $g \in L^q$ je $fg \in L^1$ (kde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). (4) Spočítejte jako Pettisův integrál.

Příklad 13. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, 1)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^p((0, 1))$, kde $p \in (1, \infty)$. Necht' $\psi : (0, 1) \rightarrow \mathbb{F}$ je lebesgueovsky měřitelná funkce, pro níž je $\psi|_{(0,r)} \in L^p((0, r))$ pro každé $r \in (0, 1)$. Definujme funkci $\phi : (0, 1) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \psi(u)\chi_{(0,t)}(u), \quad u \in (0, 1), t \in (0, 1).$$

- (1) Ukažte, že ϕ je pettisovsky integrovatelná, právě když $\int_0^1 (1-u)^p |\psi(u)|^p du < \infty$.
- (2) Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná, právě když $\int_0^1 \left(\int_0^t |\psi|^p \right)^{1/p} dt < \infty$.
- (3) Je v tomto případě bochnerovská integrovatelnost ekvivalentní pettisovské integrovatelnosti?
- (4) Spočítejte příslušný Pettisův či Bochnerův integrál.

Návod: (1) Podle Příkladu 11 stačí ukázat slabou integrovatelnost. V důkaz použijte známý fakt, že $f \in L^p$, právě když pro každé $g \in L^q$ je $fg \in L^1$ (kde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). (4) Spočítejte jako Pettisův integrál.

Příklad 14. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, 1)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^p((0, 1))$, kde $p \in [1, \infty)$. Necht' $\psi : (0, 1) \rightarrow (0, 1]$ je lebesgueovsky měřitelná funkce. Definujme funkci $\phi : (0, 1) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \chi_{(0,\psi(t))}(u), \quad u \in (0, 1), t \in (0, 1).$$

Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná a spočítejte Bochnerův integrál.

Příklad 15. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, \infty)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^p((0, \infty))$, kde $p \in (1, \infty)$. Necht' $\psi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ je lebesgueovsky měřitelná funkce. Definujme funkci $\phi : (0, \infty) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \chi_{(0, \psi(t))}(u), \quad u \in (0, \infty), t \in (0, \infty).$$

- (1) Ukažte, že ϕ je Pettisovsky integrovatelná, právě když $\int_0^\infty \mu(\psi^{-1}(u, \infty))^p du < \infty$.
- (2) Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná, právě když $\int_0^\infty |\psi(t)|^{1/p} dt < \infty$.
- (3) Je v tomto případě bochnerovská integrovatelnost ekvivalentní Pettisovské integrovatelnosti?
- (4) Spočtete příslušný Pettisův či Bochnerův integrál.

Návod: (1) Podle Příkladu 11 stačí ukázat slabou integrovatelnost. V důkaz použijte známý fakt, že $f \in L^p$, právě když pro každé $g \in L^q$ je $fg \in L^1$ (kde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). (4) Spočtete jako Pettisův integrál.

Příklad 16. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, 1)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^1((0, 1))$. Necht' $\psi : (0, 1) \rightarrow \mathbb{F}$ je lebesgueovsky měřitelná funkce. Definujme funkci $\phi : (0, 1) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \psi(t)\chi_{(0,t)}(u), \quad u \in (0, 1), t \in (0, 1).$$

- (1) Ukažte, že ϕ je slabě integrovatelná, právě když $\int_0^1 t |\psi(t)| dt < \infty$.
- (2) Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná, pokud je slabě integrovatelná.
- (3) Spočtete příslušný Bochnerův integrál.

Příklad 17. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, 1)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^1((0, 1))$. Necht' $\psi : (0, 1) \rightarrow \mathbb{F}$ je lebesgueovsky měřitelná funkce, pro kterou je $\psi|_{(0,r)} \in L^1((0, r))$ pro každé $r \in (0, 1)$. Definujme funkci $\phi : (0, 1) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \psi(u)\chi_{(0,t)}(u), \quad u \in (0, 1), t \in (0, 1).$$

- (1) Ukažte, že ϕ je slabě integrovatelná, právě když $\int_0^1 (1-u) |\psi(u)| du < \infty$.
- (2) Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná, pokud je slabě integrovatelná.
- (3) Spočtete příslušný Bochnerův integrál.

Příklad 18. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, \infty)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^1((0, \infty))$. Necht' $\psi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ je a lebesgueovsky měřitelná funkce. Definujme funkci $\phi : (0, \infty) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \chi_{(0, \psi(t))}(u), \quad u \in (0, \infty), t \in (0, \infty).$$

- (1) Ukažte, že ϕ je slabě integrovatelná, právě když $\int_0^\infty \mu(\psi^{-1}(u, \infty)) du < \infty$.
- (2) Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná, právě když $\psi \in L^1((0, \infty))$.
- (3) Ukažte, že v tomto případě je bochnerovská integrovatelnost ekvivalentní slabé integrovatelnosti.
- (4) Spočtete příslušný Bochnerův integrál.

Příklad 19. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, 1)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^\infty((0, 1))$. Necht' $\psi : (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ je lebesgueovsky měřitelná funkce, která je "esenciálně spočetně hodnotová" (viz podmínku v Příkladu 8(3)). Definujme funkci $\phi : (0, 1) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \chi_{(0, \psi(t))}(u), \quad u \in (0, 1), t \in (0, 1).$$

Ukažte, že ϕ je bochnerovsky integrovatelná a spočtete Bochnerův integrál.

Příklad 20. Necht' (Ω, Σ, μ) je interval $(0, \infty)$ s Lebesgueovou mírou a $X = L^\infty((0, \infty))$. Necht' $\psi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ je lebesgueovsky měřitelná funkce, která je "esenciálně spočetně hodnotová" (viz podmínku v Příkladu 8(3)). Definujme funkci $\phi : (0, \infty) \rightarrow X$ předpisem

$$\phi(t)(u) = \chi_{(0, \psi(t))}(u), \quad u \in (0, \infty), t \in (0, \infty).$$

Characterizujte funkce ψ , pro které je ϕ bochnerovsky integrovatelná, a spočtete Bochnerův integrál.

Příklad 21. Necht' (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou σ -konečnou mírou, K je metrizable kompaktní prostor a $f : \Omega \times K \rightarrow \mathbb{F}$ je funkce splňující následující vlastnosti:

- $t \mapsto f(\omega, t)$ je spojitá na K pro každé $\omega \in \Omega$;
- $\omega \mapsto f(\omega, t)$ je μ -měřitelná pro každé $t \in K$.

Definujme zobrazení $\Phi : \Omega \rightarrow \mathcal{C}(K)$ předpisem

$$\Phi(\omega) = f(\omega, \cdot), \quad \omega \in \Omega.$$

- (1) Ukažte, že Φ je slabě integrovatelné, právě když $\sup_{t \in K} \int_{\Omega} |f(\omega, t)| d\mu(\omega) < \infty$.
- (2) Předpokládejme, že Φ je slabě integrovatelná. Položme $g(t) = \int_{\Omega} f(\omega, t) d\mu(\omega)$ (pro $t \in K$). Ukažte, že g je univerzálně měřitelná (i.e., měřitelná pro každou Radonovu pravděpodobnostní míru na K) a že slabý integrál Φ přes Ω je prvek $\mathcal{C}(K)^{**} = \mathcal{M}(K)^*$ definovaný vzorcem

$$\nu \mapsto \int_K g d\nu, \quad \nu \in \mathcal{M}(K).$$

- (3) Najděte příklad, kdy g není spojitá.
- (4) Najděte příklad, kdy g je spojitá, ale Φ není pettsovsky integrovatelná.
- (5) Ukažte, že Φ je pettsovsky integrovatelná, právě když pro každé $A \in \Sigma$ je funkce $t \mapsto \int_A f(\omega, t) d\mu(\omega)$ spojitá na K .
- (6) Ukažte, že Φ je bochnerovsky integrovatelná, právě když $\int_{\Omega} \sup_{t \in K} |f(\omega, t)| d\mu(\omega) < \infty$.
- (7) Je v tomto případě bochnerovská integrovatelnost ekvivalentní pettsovské integrovatelnosti?

Návod: (1) \Rightarrow : Je-li Φ slabě integrovatelná, pak zobrazení $\varphi \mapsto \varphi \circ \Phi$ je spojitý lineární operátor X^* do $L^1(\mu)$ (viz důkaz Tvzení III.11). \Leftarrow : Je třeba ukázat, že pro každé $\nu \in \mathcal{M}(K)$ funkce $h_{\nu} : \omega \mapsto \int_K f(\omega, t) d\nu(t)$ patří $L^1(\mu)$. Podle předpokladu to platí pro Diracovy míry, tedy i pro jejich lineární kombinace. Navíc, pokud $\nu_n \xrightarrow{w^*} \nu$ v $\mathcal{M}(K) = \mathcal{C}(K)^*$, pak $h_{\nu_n} \rightarrow h_{\nu}$ bodově. Je-li $\nu \in \mathcal{M}(K)$ libovolná, existuje posloupnost (ν_n) lineárních kombinací Diracových měr, pro kterou $\nu_n \xrightarrow{w^*} \nu$ a $\|\nu_n\| \leq \|\nu\|$ pro každé n . Posloupnost (h_{ν_n}) je omezená $L^1(\mu)$, a tedy $h_{\nu} \in L^1(\mu)$ podle Fatouova lemmatu. (2) Použijte Fubiniovu větu. (5) Použijte (2) a definice. (6) Použijte Větu III.8.

Příklad 22. Necht' (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou konečnou mírou, $p \in [1, \infty]$ a $X = c_0$. Každou funkci $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ lze kanonicky identifikovat s posloupností (f_n) skalárních funkcí na Ω .

- (1) Ukažte, že funkce $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ je μ -měřitelná, právě když f_n je μ -měřitelná pro každé $n \in \mathbb{N}$.
- (2) Necht' $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ je μ -měřitelná. Spočtete $\|\mathbf{f}\|_p$ a pomocí nalezeného vzorce popište prostor $L^p(\mu; X)$.
- (3) Ukažte, že $L^\infty(\mu, X)$ je kanonicky izometrický vlastním podprostoru $(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} L^\infty(\mu))_{\ell^\infty}$ a tento podprostor popište.

Návod: (1) Uvažte slabou měřitelnost.

Příklad 23. Necht' (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou konečnou mírou, $p \in [1, \infty]$, $q \in [1, \infty)$ a $X = \ell^q$. Každou funkci $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ lze kanonicky identifikovat s posloupností (f_n) skalárních funkcí na Ω .

- (1) Ukažte, že funkce $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ je μ -měřitelná, právě když f_n je μ -měřitelná pro každé $n \in \mathbb{N}$.
- (2) Necht' $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ je μ -měřitelná. Spočtete $\|\mathbf{f}\|_p$ a pomocí nalezeného vzorce popište prostor $L^p(\mu; X)$.
- (3) Za předpokladu $p = q$ ukažte, že $L^p(\mu; X)$ je kanonicky izometrický prostoru $(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} L^p(\mu))_{\ell^p}$.

Návod: (1) Uvažte slabou měřitelnost.

Příklad 24. Necht' (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou konečnou mírou, $p \in [1, \infty]$ a $X = \ell^\infty$. Každou funkci $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ lze kanonicky identifikovat s posloupností (f_n) skalárních funkcí na Ω .

- (1) Ukažte, že funkce $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ je μ -měřitelná právě když je esenciálně separabilně hodnotová a f_n je μ -měřitelná pro každé $n \in \mathbb{N}$.
- (2) Necht' $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow X$ je μ -měřitelná. Spočtete $\|\mathbf{f}\|_p$ a pomocí nalezeného vzorce popište prostor $L^p(\mu; X)$.
- (3) Ukažte, že $L^\infty(\mu, X)$ je kanonicky izometrický vlastním podprostoru $(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} L^\infty(\mu))_{\ell^\infty}$ a tento podprostor popište.

Návod: (1) Implikace \Rightarrow je zřejmá. Pro důkaz obrácené implikace si uvědomte, že vzor při \mathbf{f} každé otevřené koule v X patří do Σ a pomocí předpokladu, že \mathbf{f} je esenciálně separabilně hodnotová dokažte borelovskou μ -měřitelnost.

Příklad 25. Necht' (Ω, Σ, μ) je prostor s úplnou σ -konečnou mírou, $p \in [1, \infty]$, necht' $p^* \in [1, \infty]$ je sdružený exponent, X je Banachův prostor a X^* jeho duál.

(1) Necht' $f \in L^p(\mu; X)$ a $g \in L^{p^*}(\mu; X^*)$. Ukažte, že funkce

$$h(\omega) = g(\omega)(f(\omega)), \quad \omega \in \Omega,$$

je μ -integrovatelná a platí $\|h\|_1 \leq \|g\|_{p^*} \cdot \|f\|_p$.

(2) Pro $g \in L^{p^*}(\mu; X^*)$ položme

$$\Phi_g(f) = \int_{\Omega} g(\omega)(f(\omega)) d\mu(\omega), \quad f \in L^p(\mu; X).$$

Ukažte, že Φ_g je spojitý lineární funkcionál na $L^p(\mu; X)$ a $\|\Phi_g\| \leq \|g\|_{p^*}$.

(3) Ukažte, že $\|\Phi_g\| = \|g\|_{p^*}$ a z toho odvoďte, že $\Phi : g \mapsto \Phi_g$ je lineární izometrie $L^{p^*}(\mu; X^*)$ dp $L^p(\mu, X)^*$.

(4) Ukažte, že zobrazení Φ je na $L^p(\mu, X)^*$, pokud $p \in [1, \infty)$ a $X = c_0$ nebo $X = \ell^q$ pro nějaké $q \in (1, \infty)$.

(5) Ukažte, že zobrazení Φ je na $L^p(\mu, X)^*$, pokud $p \in [1, \infty)$ a (Ω, Σ, μ) je množina \mathbb{N} s počítací mírou.

(6) Ukažte, že zobrazení Φ není na, pokud (Ω, Σ, μ) je interval $[0, 1]$ s Lebesgueovou mírou a $X = \ell^1$.

Návod: (1) Nejprve je třeba ukázat měřitelnost h . Je-li g jednoduchá funkce, je to snadné. K důkazu obecného případu použijte existenci posloupnosti jednoduchých integrovatelných funkcí konvergující skoro všude ke g . Nerovnost odvoďte z Hölderovy nerovnosti. (2) plyne z (1). (3) Protože spočetně hodnotové funkce jsou husté v $L^{p^*}(\mu; X^*)$, stačí rovnost dokázat pro spočetně hodnotovou g . Jedna nerovnost plyne z (2), stačí dokázat opačnou. Necht' $\varepsilon > 0$. Podle skalární verze existuje nezáporná měřitelná funkce h splňující $\|h\|_p = 1$ a $\int_{\Omega} h(\omega) \|g(\omega)\| d\mu(\omega) > \|g\|_{p^*} - \varepsilon$. Necht' $g = \sum_{j=1}^{\infty} x_j^* \chi_{E_j}$, kde $x_j^* \in X^*$ a $E_j \in \Sigma$ splňují $0 < \mu(E_j) < \infty$ pro každé $j \in \mathbb{N}$. Zvolme posloupnost kladných čísel $\delta_j > 0$, která jsou dostatečně malá a najděme $x_j \in X$ splňující $\|x_j\| = 1$ a $x_j^*(x_j) > \|x_j^*\| - \delta_j$. Vezměte $f = \sum_{j=1}^{\infty} h x_j \chi_{E_j}$. Pak $f \in L^p(\mu; X)$, $\|f\|_p = 1$ a $\Phi_g(f) > \|g\|_{p^*} - 2\varepsilon$. (4) Použijte Příklady 22 a 23 a metodu důkazu reprezentace duálů k c_0 a ℓ^p . (5) Použijte Příklad III.16(2). (6) S použitím Příkladu 23 a metody důkazu reprezentace duálu k ℓ^1 popište duál k $L^p(\mu; \ell^1)$ a porovnejte ho s prostorem $L^{p^*}(\mu; \ell^\infty)$ popsáním v Příkladu 24.