

## VI.4 Konstrukce holomorfních a meromorfních funkcí

**Značení.** Pro  $z \in \mathbb{C}$  polořme

$$\mathcal{E}_0(z) = 1 - z,$$

$$\mathcal{E}_m(z) = (1 - z) \exp \left( z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^m}{m} \right), \quad m \in \mathbb{N}.$$

**Lemma 17.** Pro  $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  a  $|z| \leq 1$  platí  $|1 - \mathcal{E}_m(z)| \leq |z|^{m+1}$ .

**Věta 18** (Weierstrassova věta o faktorizaci). Nechtě  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,  $(z_j)$  je posloupnost komplexních čísel,  $z_j \neq 0$  pro  $j \in \mathbb{N}$  a  $z_j \rightarrow \infty$ . Polořme

$$f(z) = z^k \prod_{j=1}^{\infty} \mathcal{E}_{j-1} \left( \frac{z}{z_j} \right), \quad z \in \mathbb{C}.$$

Pak uvedený nekonečný součin konverguje lokálně stejnoměrně na  $\mathbb{C}$ ,  $f$  je celá funkce, která má v nule kořen násobnosti  $k$  (pokud  $k = 0$ , není 0 kořenem) a  $z_j$ ,  $j \in \mathbb{N}$ , jsou všechny její nenulové kořeny, přičemž násobnost kořenu  $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  je rovna počtu výskytů čísla  $w$  v posloupnosti  $(z_j)$ .

Navíc, každá celá funkce s týmiž kořeny včetně násobnosti je tvaru  $f(z) \cdot e^{L(z)}$ , kde  $L$  je celá funkce.

**Důsledek 19.** Každá funkce meromorfní na  $\mathbb{C}$  je podílem dvou celých funkcí.

**Věta 20** (Mittag-Leffler). Nechtě  $(z_j)$  je prostá posloupnost komplexních čísel splňující

$$0 = |z_0| < |z_1| \leq |z_2| \leq |z_3| \leq \dots$$

a  $z_j \rightarrow \infty$ ;  $H_0, H_1, H_2, \dots$  jsou polynomy splňující  $H_j(0) = 0$  pro  $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Pak existují polynomy  $P_1, P_2, \dots$  takové, že poloříme-li

$$f(z) = H_0 \left( \frac{1}{z} \right) + \sum_{j=1}^{\infty} \left( H_j \left( \frac{1}{z - z_j} \right) - P_j(z) \right),$$

pak uvedená řada konverguje v následujícím smyslu: Pro každé  $R > 0$  tato řada, z níž vynecháme ty členy, pro které je  $|z_j| \leq R$ , konverguje stejnoměrně na  $\overline{U(0, R)}$ . Výsledná funkce  $f$  je meromorfní na  $\mathbb{C}$ , je holomorfní na  $\mathbb{C} \setminus \{z_j : j \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ , hlavní část Laurentova rozvoje v prstencovém okolí bodu  $z_j$  je  $H_j \left( \frac{1}{z - z_j} \right)$  (pro  $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ).

**Věta 21** (Cauchyova metoda). Necht'  $f$  je meromorfní na  $\mathbb{C}$ , póly má právě v bodech  $z_j$ ,  $j \in \mathbb{N}$ , kde  $(z_j)$  je prostá posloupnost splňující  $z_j \rightarrow \infty$  a

$$0 < |z_1| \leq |z_2| \leq |z_3| \leq \dots,$$

přičemž hlavní část Laurentova rozvoje v prstencovém okolí bodu  $z_j$  je  $H_j(\frac{1}{z-z_j})$ , kde  $H_j$  je polynom (pro  $j \in \mathbb{N}$ ). Předpokládejme dále, že existují posloupnosti kladných čísel  $(R_n)$  a  $(\varepsilon_n)$ ,  $C > 0$  a  $\Lambda \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  tak, že platí

- $R_n \rightarrow \infty$ ,  $\varepsilon_n \rightarrow 0$ ;
- $|f(z)| \leq \varepsilon_n |z|^{\Lambda+1}$  pro  $|z| = R_n$ .

Pak platí

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\Lambda} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{|z_j| < R_n} (H_j(\frac{1}{z-z_j}) - P_j(z)), \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{z_j : j \in \mathbb{N}\},$$

kde  $P_j$  je součet prvních  $\Lambda + 1$  členů Taylorova rozvoje funkce  $H_j(\frac{1}{z-z_j})$  v okolí bodu 0.

**Poznámka.** Analogie Věty 18, Důsledku 19 a Věty 20 platí pro libovolnou vlastní otevřenou podmnožinu  $\overline{\mathbb{C}}$ . Příslušnou analogii Věty 20 dokážeme v kapitole VII jinými metodami; analogie Věty 18 a Důsledku 19 budou obsahem jednoho z referátů. Věta 21 je specifická pro  $\mathbb{C}$ .