

VIII.4 Zobecněný Riemannův integrál

Lemma 15. *Nechť funkce f má Riemannův integrál přes interval $\langle a, b \rangle$. Pak platí*

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f.$$

Lemma 16. *Nechť $a, b \in \mathbf{R}^*$, $a < b$, funkce f nechť je definována na (a, b) . Jestliže pro nějaké $c \in (a, b)$ je definován výraz*

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f$$

(tj. pokud obě limity existují a jejich součet je definován), pak pro každé $d \in (a, b)$ platí

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^d f + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_d^x f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f,$$

tj. výraz na levé straně je definován a rovná se výrazu na pravé straně.

Definice. *Nechť $a, b \in \mathbf{R}^*$, $a < b$, funkce f nechť je definována na (a, b) . Nechť $c \in (a, b)$. **Zobecněný Riemannův integrál funkce f přes interval (a, b)** definujeme vzorcem*

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f,$$

je-li výraz na pravé straně definován. Pokud výraz na pravé straně není definován, pak říkáme, že zobecněný Riemannův integrál funkce f přes interval (a, b) **neexistuje**.

Poznámky: (1) Existence ani hodnota zobecněného Riemannova integrálu přes (a, b) nezávisí na volbě $c \in (a, b)$.

(2) Jestliže f má Riemannův integrál přes interval $\langle a, b \rangle$, má i zobecněný Riemannův integrál přes interval (a, b) a hodnoty těchto integrálů jsou stejné.

(3) Zobecněný Riemannův integrál může mít i hodnotu $+\infty$ nebo $-\infty$. V případě, že hodnotou zobecněného Riemannova integrálu f přes (a, b) je reálné číslo, říkáme, že tento integrál **konverguje**. Pokud je jeho hodnotou $+\infty$ nebo $-\infty$, říkáme, že **diverguje**.

Věta 17 (vlastnosti zobecněného Riemannova integrálu). Necht' f a g jsou funkce, které mají zobecněný Riemannův integrál přes interval (a, b) .

(i) Je-li $\langle c, d \rangle \subset (a, b)$, pak funkce f má Riemannův integrál přes interval $\langle c, d \rangle$.

(ii) Necht' $\alpha \in \mathbf{R}$. Pak i funkce αf má zobecněný Riemannův integrál přes interval (a, b) . Je-li $\alpha = 0$, je tento integrál nulový, je-li $\alpha \neq 0$, platí

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

(iii) Jestliže součet $\int_a^b f + \int_a^b g$ je definován, pak i funkce $f + g$ má zobecněný Riemannův integrál přes (a, b) a platí

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

(iv) Necht' platí $f(x) \geq g(x)$ pro každé $x \in (a, b)$. Pak

$$\int_a^b f \geq \int_a^b g.$$

(v) Funkce $|f|$ má zobecněný Riemannův integrál přes (a, b) a platí

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Věta 18. Necht' f je spojitá funkce na intervalu (a, b) (kde $a, b \in \mathbf{R}^*$), necht' F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) . Pak f má zobecněný Riemannův integrál přes (a, b) , právě když existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a rozdíl těchto limit je definován. V tom případě platí

$$\int_a^b f = \left(\lim_{x \rightarrow b-} F(x) \right) - \left(\lim_{x \rightarrow a+} F(x) \right).$$

Poznámka: Výraz na pravé straně se značí $[F]_a^b$ a nazývá se **zobecněným přírůstkem funkce F přes interval (a, b)** .

Věta 19 (per partes pro určitý integrál). Necht' funkce f a g mají na intervalu (a, b) spojitou první derivaci. Pak platí

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg',$$

jestliže je výraz na pravé straně definován.

Věta 20 (substituce pro určitý integrál). Necht' f je spojitá na intervalu (a, b) , funkce φ necht' má na intervalu (α, β) spojitou derivaci, je ryze monotónní a zobrazuje interval (α, β) na interval (a, b) . Pak

$$\int_a^b f = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi) \cdot |\varphi'|,$$

jestliže alespoň jeden z integrálů existuje.