

V.8 Konkávní funkce

Definice. Nechť $M \subset \mathbf{R}^n$. Řekneme, že M je **konvexní** množina, jestliže platí:

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in M \quad \forall t \in \langle 0, 1 \rangle : \quad t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in M.$$

Věta 19 (o střední hodnotě). Nechť $G \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní otevřená množina, $f \in C^1(G)$, $\mathbf{a} \in G, \mathbf{b} \in G$. Pak existuje $t_0 \in (0, 1)$ tak, že

$$f(\mathbf{a}) - f(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(t_0\mathbf{a} + (1-t_0)\mathbf{b})(a_i - b_i).$$

Definice. Nechť $M \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní množina a funkce f je definována na M . Řekneme, že f je

- **konkávní** funkce na M , jestliže
 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \quad \forall t \in \langle 0, 1 \rangle : \quad f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b})$,
- **ryze konkávní** funkce na M , jestliže
 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \quad \forall t \in (0, 1) : \quad f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b})$.

Poznámky. (1) Analogicky se definují **konvexní** a **ryze konvexní** funkce. Funkce f je konvexní (ryze konvexní), právě když $-f$ je konkávní (ryze konkávní). Následující věty jsou formulovány pro konkávní a ryze konkávní funkce, jejich zřejmě analogie platí pro konvexní a ryze konvexní funkce.

(2) f je (ryze) konkávní na konvexní množině M , právě když je (ryze) konkávní na každé úsečce obsažené v M . To je ekvivalentní tomu, že pro každé dva body $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, je funkce $t \mapsto f(\mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}))$ (ryze) konkávní na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.

Věta 20. Nechť funkce f je konkávní na otevřené konvexní množině G . Pak f je spojitá na G .

Věta 21. Nechť funkce f je konkávní na konvexní množině M . Pak pro každé $\alpha \in \mathbf{R}$ je množina $Q_\alpha = \{\mathbf{x} \in M; f(\mathbf{x}) \geq \alpha\}$ konvexní.

Věta 22 (charakterizace konkávních funkcí třídy C^1). Nechť $G \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in C^1(G)$. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní.

- Funkce f je konkávní na G .
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G : \quad f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i)$.
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G : \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{y}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right)(y_i - x_i) \leq 0$.

Důsledek. Nechť $G \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní otevřená množina, $f \in C^1(G)$ je konkávní funkce a $\mathbf{x} \in G$. Jestliže v bodě \mathbf{x} jsou všechny parciální derivace prvního řádu funkce f nulové, pak f nabývá v \mathbf{x} maxima na G .

Věta 23 (charakterizace ryze konkávních funkcí třídy C^1). Nechť $G \subset \mathbf{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in C^1(G)$. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní.

- Funkce f je ryze konkávní na G .
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G, \mathbf{x} \neq \mathbf{y} : \quad f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) < \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i)$.
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G, \mathbf{x} \neq \mathbf{y} : \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{y}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right)(y_i - x_i) < 0$.