

Matematická analýza pro fyziky II

Robert Černý & Milan Pokorný

29. dubna 2019

Obsah

8	Obyčejné diferenciální rovnice	1
8.1	Limita a spojitost funkcí více proměnných	1
8.2	Základní pojmy	3
8.3	Základní existenční věty	7
8.4	Skalární rovnice 1. řádu	10
8.4.1	Rovnice $y' = f(x)$	10
8.4.2	Rovnice $y' = g(y)$	11
8.4.3	Rovnice $y' = f(x)g(y)$	17
8.4.4	Homogenní diferenciální rovnice	18
8.4.5	Rovnice, které lze převést na homogenní diferenciální rovnici	22
8.4.6	Lineární diferenciální rovnice prvního řádu	26
8.4.7	Bernoulliho rovnice	29
8.5	Lineární rovnice n -tého řádu	34
8.5.1	Homogenní rovnice: obecné výsledky	37
8.5.2	Nehomogenní rovnice. Variace konstant	42
8.5.3	Splnění počátečních podmínek	44
8.5.4	Homogenní rovnice s konstantními koeficienty	45
8.5.5	Metoda speciální pravé strany pro rovnice s konstantními koeficienty	50
8.5.6	Eulerova rovnice	52
8.6	Další typy rovnic vyšších řádů	54
8.6.1	Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(x)$	55
8.6.2	Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(x, y^{(n-1)})$	56
8.6.3	Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(y^{(n-2)})$	57
8.6.4	Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n-1)})$	58
8.6.5	Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{n-1})$	59
9	Číselné řady	63
9.1	Základní pojmy	63
9.2	Řady s nezápornými členy	68
9.3	Řady s obecnými členy	76
9.4	Přerovnávání řad a součin řad	79
9.5	Aritmetické průměry, cesarovské součty	83
9.6	Dodatek:Kondenzační kritérium	85

9.7	Dodatek 2: nekonečné součiny	86
10	Mocninné řady	89
10.1	Základní vlastnosti mocninných řad	89
10.2	Mocninné a Taylorovy řady	94
10.3	Řešení diferenciálních rovnic pomocí řad	97
10.4	Zavedení funkcí sin, cos a exp	98
10.5	Dodatek: derivace řady podle komplexní proměnné	102
11	Metrické prostory	105
11.1	Základní pojmy	105
11.2	Konvergence posloupnosti v metrickém prostoru	112
11.3	Podmnožiny metrického prostoru	115
11.4	Hustota a separabilita	121
11.5	Úplné metrické prostory	122
11.6	Omezené a kompaktní množiny	126
11.7	Pokrývací věty	128
11.8	Banachova věta o kontrakci	131
11.9	Limita a spojitost na metrických prostorech	133
11.10	Dodatek: Hustota polynomů a separabilita $C([a, b])$	138
11.11	Dodatek: Existenční věty pro ODR 1.řádu	142
12	Dif. počet funkcí více proměnných	149
12.1	Parciální derivace, totální diferenciál	149
12.2	Derivace vyšších řádů, Taylorův vzorec	161
12.3	Potenciál vektorového pole	164
12.4	Věta o implicitní funkci	169
12.5	Rovnice ve tvaru totálního diferenciálu	180
12.6	Lokální extrémů funkcí více proměnných	188
12.7	Globální extrémů funkcí více proměnných	193
12.8	Věta o regulárním zobrazení	202
13	Klasický variační počet	207
13.1	Úvod	207
13.2	Abstraktní teorie	208
13.3	Funkcionály reprezentované integrálem	214
13.3.1	Euler–Lagrangeova rovnice	215
13.3.2	Euler–Lagrangeova rovnice pro funkcionály speciálních typů	223
13.3.3	Nutné a postačující podmínky existence extrémů funkcionálů reprezentovaných integrálem	226
13.3.4	Konjugované body a Jacobiho rovnice	228
13.3.5	Vázané extrémů	239
13.3.6	Postačující podmínka pro globální extrém	241
13.4	Klasické úlohy variačního počtu	245
13.4.1	Nejkratší spojnice v rovině	245
13.4.2	Problém princezny Dido	245

13.4.3 Úloha o minimální radiálně symetrické ploše	249
13.4.4 Úloha o zavěšeném řetězu	252
13.4.5 Úloha o brachystochroně	255
13.5 Aplikace variačního počtu v klasické mechanice	256
13.6 Spojitá závislost na datech pro lineární ODR	261
A Významní matematici 2	271

Kapitola 8

Obyčejné diferenciální rovnice

V kapitole o primitivních funkcích jsme udělali krátkou exkurzi do problematiky diferenciálních rovnic. V této kapitole značně rozšíříme počet typů diferenciálních rovnic, které umíme řešit a navíc přidáme i důkazy, které jsme zůstali dlužni.

Poznamenejme, že v této kapitole budeme teorii budovat od začátku a nebudeme používat výsledky o diferenciálních rovnicích z kapitoly o primitivních funkcích, čtenář si je tedy nemusí zopakovat. Na druhou stranu, pokud čtenář preferuje pečlivé a důkladné seznámení se se všemi pojmy dříve, než je bude používat, doporučujeme mu, aby si nejprve přečetl část kapitoly o metrických prostorech, kde jsou zdefinovány a studovány některé důležité pojmy z teorie funkcí více proměnných, které zde budeme používat (zejména limitu a spojitost).

Pro ostatní čtenáře alespoň tyto základní pojmy stručně představíme.

Od této kapitoly výklad teorie poněkud zrychlíme. Při citování použitých vět již nebudeme uvádět podrobné ověření jejich předpokladů mimo situace, kdy je ověření obtížné, jinak práci přenecháme (často bez varování) čtenáři. Dále budeme v odhadech používat C jako (nejčastěji multiplikativní) neškodnou konstantu, která může z řádku na řádek měnit svoji hodnotu (vzpomeňte si na důkaz aritmetiky limit, kde jsme chtěli vždy zkoumanou veličinu odhadnout násobkem ε a na velikosti multiplikativní konstanty nezáleželo). Dále symbol $+\infty$ budeme zkracovat na ∞ , kdykoliv bude jasné, že pracujeme na \mathbb{R}^* .

8.1 Limita a spojitost funkcí více proměnných

Zde si uvedeme jen nejdůležitější definice a výsledky (bez důkazů, podrobnosti jsou v kapitole o metrických prostorech). Na \mathbb{R}^N budeme používat eukleidovskou vzdálenost

$$|x - y| := \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_N - y_N)^2}.$$

Pro bod $x \in \mathbb{R}^N$ a $\varepsilon > 0$ definujeme ε -ové okolí bodu x jako

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x) := \{y \in \mathbb{R}^N : |y - x| < \varepsilon\}.$$

Prstencové ε -ové okolí zavádíme předpisem $\mathcal{P}_\varepsilon(x) = \mathcal{U}_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$. Je-li $A \subset \mathbb{R}^N$, o bodu $x_0 \in \mathbb{R}^N$ říkáme, že je *hromadným bodem* množiny A , jestliže každé jeho prstencové okolí má neprázdný průnik s A .

Definice 8.1.1 (Otevřená množina). Řekneme, že $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je *otevřená množina*, jestliže ke každému jejímú bodu existuje okolí, které je celé obsažené v Ω .

Definice 8.1.2 (Limita funkce). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadným bodem D_f a $y_0 \in \mathbb{R}$. Řekneme, že zobrazení f má v bodě x_0 *limitu* y_0 , jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \cap D_f \implies f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(y_0).$$

V takovém případě píšeme $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ nebo $f(x) \rightarrow y_0$ pro $x \rightarrow x_0$.

Definice 8.1.3 (Spojitost). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ a $x_0 \in D_f$. Řekneme, že zobrazení f je v bodě x_0 *spojité*, jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad x \in \mathcal{U}_\delta(x_0) \cap D_f \implies f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(f(x_0)).$$

Cvičení 8.1.4. Rozmyslete si, že zobrazení $f: (x, y) \mapsto x$ je spojitě všude na \mathbb{R}^2 .

Věta 8.1.5 (Aritmetika limit). Nechť $f, g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadným bodem $D_f \cap D_g$. Nechť $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$ a $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}$. Pak

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = A + B$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB$
- (iii) pokud $B \neq 0$, platí $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$.

Poznámka 8.1.6. Automaticky také platí aritmetika spojitosti.

Poznámka 8.1.7. Pojmy limita a spojitost se dají rozšířit rovněž na $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$. Spojitost zadaná pomocí okolí je ekvivalentní tomu, že je spojitá každá složka f . Podobně pro limitu.

Věta 8.1.8 (O spojitosti složeného zobrazení). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ a $x_0 \in \mathbb{R}^N$. Je-li f spojitě v $x_0 \in \mathbb{R}^N$ a g spojitě v $f(x_0)$, pak $g \circ f$ je spojitě v x_0 .

Věta 8.1.9 (O limitě složeného zobrazení). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ a $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadným bodem $D_{g \circ f}$. Nechť $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in \mathbb{R}^m$, $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = z_0 \in \mathbb{R}^k$ a je splněna alespoň jedna z podmínek:

- (i) existuje prstencové okolí bodu x_0 , kde vnitřní zobrazení f nenabývá své limitní hodnoty y_0
- (ii) vnější zobrazení g je spojitě v bodě y_0 .

Pak $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = z_0$.

Připomeňme ještě, že pro $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^N$ a $i \in \{1, \dots, N\}$ definujeme i -tou *parciální derivaci* funkce f v bodě x předpisem

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_N) - f(x)}{h},$$

pokud existuje vlastní limita napravo. V případě vektorové funkce¹ $\mathbf{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$

¹Vektorové funkce budeme značit tučným fontem.

se analogicky zavádí i -tá parciální derivaci j -té složky funkce \mathbf{f} a značí se $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$.

8.2 Základní pojmy

Definice 8.2.1 (Obyčejná diferenciální rovnice). Nechť $n \in \mathbb{N}$ a $f: \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$. Pak

$$f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (8.2.1)$$

se nazývá *skalární obyčejná diferenciální rovnice n -tého řádu*.

Příklad 8.2.2. (i) Do našeho případu spadá třeba rovnice matematického kyvadla $y'' + y = 0$.

(ii) Rovnice vedení tepla $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$ je *parciální diferenciální rovnice*. Tímto typem rovnic se zatím nebudeme zabývat. Poznamenejme alespoň, že teorie parciálních diferenciálních rovnic je komplikovanější než teorie rovnic obyčejných.

(iii) Model *dravec–kořist* s parametry $a, b, c, d > 0$

$$\begin{aligned} x'(t) &= ax(t) - bx(t)y(t) \\ y'(t) &= -cy(t) + dx(t)y(t) \end{aligned}$$

je systém obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu. Systémy se někdy dají převádět na jednu rovnici vyššího řádu. Tím se budeme také zabývat.

Definice 8.2.3 (Řešení obyčejné diferenciální rovnice). Funkci $y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ nazveme *řešením obyčejné diferenciální rovnice (8.2.1)*, jestliže

- y má na (a, b) vlastní derivace n -tého řádu
- pro všechna $x \in (a, b)$ platí (8.2.1).

Často bude možné rovnici (8.2.1) přepsat do *tvaru rozřešeného vzhledem k nejvyšší derivaci*

$$y^{(n)} = g(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad (8.2.2)$$

kde $g: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$.

Budeme zde také uvažovat systémy obyčejných diferenciálních rovnic, ale pouze prvního řádu a rozřešené vzhledem k první derivaci. Pro vektorovou funkci $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ budeme používat značení $\mathbf{y}' = (y'_1, \dots, y'_m)$.

Definice 8.2.4 (Systém obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu). Nechť $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Pak

$$\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$$

je *systém obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu* (rozřešený vzhledem k první derivaci) pro m neznámých funkcí y_1, \dots, y_m . Jeho řešením na (a, b) nazveme $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m): (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^m$ splňující

- y_1, \dots, y_m mají na (a, b) vlastní derivace (prvního řádu)
- pro všechna $x \in (a, b)$ platí $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{y}(x))$.

Uvedme si nyní několik příkladů. Budou ilustrovat, že obyčejné diferenciální rovnice mohou sloužit k popisu různých reálných problémů.

Příklad 8.2.5. (i) Rovnice popisující radioaktivní rozpad

Nechť $N = N(t)$ je počet radioaktivních částic v čase t . Nechť jejich úbytek (počet radioaktivních rozpadů) je přímo úměrný jejich počtu, tedy

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t), \quad \lambda > 0.$$

Zřejmě tuto rovnici řeší $N(t) = Ce^{-\lambda t}$, kde C je libovolná (vzhledem k fyzikální úloze kladná) konstanta. Známe-li počet částic v čase $t = t_0$, tedy $N(t_0) = N_0$, pak

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda(t-t_0)}$$

řeší naši úlohu. Později si ukážeme, že toto řešení je jediné a řeší rovnici pro libovolné $t \in \mathbb{R}$, i když v dané úloze nás typicky zajímají pouze hodnoty $t \geq t_0$.

(ii) Rovnice popisující růst počtu obyvatel

(a) *neomezený růst*

V tomto případě je přírůstek počtu obyvatel přímo úměrný počtu obyvatel v daném okamžiku, úloha je tedy dosti podobná předchozí úloze o radioaktivním rozpadu. Potom

$$\frac{dN(t)}{dt} = \alpha N(t), \quad \alpha > 0.$$

Analogicky jako výše, pokud známe $N_0 = N(t_0)$, pak

$$N(t) = N_0 e^{\alpha(t-t_0)}.$$

Všimněme si, že $N(t) \rightarrow \infty$ pro $t \rightarrow \infty$.

(b) *omezený růst*

Předchozí úloha měla tu nepříjemnou vlastnost, že počet obyvatel mohl růst nade všechny meze, což není příliš reálné. Proto se častěji předpokládá, že počet obyvatel nemůže překročit jistou předem danou mez P_{\max} . Odpovídající rovnice je potom například

$$\frac{dN(t)}{dt} = \alpha N(t)(P_{\max} - N(t)), \quad \alpha > 0.$$

Je-li opět $N_0 = N(t_0) \in (0, P_{\max}]$ (jinak úloha nemá rozumný smysl), lze ukázat, že

$$N(t) = \frac{P_{\max} N_0}{N_0 + (P_{\max} - N_0)e^{-P_{\max} \alpha (t-t_0)}}.$$

Dostali jsme takzvanou logistickou křivku. Zřejmě $N(t) \rightarrow P_{\max}$ pro $t \rightarrow \infty$. V obou případech je řešení určeno jednoznačně.

(iii) Pohyb hmotného bodu

(a) *jednodimenzionální případ*

Jestliže se hmotný bod může pohybovat pouze ve směru osy x a označíme-li $x(t)$ jeho polohu v čase t , potom $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ je jeho okamžitá rychlost a $a(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$

jeho okamžité zrychlení. Působí-li na hmotný bod síla $f(t, x, v) = f\left(t, x(t), \frac{dx(t)}{dt}\right)$, dostáváme z Newtonova pohybového zákona rovnici

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = f\left(t, x(t), \frac{dx(t)}{dt}\right),$$

kde m je hmotnost částice. Aby mohlo být řešení dáno jednoznačně, je třeba předepsat dvě hodnoty (rovnice je druhého řádu), tedy

$$x(t_0) = x_0, \quad \frac{dx(t_0)}{dt} = v_0.$$

Je možno ukázat, že za jistých (fyzikálně rozumných) předpokladů na funkci f je řešení skutečně dáno jednoznačně. Ovšem nalézt řešení není jednoduché a záleží na tvaru této funkce. Dokonce v mnohých případech nelze čekat, že by řešení šlo vyjádřit pomocí elementárních funkcí.

(b) *třídimenzionální případ*

V tomto případě již nevystačíme s jednou obyčejnou diferenciální rovnicí (tedy skalární rovnicí) a musíme uvažovat systém tří obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu. Dostáváme

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 x_1(t)}{dt^2} &= F_1\left(t, \mathbf{x}(t), \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}\right) \\ m \frac{d^2 x_2(t)}{dt^2} &= F_2\left(t, \mathbf{x}(t), \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}\right) \\ m \frac{d^2 x_3(t)}{dt^2} &= F_3\left(t, \mathbf{x}(t), \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}\right). \end{aligned}$$

Případně je možno tento systém zapsat vektorově

$$m \frac{d^2 \mathbf{x}(t)}{dt^2} = \mathbf{F}\left(t, \mathbf{x}(t), \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}\right),$$

kde $\mathbf{F}: \mathbb{R}^7 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Opět je třeba zadat počáteční polohu a počáteční rychlost, tedy

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, \quad \frac{d\mathbf{x}(t_0)}{dt} = \mathbf{v}_0.$$

Řešení této úlohy je již velice komplikované i pro relativně jednoduchou funkci \mathbf{F} .

Ukažme si ještě, jak se převádějí systémy rovnic prvního řádu na jednu rovnici vyššího řádu a naopak. Rovnici typu (8.2.1) lze na systém rovnic 1. řádu převést vždy, stejně tak rovnici typu (8.2.2) lze převést vždy na systém rovnic prvního řádu rozřešený vzhledem k první derivaci. Naopak, systém rovnic 1. řádu lze na rovnici n -tého řádu převést pouze v některých případech.

Příklad 8.2.6. (i) Uvažme rovnici $y''' + 2y'' + y' = 2yx$. Označme $u = y$, $v = y'$ a $w = y''$. Dostáváme

$$\begin{aligned} u' &= v \\ v' &= w \\ w' &= -2w - v + 2xu. \end{aligned}$$

Podobně rovnici typu (8.2.2) lze na systém rovnic prvního řádu (rozřešený vzhledem k derivaci 1. řádu) převést vždy. Stačí použít analogický postup jako výše.

Obecně pak u rovnice n -tého řádu tvaru $f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ definujeme $u_k = y^{(k-1)}$ pro $k = 1, \dots, n$. Prvních $n - 1$ rovnic má tvar $u'_k = u_{k+1}$ a poslední je $f(x, u_1, u_2, \dots, u_n, u'_n) = 0$.

(ii) Uvažme systém

$$\begin{aligned}u'_1 &= u_1 + u_2 + u_3 \\u'_2 &= u_1 - u_2 - u_3 \\u'_3 &= u_1 + u_2 - u_3.\end{aligned}$$

Budeme se postupně zbavovat u_2 a u_3 . Nejprve si z první rovnice vyjádříme u_2 a ještě jej zderivujeme.

$$u_2 = u'_1 - u_1 - u_3 \quad \text{a} \quad u'_2 = u''_1 - u'_1 - u'_3.$$

Výsledek dosadíme do zbývajících rovnic

$$\begin{aligned}u''_1 - u'_1 - u'_3 &= u_1 - (u'_1 - u_1 - u_3) - u_3 \\u'_3 &= u_1 + (u'_1 - u_1 - u_3) - u_3,\end{aligned}$$

což po zjednodušení dává

$$\begin{aligned}u'_3 &= u''_1 - 2u_1 \\u'_3 &= u'_1 - 2u_3.\end{aligned}$$

Odtud se dá vyjádřit u_3 , které opět zderivujeme

$$u_3 = \frac{1}{2}(-u''_1 + u'_1 + 2u_1) \quad \text{a} \quad u'_3 = \frac{1}{2}(-u'''_1 + u''_1 + 2u'_1).$$

To dosadíme do poslední rovnice

$$\frac{1}{2}(-u'''_1 + u''_1 + 2u'_1) = u'_1 - (-u''_1 + u'_1 + 2u_1).$$

Teď už stačí jen výsledek zjednodušit a dostáváme

$$u'''_1 + u''_1 - 2u'_1 - 4u_1 = 0.$$

Postup z bodu (ii) z předchozího příkladu lze použít v případě soustavy rovnic

$$u'_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}u_j + f_i(x) \quad i = 1, \dots, n$$

s konstantními koeficienty $a_{ij} \in \mathbb{R}$ a f_i majícími konečnou derivaci řádu $n - 1$. Nefunguje ale vždy. Například soustava

$$\begin{aligned}u'_1 &= u_1 \\u'_2 &= u_2\end{aligned}$$

se takto přepsat nedá (v tomto jednoduchém případě je však nesmyslné se o takový přepis pokoušet).

8.3 Základní existenční věty

V následujícím textu budeme teorii budovat pro systémy rovnic prvního řádu ve tvaru

$$\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$$

(kde $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ a hledáme $\mathbf{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$). Vzhledem k úzkému vztahu mezi systémem a rovnicí vyššího řádu (jak jsme si naznačili výše) se získané výsledky po odpovídající transformaci dají snadno převést i na skalární rovnice vyššího řádu rozřešené vzhledem k nejvyšší derivaci (tj. ve tvaru (8.2.2)).

Definice 8.3.1 (Cauchyova úloha). *Cauchyovou úlohou* pro rovnici $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ na (a, b) , kde $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, rozumíme hledání vektorové funkce $\mathbf{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ splňující $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{y}(x))$ na (a, b) a $\mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0$, kde $x_0 \in (a, b)$ a $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$ jsou zadané hodnoty, které patří do definičního oboru \mathbf{F} .

Poznámka 8.3.2. Řešení \mathbf{y}_1 na (a_1, b_1) a \mathbf{y}_2 na (a_2, b_2) budeme považovat za stejná jen v případě, že $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$ a $\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_2$ na (a_1, b_1) . Naopak, pokud $(a_1, b_1) \neq (a_2, b_2)$, řešení považujeme za různá i v případě, že $\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_2$ na $(a_1, b_1) \cap (a_2, b_2)$. Tento přístup má dobrý důvod: řešení diferenciálních rovnic totiž občas v některých bodech ztrácejí jednoznačnost (mohou se „rozvětvit“).

Definice 8.3.3 (Prodloužení řešení). Nechť \mathbf{y}_1 řeší rovnici $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ na intervalu (a_1, b_1) a \mathbf{y}_2 ji řeší na intervalu (a_2, b_2) . Jestliže $(a_1, b_1) \subset (a_2, b_2)$ a $\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_2$ na (a_1, b_1) , řekneme, že \mathbf{y}_2 je *prodloužením řešení* \mathbf{y}_1 (na interval (a_2, b_2)). Řešení se nazývá *maximální*, jestliže se nedá prodloužit.

Existenci a jednoznačnost dávají následující dva výsledky, na jejichž důkaz zatím nejsme vybaveni (oba důkazy jsou uvedeny v kapitole o metrických prostorech).

Věta 8.3.4 (Peanova existenční věta). *Nechť $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ a $(x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$. Pak existuje $\delta > 0$ tak, že na intervalu $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje řešení Cauchyovy úlohy pro systém rovnic $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ s počáteční podmínkou $\mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0$.*

Věta 8.3.5 (Picard–Lindelöfova existenční věta). *Nechť $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ a \mathbf{F} je na Ω lokálně lipschitzovská vzhledem k poslední n -tici proměnných. Pak existuje $\delta > 0$ tak, že na intervalu $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje právě jedno řešení Cauchyovy úlohy pro systém rovnic $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ s počáteční podmínkou $\mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0$.*

Poznámka 8.3.6. Jednoznačnost ve větě výše (a také všude dál) chápeme v následujícím smyslu. Libovolné jiné řešení procházející bodem (x_0, \mathbf{y}_0) se shoduje s daným řešením na průniku definičních oborů.

Poznámka 8.3.7. Lokální lipschitzovská vzhledem k poslední n -tici proměnných znamená, že pro každé $(x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ existují $K > 0$ a $\delta > 0$ taková, že

$$|\mathbf{F}(x, \mathbf{y}_1) - \mathbf{F}(x, \mathbf{y}_2)| \leq K|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2| \quad \text{kdykoliv } (x, \mathbf{y}_1), (x, \mathbf{y}_2) \in \mathcal{U}_\delta((x_0, \mathbf{y}_0)).$$

Poznámka 8.3.8. Lipschitzovskost je podstatně přísnější podmínka než lokální lipschitzovskost. Uvažte třeba funkci $x \mapsto x^2$.

Poznámka 8.3.9. Připomeneme-li si konstrukci, pomocí níž se z úlohy $y^{(n)} = g(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ získá systém rovnic prvního řádu, máme

$$\mathbf{F}(x, \mathbf{u}) = (u_2, u_3, \dots, u_n, g(x, \mathbf{u})).$$

Pro aplikaci Picard–Lindelöfovy existenční věty (Věta 8.3.5) se pak hodí následující pozorování. Funkce \mathbf{F} je spojitá na Ω právě tehdy, když g je spojitá na Ω . Podobně pro lokální lipschitzovskost v poslední n -tici proměnných. Správná sada počátečních podmínek (kompatibilní s teorií systémů rovnic) je $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$.

Jak bylo řečeno výše, obě existenční věty budou dokázány v příští kapitole. My si v následujícím příkladu budeme ilustrovat metodu důkazu na jednoduché úloze

$$y' = y, \quad y(0) = 1. \quad (8.3.1)$$

Příklad 8.3.10. (i) Nejprve ilustrujme na řešení úlohy (8.3.1) důkaz Peanovy existenční věty (Věta 8.3.4). Předpoklady věty jsou zřejmě splněny. Vezměme interval $[0, 1]$ a rozdělme ho na n stejných dílků délky $\frac{1}{n}$. Vezměme interval $[0, \frac{1}{n}]$ a řešme

$$\frac{1}{n}y' = 1, \quad \frac{1}{n}y(0) = 1.$$

Volba pravé strany rovnice 1 souvisela s tím, že díky počáteční podmínce víme, že $y(0) = 1$. Zjevně

$$\frac{1}{n}y(x) = x + 1, \quad x \in \left[0, \frac{1}{n}\right].$$

Dále uvažujme interval $[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]$, uvědomíme si, že z předchozího kroku máme, že aproximace řešení má splňovat $y(\frac{1}{n}) = 1 + \frac{1}{n}$, a řešme

$$\frac{2}{n}y' = 1 + \frac{1}{n}, \quad \frac{2}{n}y\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{n}.$$

Dostáváme

$$\frac{2}{n}y(x) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)x + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right].$$

Tedy pro $1 \leq k < n$ máme na intervalu $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ (připomeňme, že $\frac{k}{n}y(\frac{k}{n}) = (1 + \frac{1}{n})^k$)

$$\frac{k+1}{n}y' = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k, \quad \frac{k+1}{n}y\left(\frac{k}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k.$$

Proto

$$\frac{k+1}{n}y(x) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k x + \left(1 - \frac{k}{n}\right)\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \quad x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right].$$

Například tedy

$$\frac{n}{n}y(1) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^1 \quad \text{pro } n \rightarrow \infty.$$

Analogicky pak pro ${}_n y$ definované jako ${}_n^k y$ na intervalu $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, $1 \leq k \leq n$

$${}_n y(z) \sim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{zn} \rightarrow e^z \quad \text{pro } n \rightarrow \infty$$

pro libovolné $z \in [0, 1]$. V celém důkazu Peanovy existenční věty je nejtěžší ověřit, že pro spojitou funkci F konverguje ${}_n y$ k nějaké funkci y , která je spojitá a diferencovatelná na daném intervalu a splňuje danou rovnici.

(ii) Nyní si na úloze (8.3.1) ilustrujeme důkaz Picard–Lindelöfovy existenční věty (Věta 8.3.5). Zřejmě platí

$$y(x) = \int_0^x y'(s) ds + y(0).$$

Protože $y' = y$ a $y(0) = 1$, máme

$$y(x) = \int_0^x y(s) ds + 1.$$

Není těžké ověřit, že spojitá funkce y řeší úlohu výše právě tehdy, když řeší (8.3.1). Nyní položme $y_0 \equiv 1$ a definujme

$$y_n(x) = \int_0^x y_{n-1}(s) ds + 1.$$

To těžké na důkazu Picard–Lindelöfovy existenční věty je ověřit, že taková posloupnost má limitu, která řeší úlohu (8.3.1). V našem případě ale máme

$$\begin{aligned} y_1(x) &= x + 1 \\ y_2(x) &= \frac{x^2}{2} + x + 1 \\ &\vdots \\ y_n(x) &= \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + x + 1. \end{aligned}$$

Tedy

$$y_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \rightarrow e^x$$

pro $n \rightarrow \infty$.

Tvrzení 8.3.11 (O slepování řešení). *Nechť \mathbf{y}_1 řeší úlohu $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ na (a, b) a \mathbf{y}_2 řeší tutéž úlohu na (b, c) . Pokud navíc platí*

$$\lim_{x \rightarrow b_+} \mathbf{y}_1(x) = \lim_{x \rightarrow b_-} \mathbf{y}_2(x) = \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n,$$

(limitu vektorové funkce počítáme zvlášť po jednotlivých složkách) a \mathbf{F} je spojitá v bodě (b, \mathbf{z}) , pak vektorová funkce

$$\mathbf{y}(x) = \begin{cases} \mathbf{y}_1(x) & \text{pro } x \in (a, b) \\ \mathbf{z} & \text{pro } x = b \\ \mathbf{y}_2(x) & \text{pro } x \in (b, c) \end{cases}$$

řeší rovnici $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ na (a, c) .

Důkaz. Nejprve si povšimněme, že stačí ukázat $\mathbf{y}'(b) = \mathbf{F}(b, \mathbf{z})$. Spojitost \mathbf{F} v bodě (b, \mathbf{z}) a předpoklad $\lim_{x \rightarrow b_+} \mathbf{y}_1(x) = \lim_{x \rightarrow b_-} \mathbf{y}_2(x) = \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ implikují

$$\lim_{x \rightarrow b_+} \mathbf{F}(x, \mathbf{y}_1(x)) = \lim_{x \rightarrow b_-} \mathbf{F}(x, \mathbf{y}_2(x)) = \mathbf{F}(b, \mathbf{z}).$$

Podle Věty o limitě derivací (Věta 6.3.9) pak dostáváme $\mathbf{y}'(b) = \mathbf{F}(b, \mathbf{z})$ a jsme hotovi. \square

Poznámka 8.3.12. Otázkou je, kdy můžeme řešení prodloužovat a získat řešení maximální. Nepůjdeme zde do detailů a jen si stručně představíme možné scénáře.

(i) „Narazíme“ na hranici oblasti, na které má úloha smysl. Tedy pravá strana rovnice přestává být spojitá či vůbec definovaná a nemůžeme pokračovat.

(ii) Zůstaneme někde uvnitř oblasti spojitosti, tedy naše řešení $\mathbf{y}(x)$ je omezené a pravá strana rovnice má smysl na nějakém okolí „konečného bodu“. V takovém případě můžeme řešení „prodloužit“ do konečného bodu (v něm je řešení nejen spojitě, ale i diferencovatelné) a můžeme z toho bodu nalézt pokračování řešení, ať už pomocí Peanovy či Picard–Lindelövy existenční věty. Podle předchozího tvrzení můžeme obě řešení napojit a řešení tedy prodloužíme.

(iii) Řešení nám „uteče“ do nekonečna, tedy $|\mathbf{y}(x)| \rightarrow \infty$. Toto je typický scénář pro některé nelineární rovnice, pro lineární rovnice se tohle nestane. Řešení pak samozřejmě nelze prodloužit.

8.4 Metody řešení vybraných skalárních rovnic prvního řádu

8.4.1 Rovnice $y' = f(x)$

Úloha

$$\begin{aligned} y' &= f(x) \\ y(x_0) &= y_0 \end{aligned}$$

má v případě, kdy f je spojitá na (a, b) a $x_0 \in (a, b)$, jednoznačné řešení tvaru

$$y(x) = y_0 + (\mathcal{R}) \int_{x_0}^x f(s) \, ds.$$

Existence a jednoznačnost plynou například z Picard–Lindelövy existenční věty (Věta 8.3.5; v našem případě je $F(x, y) = f(x)$). Platnost vzorečku plyne okamžitě z teorie Riemannova integrálu (Takzvaná hlavní věta diferenciálního a integrálního počtu, tedy Věta 7.5.12). V tomto případě jsme také mohli jednoznačnost dokázat pomocí Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce (Věta 4.1.4), existenci pomocí Věty o existenci primitivní funkce ke spojitě funkci (Věta 7.5.13). Zde zatím nebylo důležité, že jsme ve skalárním případě, v případě systému rovnic tohoto typu bychom postupovali po složkách.

8.4.2 Rovnice $y' = g(y)$

V této situaci je řešením

$$y = G^{-1}(x + C), \quad \text{kde } G(y) := \int \frac{dy}{g(y)}.$$

Výsledný vzorec si lze pamatovat pomocí zjednodušené myšlenky jeho důkazu (ale pozor, tato myšlenka kupříkladu používá nedefinované znaky a neřeší existenci inverze, není tedy důkazem)

$$y' = \frac{dy}{dx} = g(y) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{dy}{g(y)} = dx \quad \rightsquigarrow \quad \int \frac{dy}{g(y)} = \int dx = x + C.$$

Věta 8.4.1 (O řešení rovnice $y' = g(y)$). *Nechť $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá a nenulová na $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$. Nechť G je primitivní funkce k $y \mapsto \frac{1}{g(y)}$ na (α, β) . Pak na intervalu $G((\alpha, \beta))$ existuje inverzní funkce G^{-1} a každé maximální řešení v $\Omega = \mathbb{R} \times (\alpha, \beta)$ má tvar*

$$y(x) = G^{-1}(x + C),$$

kde $C \in \mathbb{R}$, a je definováno na intervalu

$$I_C := \{x \in \mathbb{R} : \exists y \in (\alpha, \beta) \quad G(y) = x + C\} = \{x = z - C : z \in G((\alpha, \beta))\}.$$

Navíc každým bodem $(x_0, y_0) \in \Omega$ prochází právě jedno maximální řešení (v Ω).

Důkaz. Krok 1: existence a diferencovatelnost G^{-1} .

Díky předpokladům na g je $\frac{1}{g}$ spojitá, nenulová a nemění znaménko. Díky tomu existuje ryze monotonní G (primitivní funkce k $\frac{1}{g}$), G' je nenulová a nemění znaménko. Podle Věty o derivaci inverzní funkce (verze pro funkci s nenulovou derivací neměnicí znaménko, tj. Věta 3.3.22) je $G^{-1}: G((\alpha, \beta)) \rightarrow (\alpha, \beta)$ diferencovatelná. Navíc funkce $x \mapsto G^{-1}(x + C)$ zobrazuje interval I_C na (α, β) .

Krok 2: $y(x) = G^{-1}(x + C)$ řeší úlohu $y' = g(y)$ na I_C .

Na I_C podle prvního kroku můžeme funkci $x \mapsto G^{-1}(x + C)$ derivovat a dostáváme

$$y'(x) = \frac{d}{dx} G^{-1}(x + C) = \frac{1}{G'(G^{-1}(x + C))} = g(G^{-1}(x + C)) = g(y(x)).$$

Krok 3: maximalita řešení tvaru $y(x) = G^{-1}(x + C)$.

Odvodíme spor v situaci, kdy $g > 0$ na (α, β) (tedy G^{-1} je rostoucí) a řešení umíme prodloužit doprava mimo interval I_C (v ostatních případech postupujeme analogicky). Pišme $(a, b) := I_C$. Nejprve si povšimněme, že díky monotonii funkce G^{-1} máme

$$\lim_{x \rightarrow b_-} G^{-1}(x + C) = \sup_{x \in (a, b)} G^{-1}(x + C) = \sup(\alpha, \beta) = \beta.$$

Dále, je-li možné řešení y prodloužit za bod b , y je spojitě v bodě b , a proto $y(b) = \beta$. Ale $\beta \notin (\alpha, \beta)$, není tedy v definičním oboru funkce g . To je ve sporu s tím, že by mělo platit $y'(b) = g(y(b))$.

Krok 4: jednoznačnost.

Uvažme například situaci, kdy $g > 0$ na (α, β) . Nechť η je řešení s definičním oborem (a, b) . Pak

$$\eta'(x) = g(\eta(x)) > 0 \quad \text{pro } x \in (a, b).$$

Funkce η proto má diferencovatelnou inverzi na $\eta((a, b))$. Označme ji μ . Pak pro všechna $y \in \eta((a, b))$ platí

$$\mu'(y) = \frac{1}{\eta'(\mu(y))} = \frac{1}{g(\eta(\mu(y)))} = \frac{1}{g(y)}.$$

Odtud $\mu(y) = G(y) - C$ na $\eta((a, b))$. Pro $x \in (a, b)$ tedy dostáváme

$$\mu(\eta(x)) = G(\eta(x)) - C \quad \iff \quad x + C = G(\eta(x)).$$

Následně $x + C$ leží v oboru hodnot funkce G , neboli $(a, b) \subset I_C$, a $\eta(x) = G^{-1}(x + C)$.

Krok 5: existence řešení pro každou počáteční podmínku.

Nechť $(x_0, y_0) \in \Omega = \mathbb{R} \times (\alpha, \beta)$. Protože G^{-1} zobrazuje $G((\alpha, \beta))$ na (α, β) , existuje $\xi \in G((\alpha, \beta))$ takové, že $y_0 = G^{-1}(\xi)$. Stačí proto položit $C := \xi - x_0$ a pak funkce

$$y(x) := G^{-1}(x + C) = G^{-1}(x + \xi - x_0)$$

splňuje $y(x_0) = G^{-1}(\xi) = y_0$. □

Příklad 8.4.2. (i) Nechť $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $A \in \mathbb{R}$. Uvažme úlohu

$$\begin{aligned} y'(x) &= \alpha y(x) \\ y(0) &= A. \end{aligned}$$

Předchozí větu můžeme používat v situacích $\Omega = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$. Zde shodně máme

$$G(y) = \int \frac{dy}{g(y)} = \int \frac{dy}{\alpha y} = \frac{1}{\alpha} \log |y| = x + C.$$

Odtud, píšeme-li $e^{\alpha C} = K > 0$,

$$|y| = e^{\alpha(x+C)} = K e^{\alpha x}.$$


Při počáteční podmínce $y(0) = A > 0$ používáme větu na $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$ a dostáváme jednoznačné maximální řešení tvaru

$$y = A e^{\alpha x}$$

definované na celém \mathbb{R} . Analogicky se postupuje v případě $A < 0$. Opět dostaneme jednoznačné řešení popsané vzorcem $y = A e^{\alpha x}$ na \mathbb{R} . Povšimněme si ještě, že bychom podobně mohli postupovat i v případě počáteční podmínky tvaru $y(x_0) = A$ pro $A \neq 0$, jen by nám vyšla odlišná multiplikativní konstanta.

V situaci $A = 0$ předchozí větu použít nemůžeme. Snadno však nahlédneme, že funkce $y \equiv 0$ je řešením. Podobně v případě počáteční podmínky $y(x_0) = 0$. I tato řešení jsou jednoznačná. Kdyby totiž nějaké řešení zároveň splňovalo třeba $y(x_1) = 0$ a $y(x_2) > 0$, z našich výsledků pro $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$ by plynulo, že se toto řešení musí shodovat s nějakým řešením tvaru $Ke^{\alpha x}$, ale pak by nemohlo platit $y(x_1) = 0$.

Poznamenejme ještě, že existenci a (lokální) jednoznačnost pro jakékoli $A \in \mathbb{R}$ nám také zaručuje Picard–Lindelöfova existenční věta (Věta 8.3.5), neboť funkce $(x, y) \mapsto \alpha y$ je spojitá a lipschitzovská ve druhé složce.



Obrázek 8.1: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $y' = \alpha y$. Povšimněte si, že aditivní konstanta z integrace se projevuje jinak, než jak jsme tomu byli zvyklí u primitivních funkcí (tentokrát má roli multiplikační konstanty).

(ii) Nechť $A \in \mathbb{R}$. Uvažme úlohu

$$\begin{aligned} y'(x) &= y^2(x) \\ y(0) &= A. \end{aligned}$$

Předchozí větu můžeme používat v situacích $\Omega = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$. Zde shodně máme


$$G(y) = \int \frac{dy}{g(y)} = \int \frac{dy}{y^2} = -\frac{1}{y} = x + C.$$

Z počáteční podmínky dostáváme $C = -\frac{1}{A}$, a proto máme jednoznačná maximální řešení

$$\begin{aligned} A > 0 &\implies y = \frac{-1}{x - \frac{1}{A}} \quad \text{na } \left(-\infty, \frac{1}{A}\right) \\ A < 0 &\implies y = \frac{-1}{x - \frac{1}{A}} \quad \text{na } \left(\frac{1}{A}, \infty\right). \end{aligned}$$

Prodloužení mimo popsané intervaly není možné díky nevlastním limitám.

Pokud $A = 0$, možným řešením je $y \equiv 0$. Jeho jednoznačnost se dá dokázat jako u předchozí rovnice. To opět není nijak překvapivé z pohledu Picard–Lindelöfovy existenční věty (Věta 8.3.5), neboť funkce $(x, y) \mapsto y^2$ je spojitá a lokálně lipschitzovská ve druhé složce.

Obrázek 8.2: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $y' = y^2$.

(iii) Uvažme úlohu

$$\begin{aligned} y'(x) &= 3y^{\frac{2}{3}} \\ y(0) &= 1. \end{aligned}$$

Předchozí větu můžeme používat v situacích $\Omega = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$. Zde shodně máme

$$G(y) = \int \frac{dy}{g(y)} = \int \frac{dy}{3y^{\frac{2}{3}}} = y^{\frac{1}{3}} = x + C.$$

V případě počáteční podmínky $y(0) = 1$ pracujeme na $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$, a proto máme jednoznačné maximální řešení

$$y = (x + 1)^3 \quad \text{na } (-1, \infty).$$

Jednoznačnost a maximalita se týkají množiny $\Omega = \mathbb{R} \times (0, \infty)$. Nepřekvapí tedy, že naše řešení je možné prodloužit předpisem

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in (-\infty, -1) \\ (x + 1)^3 & \text{pro } x \in [-1, \infty). \end{cases}$$


nebo

$$y(x) = \begin{cases} (x - \alpha)^3 & \text{pro } x \in (-\infty, \alpha] \\ 0 & \text{pro } x \in (\alpha, -1) \\ (x + 1)^3 & \text{pro } x \in [-1, \infty), \end{cases}$$

kde $\alpha \in (-\infty, -1]$. Jiné případy nenastanou díky jednoznačnosti, kterou nám dává předchozí věta pro $\Omega = \mathbb{R} \times (-\infty, 0)$.

Při počáteční podmínce $y(0) = 0$ je situace ještě o něco složitější. Obecné řešení má pak tvar

$$y(x) = \begin{cases} (x - \alpha)^3 & \text{pro } x \in (-\infty, \alpha] \\ 0 & \text{pro } x \in (\alpha, \beta) \\ (x - \beta)^3 & \text{pro } x \in [\beta, \infty), \end{cases}$$

Obrázek 8.3: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $y' = 3y^{\frac{2}{3}}$.

kde $-\infty \leq \alpha \leq 0 \leq \beta \leq \infty$ (například $\alpha = -\infty$ znamená, že $x = 0$ na $(-\infty, \beta]$ a větev $(x - \alpha)^3$ v řešení chybí).

Z pohledu Peanovy existenční věty (Věta 8.3.4) existuje alespoň jedno řešení pro každou počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$ ($(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$), neboť funkce $(x, y) \mapsto 3y^{\frac{2}{3}}$ je spojitá na \mathbb{R}^2 . Picard–Lindelöfova existenční věta (Věta 8.3.5) se nedá aplikovat na žádné otevřené podmnožině \mathbb{R}^2 , která obsahuje x -ovou osu, neboť pak nemáme lokální lipschitzovskost funkce $(x, y) \mapsto 3y^{\frac{2}{3}}$ ve druhé proměnné.

V předchozích příkladech se často vyskytovala situace, kdy pro jisté $\theta \in \mathbb{R}$ platí $g(\theta) = 0$. Pak automaticky $y \equiv \theta$ je řešení rovnice $y' = g(y)$. Toto řešení se nazývá *triviální řešení*. Viděli jsme, že v některých případech se dá napojit triviální řešení na řešení získaná pomocí Věty o řešení rovnice $y' = g(y)$ (Věta 8.4.1). Této problematice se nyní budeme věnovat podrobněji. Nechť v dalším je θ nulový bod funkce g a $y = G^{-1}(x + C)$ je řešení získané pomocí Věty o řešení rovnice $y' = g(y)$ na $\Omega = (\theta, \tau) \times \mathbb{R}$ pro jisté $\tau \in (\theta, \infty]$. Tedy g je nenulová a spojitá na (θ, τ) a G je monotonní na (θ, τ) . V této situaci vždy existují $\lim_{y \rightarrow \theta_+} G(y)$, $\lim_{y \rightarrow \tau_-} G(y)$ a řešení $y = G^{-1}(x + C)$ máme na intervalu s krajními body $a := \lim_{y \rightarrow \theta_+} G(y) - C$ a $b := \lim_{y \rightarrow \tau_-} G(y) - C$, neboť v naší situaci platí

$$y = G^{-1}(x + C) \quad \Longleftrightarrow \quad x = G(y) - C.$$

Pokud jsou obě výše uvedené limity nevlastní, řešení máme definované na celém \mathbb{R} , což je jednak nejlepší možný výsledek z hlediska definičního oboru řešení, zároveň odpadá možnost slepit řešení s řešením triviálním. V dalším se tedy budeme zabývat třeba situací $\lim_{y \rightarrow \theta_+} G(y) \in \mathbb{R}$.

Tvrzení 8.4.3 (O slepování řešení). *Nechť v situaci uvedené výše je $a \in \mathbb{R}$ a funkce g je spojitá zprava v bodě θ . Pak lze v bodě a řešení $y = G^{-1}(x + C)$ slepit s triviálním řešením identicky rovným θ .*

Důkaz. Pro jednoduchost značení uvažujme jen případ $g > 0$ na (θ, τ) . Ukažme, že

$$y = \begin{cases} \theta & \text{pro } x \leq a \\ G^{-1}(x + C) & \text{pro } x \in (a, b) \end{cases}$$

řeší úlohu $y' = g(y)$ na $(-\infty, b)$. Připomeňme, že platí

$$\lim_{x \rightarrow a^+} G^{-1}(x + C) = \theta,$$

proto je y spojitá funkce. Dále ze spojitosti g zprava v bodě θ dostáváme

$$\frac{d}{dx} G^{-1}(x + C) = \frac{1}{G'(G^{-1}(x + C))} = g(G^{-1}(x + C)) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} g(\theta) = 0.$$

Proto Věta o limitě derivací (Věta 6.3.9) dává $y'(a) = 0$ a platí $y'(a) = 0 = g(\theta) = g(y(a))$. \square

Pokud je funkce g lipschitzovská na nějakém pravém okolí bodu θ , automaticky nastane situace, že a je nevlastní.

Tvrzení 8.4.4 (O nevlastní mezi definičního oboru řešení). *Nechť v situaci uvedené výše je funkce g lipschitzovská na $[\theta, \theta + \delta)$ pro jisté $\delta > 0$. Pak je a nevlastní.*

Důkaz. Opět se zabýváme jen případem $g > 0$ na (θ, τ) . Pak G je rostoucí na $(\theta, \theta + \delta)$ a pro libovolná $\theta < \xi_1 < \xi_2 < \theta + \delta$ máme

$$\begin{aligned} G(\xi_2) - G(\xi_1) &= \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{g(y)} \geq \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{g(\theta) + K(y - \theta)} = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{K(y - \theta)} \\ &= \frac{1}{K} [\log(y - \theta)]_{\xi_1}^{\xi_2} \xrightarrow{\xi_1 \rightarrow \theta^+} \infty. \end{aligned}$$

Z toho zřejmě plyne dokazovaný výsledek. \square

Lipschitzovskost je pro výše popsany jev podmínkou postačující, nikoliv nutnou.

Příklad 8.4.5. Definujeme-li

$$g(y) = \begin{cases} y \log |y| & \text{pro } y \neq 0 \\ 0 & \text{pro } y = 0, \end{cases}$$

máme funkci, která je spojitá (podle Peanovy existenční věty, tedy Věty 8.3.4, máme řešení pro libovolnou počáteční podmínku $y(0) = y_0$, kde $y_0 \in \mathbb{R}$) a platí

$$\int_0^\delta \frac{dy}{y \log y} = [\log |\log y|]_0^\delta = -\infty$$

pro každé $\delta \in (0, 1)$ (projde tedy konstrukce z předchozího důkazu), ale g není lipschitzovská na žádném okolí počátku. Řešení rovnice $y' = g(y)$ pak vypadá následovně:

- (i) Je-li $A = 0, \pm 1$, je $y(x) = A$.
- (ii) Je-li $A > 1$, je $y(x) = e^{e^x + \log(\log A)}$.
- (iii) Je-li $A \in (0, 1)$, je $y(x) = e^{-e^x + \log |\log A|}$.
- (iv) Je-li $A \in (-1, 0)$, je $y(x) = -e^{-e^x + \log(|\log |A||)}$.
- (v) Je-li $A < -1$, je $y(x) = -e^{e^x + \log(\log |A|)}$.

Všechna řešení jsou definována na \mathbb{R} . Řešení se nikdy nedotknou ani nuly, ani plus či minus jedničky, takže není třeba řešit napojení řešení.

8.4.3 Rovnice $y' = f(x)g(y)$

Této rovnici se říká *rovnice se separovanými proměnnými*. Jejím řešením je

$$y = G^{-1}(F(x) + C), \quad \text{kde } G(y) = \int \frac{dy}{g(y)} \text{ a } F(x) = \int f(x) dx.$$

Výsledný vzorec si lze pamatovat pomocí zjednodušené myšlenky jeho důkazu (tato myšlenka je ale opět zjednodušená a nelze ji považovat za důkaz)

$$y' = \frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \rightsquigarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x) dx \rightsquigarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx = F(x) + C.$$

Věta 8.4.6 (O řešení rovnice se separovanými proměnnými). *Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $(a, b) \subset \mathbb{R}$ a $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá a nenulová na $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$. Nechť F je primitivní funkce k f na (a, b) a G je primitivní funkce k $y \mapsto \frac{1}{g(y)}$ na (α, β) . Pak na intervalu $G((\alpha, \beta))$ existuje inverzní funkce G^{-1} a každé maximální řešení v $\Omega = (a, b) \times (\alpha, \beta)$ má tvar*

$$y(x) = G^{-1}(F(x) + C),$$

kde $C \in \mathbb{R}$, a je definováno na otevřeném intervalu

$$I := \{x \in (a, b) : \exists y \in (\alpha, \beta) \quad G(y) = F(x) + C\}.$$

Navíc každým bodem $(x_0, y_0) \subset \Omega$ prochází právě jedno maximální řešení (v Ω).

Důkaz. Důkaz se získá nenáročnou modifikací důkazu Věty o řešení rovnice $y' = g(y)$ (Věta 8.4.1), kterou přenecháváme čtenáři jako cvičení. Jen důkaz toho, že I je otevřený interval, vyžaduje hlubší zamyšlení. \square

Příklad 8.4.7. Hledejme obecné řešení úlohy $y' = \frac{2y}{x}$. Po integraci dostáváme

$$\log |y| = \log x^2 + C \quad \implies \quad y = Kx^2.$$


Tento postup jsme mohli aplikovat na $\Omega = (-\infty, 0) \times (-\infty, 0)$, $\Omega = (-\infty, 0) \times (0, \infty)$, $\Omega = (0, \infty) \times (-\infty, 0)$, nebo $\Omega = (0, \infty) \times (0, \infty)$. V případě počáteční podmínky $y(x_0) = 0$ je řešením

$$y \equiv 0 \quad \text{na } (-\infty, 0) \quad \text{pro } x_0 < 0 \quad \text{a} \quad y \equiv 0 \quad \text{na } (0, \infty) \quad \text{pro } x_0 > 0.$$

Slepování řešení zde není možné. Pokud bychom však pracovali s rovnicí $xy' = 2y$, slepovat bychom mohli v počátku (všechna uvažovaná řešení mají v počátku nulovou limitu a rovněž nulovou limitu derivací) a dostali bychom obecné řešení

$$y(x) = \begin{cases} Kx^2 & \text{pro } x \leq 0 \\ Lx^2 & \text{pro } x \geq 0, \end{cases}$$

kde $K, L \in \mathbb{R}$. Jednoznačnost by nám daly počáteční podmínky $y(x_1) = y_1$ a $y(x_2) = y_2$, kde $x_1 < 0 < x_2$ a $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$. Zajímavou variantou předchozího příkladu je úloha $xy' = y$. Opět je porušena jednoznačnost v počátku, ale řešení není možné slepovat v počátku dle libosti.

Obrázek 8.4: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $xy' = 2y$.

8.4.4 Homogenní diferenciální rovnice

Budeme se zabývat rovnicí tvaru

$$y' = f(x, y),$$

kde funkce $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je definovaná na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ a platí zde pro každé $\lambda \neq 0$

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y).$$

Poznámka 8.4.8. (i) Funkce f je tedy konstantní na jednotlivých přímkách vycházejících z počátku (neuvažujeme hodnotu v počátku).

(ii) Název tohoto typu rovnic je odvozen od následující terminologie. Funkce $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná na celém \mathbb{R}^2 je *homogenní stupně $\alpha \in \mathbb{N}$* (nebo také *α -homogenní*), jestliže pro všechna $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ a $\lambda > 0$ platí

$$g(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha g(x, y).$$

Podíl dvou homogenních funkcí stejného řádu vede na typ funkce, který uvažujeme v naší diferenciální rovnici, jestliže jmenovatel je nenulový na každém paprsku vycházejícím z počátku.

Rovnici řešíme pro $x \neq 0$ (nakonec se získané výsledky pokusíme slepit) následujícím postupem. Nejprve si přepíšeme

$$f(x, y) = f\left(x \cdot 1, x \frac{y}{x}\right) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) =: g\left(\frac{y}{x}\right)$$

a definujeme pomocnou funkci $z(x) = \frac{y(x)}{x}$. Opět si napíšeme stručné (poněkud nekorektní) schéma dořešení úlohy. Postupujeme následovně

$$y(x) = xz(x) \rightsquigarrow y'(x) = z(x) + xz'(x) = g\left(\frac{y(x)}{x}\right) = g(z(x)) \rightsquigarrow z'(x) = \frac{g(z) - z}{x}$$

a úplně napravo jsme získali úlohu se separovanými proměnnými, kterou už umíme řešit. Přesněji, podle Věty o řešení rovnice se separovanými proměnnými (Věta 8.4.6) můžeme použít zmíněnou metodu v situaci, kdy funkce $z \mapsto f(1, z) - z$ je

spojitá a nenulová na jistém $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ a pracujeme na množinách $\Omega = (-\infty, 0) \times (\alpha, \beta)$ a $\Omega = (0, \infty) \times (\alpha, \beta)$ (vychází nám výsledek tvaru $z(x) = H^{-1}(\log|x| + C)$, kde H^{-1} je inverzní funkcí k $h: z \mapsto \frac{1}{f(1,z)-z}$). Protože výsledné řešení z je diferencovatelné, je diferencovatelné i $y(x) = xz(x)$ a splňuje požadovaný vztah

$$y'(x) = z(x) + xz'(x) = g(z(x)) = g\left(\frac{y(x)}{x}\right) = f\left(1, \frac{y(x)}{x}\right) = f(x, y)$$

na intervalech získaných při řešení úlohy $z'(x) = \frac{g(z)-z}{x}$ (žádný z těchto intervalů neobsahuje počátek). Zbývá ještě ukázat, že úloha $y' = f(x, y)$ nemůže mít jiná řešení než ta, která jsme získali výše. To už je ale snadné. Pokud je totiž y řešením úlohy $y' = f(x, y)$ na nějakém intervalu neobsahujícím počátek, je také diferencovatelná funkce $z := \frac{y}{x}$ a dostáváme

$$z' = \frac{xy' - y}{x^2} = \frac{xf(x, y) - xz}{x^2} = \frac{f(1, z) - z}{x}.$$

Příklad 8.4.9. Řešme úlohu $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$. Po použití rovnosti $y = xz$ pro $x \neq 0$ máme


$$z + xz' = \frac{1}{z} + z \quad \iff \quad z' = \frac{1}{x} \frac{1}{z}.$$

Na jednotlivých kvadrantech pak máme

$$\frac{z^2}{2} = \int z \, dz = \int \frac{dx}{x} = \log|x| + C.$$

Odtud

$$z^2 = 2(\log|x| + C) = \log x^2 + 2C \quad \implies \quad y^2 = x^2(\log x^2 + 2C) \quad \text{pro } |x| > e^{-C}.$$



Obrázek 8.5: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$. Pozor, dvojice netriviálních řešení $y = \pm|x|\sqrt{\log x^2 + 2C}$ není možné slepit.

Příklad 8.4.10. Řešme úlohu $yy' + x = \sqrt{x^2 + y^2}$. Po úpravě (dočasně se omezíme na $x \neq 0, y \neq 0$) dostáváme

$$y' = \frac{1}{y}|x|\sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} - \frac{x}{y}.$$

Odtud po použití rovnosti $y = xz$ máme

$$z + xz' = \text{sign } x \frac{1}{z} \sqrt{1 + z^2} - \frac{1}{z}$$

a po úpravě dostáváme

$$z' = \frac{1}{x} \frac{\text{sign } x \sqrt{1 + z^2} - 1 - z^2}{z}.$$

Pro $x < 0$ a $z < 0$ nebo $z > 0$ máme

$$\log(1 + \sqrt{1 + z^2}) = \int \frac{z dz}{\sqrt{1 + z^2} + 1 + z^2} = - \int \frac{dx}{x} = -\log|x| + C.$$

Odtud pro $K > 0$ a $x \in (-\frac{K}{2}, 0)$

$$\sqrt{1 + z^2} + 1 = \frac{K}{|x|} \implies \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} + 1 = \frac{K}{|x|} \implies y^2 = \left(\frac{K}{|x|} - 1\right)^2 x^2 - x^2.$$

Po úpravě obdržíme

$$y^2 = K^2 - 2K|x|.$$

Na $\Omega = (-\infty, 0) \times (-\infty, 0)$ máme obecná řešení tvaru

$$y = -\sqrt{K^2 + 2Kx} \quad \text{pro } x \in \left(-\frac{K}{2}, 0\right).$$

Na $\Omega = (-\infty, 0) \times (0, \infty)$ máme obecná řešení tvaru

$$y = \sqrt{K^2 + 2Kx} \quad \text{pro } x \in \left(-\frac{K}{2}, 0\right).$$

Pro $x > 0$ a $z < 0$ nebo $z > 0$ máme

$$\log(\sqrt{1 + z^2} - 1) = \int \frac{z dz}{1 + z^2 - \sqrt{1 + z^2}} = - \int \frac{dx}{x} = \log|x| + C.$$

Odtud pro $K > 0$ a $x > 0$

$$\sqrt{1 + z^2} - 1 = \frac{K}{x} \implies \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} - 1 = \frac{K}{x} \implies y^2 = \left(\frac{K}{x} + 1\right)^2 x^2 - x^2.$$

Po úpravě získáváme

$$y^2 = K^2 + 2Kx.$$

Na $\Omega = (0, \infty) \times (-\infty, 0)$ máme obecná řešení tvaru

$$y = -\sqrt{K^2 + 2Kx} \quad \text{pro } x \in (0, \infty).$$

Na $\Omega = (0, \infty) \times (0, \infty)$ máme obecná řešení tvaru


$$y = \sqrt{K^2 + 2Kx} \quad \text{pro } x \in (0, \infty).$$

Pro $x = 0$ můžeme části řešení získané na $(-\frac{K}{2}, 0)$ a $(0, \infty)$ slepit, neboť funkce $x \mapsto \sqrt{K^2 + 2Kx}$ je třídy $C^1((-\frac{K}{2}, \infty))$ (výraz $yy' + x - \sqrt{x^2 + y^2}$ je tedy spojitý na $(-\frac{K}{2}, \infty)$, a proto jeho nulovost na $(-\frac{K}{2}, \infty) \setminus \{0\}$ implikuje nulovost i v počátku). Pro $y = 0$ požaduje původní rovnice $x = \sqrt{x^2}$. Na $(-\infty, 0)$ proto neexistuje řešení protínající osu x . Na intervalu $[0, \infty)$ rovnost platí vždy, máme tedy „triviální“ řešení

$$y \equiv 0 \quad \text{na } (0, \infty)$$

(pojem řešení jsme definovali pro otevřený interval) a toto řešení se zřejmě nedá slepit s žádným řešením dříve získaným. Celkově tedy máme výše popsané triviální řešení a řešení tvaru

$$y = \sqrt{K^2 + 2Kx} \quad \text{a} \quad y = -\sqrt{K^2 + 2Kx} \quad \text{definovaná na } \left(-\frac{K}{2}, \infty\right).$$




Obrázek 8.6: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $yy' + x = \sqrt{x^2 + y^2}$. Pozor, dvojice netriviálních řešení $y = \pm\sqrt{K^2 + 2Kx}$ není možné slepit.

Poznámka 8.4.11. Předchozí příklad odpovídá hledání tvaru zrcadla, pro které jsou paprsky rovnoběžné s optickou osou po odrazu soustředěny do jednoho bodu.

Přesněji, pokud si na Obrázku 8.7 označíme souřadnice bodu M (tedy průsečíku dráhy paprsku rovnoběžného s optickou osou zrcadla a zrcadla) jako (x_0, y_0) , pak bod $N = (x_1, 0)$ (průsečík osy úhlu určeného dráhou paprsku a optické osy zrcadla) leží na normále k zrcadlu, tedy na přímce

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0).$$



Obrázek 8.7: Odvození rovnice $yy' + x = \sqrt{x^2 + y^2}$ z úlohy o hledání tvaru zrcadla.

Dosazením bodu N máme

$$-y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x_1 - x_0),$$

tedy

$$x_1 = y'(x_0)y_0 + x_0.$$

Protože trojúhelník MNP je rovnoramenný, je

$$x_0^2 + y_0^2 + |MP|^2 = |NP|^2 = x_1^2,$$

proto

$$y'(x_0)y_0 + x_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}.$$

Výsledná rovnice zrcadla je

$$yy' + x = \sqrt{x^2 + y^2},$$

dostáváme tedy rovnici z Příkladu 8.4.10.

8.4.5 Rovnice, které lze převést na homogenní diferenciální rovnici

Uvažujme rovnici typu

$$y' = f\left(\frac{ax + by + c}{\alpha x + \beta y + \gamma}\right)$$

a předpokládejme, že $a\beta \neq b\alpha$. Pak má soustava

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0 \\ \alpha x + \beta y + \gamma &= 0 \end{aligned}$$

jednoznačné řešení $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Položme

$$\xi := x - x_0 \quad \text{a} \quad \eta := y - y_0$$

(vlastně se jedná jen o posunutí souřadných os do průsečíku přímek $ax + by + c = 0$ a $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$). Okamžitě pro funkci $\eta: \xi \mapsto \eta(\xi) := y(\xi + x_0) - y_0$ dostáváme

$$\frac{d\eta}{d\xi}(\xi) = \frac{dy}{dx}(\xi + x_0) = f\left(\frac{a(\xi + x_0) + b(\eta + y_0) + c}{\alpha(\xi + x_0) + \beta(\eta + y_0) + \gamma}\right) = f\left(\frac{a\xi + b\eta}{\alpha\xi + \beta\eta}\right),$$

což je homogenní diferenciální rovnice.

Pokud není splněna podmínka $a\beta \neq b\alpha$, jedná se o snazší úlohu, která převod na homogenní rovnici nevyžaduje. Abychom si toto ukázali, rozlišíme tři případy.

V prvním případě je $\beta = 0$ a $\alpha \neq 0$, vlastnost $a\beta = b\alpha$ pak dává $b = 0$ a máme úlohu

$$y' = f\left(\frac{ax + c}{\alpha x + \gamma}\right),$$

která se řeší integrací.

Ve druhém případě máme $(\alpha, \beta) = (0, 0)$, formule má pak smysl jen pro $\gamma \neq 0$ a můžeme psát

$$y' = f\left(\frac{a}{\gamma}x + \frac{b}{\gamma}y + \frac{c}{\gamma}\right).$$

Pokud je nyní $b = 0$, úlohu opět řešíme integrací. Pokud $b \neq 0$, definujeme novou funkci $z = \frac{a}{\gamma}x + \frac{b}{\gamma}y + \frac{c}{\gamma}$ a dostáváme

$$z' = \frac{a}{\gamma} + \frac{b}{\gamma}y' = \frac{a}{\gamma} + \frac{b}{\gamma}f(z),$$

což je rovnice se separovanými proměnnými.

Konečně, ve třetím případě máme $\beta \neq 0$ a vlastnost $a\beta = b\alpha$ implikuje $a = \frac{b}{\beta}\alpha$. Odtud

$$\frac{ax + by + c}{\alpha x + \beta y + \gamma} = \frac{\frac{b}{\beta}\alpha x + \frac{b}{\beta}\beta y + c}{\alpha x + \beta y + \gamma} = \frac{b}{\beta} + \frac{c - \frac{b}{\beta}\gamma}{\alpha x + \beta y + \gamma}$$

a definice nové funkce $z = \alpha x + \beta y + \gamma$ dává

$$z' = \alpha + \beta y' = \alpha + \beta f\left(\frac{b}{\beta} + \frac{c - \frac{b}{\beta}\gamma}{z}\right),$$

což je opět rovnice se separovanými proměnnými.

Poznámka 8.4.12. U právě probíraného typu diferenciálních rovnic jsme čtenáři nenabídli přehlednou větu, která by popisovala přesný tvar obecného řešení a jeho definičních oborů. Máme k tomu dva důvody. Jednak se dá snadno nahlédnout, že ve všech výše uvedených situacích, které vyžadovaly zavedení pomocné funkce z či η , jsou všechna řešení původní úlohy pro y jednoznačně určena všemi řešeními úlohy pro pomocnou funkci. Na druhou stranu, kupříkladu v situaci $\alpha = \beta = 0$ a $b \neq 0$, na definiční obor řešení mají zásadní vliv množiny nenulovosti funkce $z \mapsto \frac{a}{\gamma} + \frac{b}{\gamma}f(z)$, které nezávisí jen na chování funkce f ale i na parametrech a, b, γ . To činí obecnou charakterizaci množin nenulovosti poměrně složitou, třebaže v konkrétních úlohách se typicky o obtížný problém nejedná.

Příklad 8.4.13. Řešme úlohu

$$y' = 2 \left(\frac{y+2}{x+y-1} \right)^2.$$

Soustava

$$\begin{aligned} y_0 + 2 &= 0 \\ x_0 + y_0 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

má řešení $x_0 = 3$ a $y_0 = -2$. Zavádíme tedy novou proměnnou $\xi := x - 3$, novou funkci $\eta(\xi) := y(\xi + 3) + 2$ a dostáváme

$$\eta' = 2 \left(\frac{\eta}{\xi + \eta} \right)^2.$$

Dostali jsme homogenní diferenciální rovnici. Rozlišujeme případy $\xi \in (-\infty, 0)$ a $\xi \in (0, \infty)$. Zavádíme pomocnou funkci $z := \frac{\eta}{\xi}$ (tedy $\eta = \xi z$ a $\eta' = z + \xi z'$) a máme

$$z + \xi z' = 2 \left(\frac{z}{z+1} \right)^2 \iff z' = -\frac{1}{\xi} \frac{z^3 + z}{z^2 + 2z + 1}.$$

Tím jsme přešli k rovnici se separovanými proměnnými. Triviální řešení je $z \equiv 0$ a dále dostáváme

$$2 \arctan z + \log |z| = \int \frac{z^2 + 2z + 1}{z^3 + z} dz = - \int \frac{d\xi}{\xi} = -\log |\xi| + C.$$

Označíme-li výraz na levé straně jako $\Phi(z)$, není těžké ověřit, že funkce Φ je klesající na $(-\infty, 0)$ a zobrazuje tento interval na \mathbb{R} . Dále Φ je rostoucí na $(0, \infty)$ a zobrazuje tento interval také na \mathbb{R} . Označme Ψ_1 inverzi k restrikci Φ na $(-\infty, 0)$ a Ψ_2 inverzi k restrikci Φ na $(0, \infty)$. Pro každé $C \in \mathbb{R}$ proto máme čtveřici řešení

$$\begin{aligned} z_1 &= \Psi_1(-\log |\xi| + C) && \text{na } (-\infty, 0) \\ z_2 &= \Psi_1(-\log |\xi| + C) && \text{na } (0, \infty) \\ z_3 &= \Psi_2(-\log |\xi| + C) && \text{na } (-\infty, 0) \\ z_4 &= \Psi_2(-\log |\xi| + C) && \text{na } (0, \infty). \end{aligned}$$

Odtud máme po přidání triviálního řešení (získaného ze $z \equiv 0$)

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \xi \Psi_1(-\log |\xi| + C) && \text{na } (-\infty, 0) \\ \eta_2 &= \xi \Psi_1(-\log |\xi| + C) && \text{na } (0, \infty) \\ \eta_3 &= \xi \Psi_2(-\log |\xi| + C) && \text{na } (-\infty, 0) \\ \eta_4 &= \xi \Psi_2(-\log |\xi| + C) && \text{na } (0, \infty) \\ \eta_5 &\equiv 0 && \text{na } (-\infty, 0) \\ \eta_6 &\equiv 0 && \text{na } (0, \infty). \end{aligned}$$

Konečně dostáváme (rovnou uvádíme množiny, kde lze k zadané počáteční podmínce nalézt jednoznačné C)

$$\begin{array}{ll}
 y_1 = -2 + (x-3)\Psi_1(-\log|x-3|+C) & \text{pro } \Omega_1 = (-\infty, 3) \times (-2, \infty) \\
 y_2 = -2 + (x-3)\Psi_1(-\log|x-3|+C) & \text{pro } \Omega_2 = (3, \infty) \times (-\infty, -2) \\
 y_3 = -2 + (x-3)\Psi_2(-\log|x-3|+C) & \text{pro } \Omega_3 = (-\infty, 3) \times (-\infty, -2) \\
 y_4 = -2 + (x-3)\Psi_2(-\log|x-3|+C) & \text{pro } \Omega_4 = (3, \infty) \times (-2, \infty) \\
 y_5 \equiv -2 & \text{na } (-\infty, 3) \\
 y_6 \equiv -2 & \text{na } (3, \infty).
 \end{array}$$

Příklad 8.4.14. Řešme úlohu $y' = \cos(y-x)$. To odpovídá situaci $\alpha = \beta = 0$. Definujeme pomocnou funkci $z = y-x$ a dostáváme

$$z' = y' - 1 = \cos z - 1$$

(povšimněte si ještě, že y řeší úlohu $y' = \cos(y-x)$ na nějakém intervalu (a, b) právě tehdy, když $z = y-x$ řeší úlohu $z' = \cos z - 1$ na (a, b)). Druhá úloha je rovnice se separovanými proměnnými řešitelná na množinách tvaru $\Omega_k := \mathbb{R} \times (2k\pi, 2(k+1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$, kde dostáváme

$$\cot \frac{z}{2} = - \int \frac{dz}{2 \sin^2 \frac{z}{2}} = \int \frac{dz}{\cos z - 1} = \int dx = x + C.$$

Na Ω_k pak máme


$$z = 2 \operatorname{arccot}(x + C) + 2k\pi.$$

Mimo $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \Omega_k$ ještě získáváme triviální řešení


$$z \equiv 2k\pi.$$

Pro původní úlohu tedy dostáváme řešení typů

$$y = 2k\pi + x \quad \text{a} \quad y = 2 \operatorname{arccot}(x + C) + 2k\pi + x.$$



Obrázek 8.8: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $z' = \cos z - 1$.

Obrázek 8.9: Náčrt částí několika větví obecného řešení rovnice $y' = \cos(y - x)$.

8.4.6 Lineární diferenciální rovnice prvního řádu

Lineární diferenciální rovnice prvního řádu je rovnice typu

$$y'(x) + p(x)y(x) = f(x),$$

pro kterou uvažujeme počáteční podmínku

$$y(x_0) = y_0.$$

Předpokládáme, že $p, f \in C((a, b))$, $x_0 \in (a, b)$ a $y_0 \in \mathbb{R}$. Tento typ rovnic jsme si už představili v kapitole o primitivních funkcích. Naučili jsme se řešení *metodou integračního faktoru* a dokázali existenci a jednoznačnost řešení. Pro úplnost si metodu integračního faktoru stručně připomeňme. Původní rovnici přenásobíme výrazem $e^{\int p(x) dx}$ a povšimneme si, že levou stranu je pak možné napsat jako derivaci součinu

$$\left((y(x)e^{\int p(x) dx})' \right) = y'(x)e^{\int p(x) dx} + p(x)y(x)e^{\int p(x) dx} = f(x)e^{\int p(x) dx}.$$

Odtud

$$y(x)e^{\int p(x) dx} = \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx + C$$

a dostáváme

$$y(x) = Ce^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx.$$

Díky počáteční podmínce nyní určíme jednoznačné $C \in \mathbb{R}$ (neboť $e^{-\int p(x) dx} > 0$ na (a, b)), aby platilo $y(x_0) = y_0$. Všechny primitivní funkce existují díky spojitosti integrandů.

Poznámka 8.4.15. (i) Integrační faktor není určen jednoznačně. Můžeme použít jakýkoliv jeho násobek, což je ostatně důvod, proč se při jeho hledání nestaráme o aditivní konstantu po integraci.

(ii) Díky tomu, že už umíme řešit rovnici se separovanými proměnnými, už není

nutné si vzorec $e^{\int p(x) dx}$ pamatovat, ale můžeme si jej odvodit. Skutečně, hledáme-li integrační faktor Q tak, aby

$$Q(y' + py) = (yQ)',$$

řešíme

$$Qy' + pQy = Qy' + Q'y \iff pQy = Q'y \iff Q' = pQ.$$

Rovnice úplně napravo má separované proměnné a dostáváme

$$\log |Q| = \int \frac{dQ}{Q} = \int p(x) dx + C,$$

tedy pro $K \in \mathbb{R}$ (případ $K = 0$ nám dal triviální řešení)

$$Q(x) = Ke^{\int p(x) dx}.$$

Navíc podle Věty o řešení rovnice se separovanými proměnnými (Věta 8.4.6) dostáváme vždy řešení na (a, b) (díky spojitosti $p(x)$ na (a, b) a tomu, že v roli funkce G^{-1} zde vystupuje exponenciála, která nezúží definiční obor řešení).

Poznamenejme ještě, že tento typ rovnic je také možné řešit metodou variace konstant. Připomeňme, že tuto metodu jsme si představili v kapitole o primitivních funkcích pro lineární obyčejné diferenciální rovnice 2. řádu. Nejprve se vyřeší úloha s nulovou pravou stranou

$$y_h' + p(x)y_h = 0,$$

což je úloha se separovanými proměnnými, pro kterou máme

$$\log |y_h| = \int \frac{dy_h}{y_h} = - \int p(x) dx + C.$$

Odtud

$$y_h(x) = Ke^{-\int p(x) dx}$$

je řešení na (a, b) pro každé $K \in \mathbb{R}$ (Věta o řešení rovnice se separovanými proměnnými, tedy Věta 8.4.6, zde funguje vždy, podobně jako v předchozí poznámce). Pokud nyní do původní rovnice dosadíme $y_p(x) = c(x)e^{-\int p(x) dx}$, dostáváme

$$\begin{aligned} f(x) = y' + p(x)y &= c'(x)e^{-\int p(x) dx} - c(x)p(x)e^{-\int p(x) dx} + p(x)c(x)e^{-\int p(x) dx} \\ &= c'(x)e^{-\int p(x) dx}. \end{aligned}$$

Odtud

$$c(x) = \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx$$

(aditivní konstanta po integraci nehraje žádnou roli, neboť už je obsažena v y_h) a díky linearitě diferenciálního operátoru na levé straně řešené rovnice dostáváme

$$y = y_h + y_p = Ke^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx,$$

což je stejný výsledek, jaký dává metoda integračního faktoru.

Příklad 8.4.16. Hledejme obecné řešení rovnice $y' + \frac{1}{x}y = 3x$. Nejprve si ukažme řešení metodou integračního faktoru. Pokud bychom si vzoreček pro integrační faktor nepamatovali, řešili bychom nejprve úlohu

$$Qy' + Q\frac{1}{x}y = (Qy)' \quad \Longleftrightarrow \quad Q\frac{1}{x}y = Q'y \quad \Longleftarrow \quad Q' = \frac{1}{x}Q,$$

kde dostáváme

$$\log |Q| = \int \frac{dQ}{Q} = \int \frac{dx}{x} = \log |x| + C.$$

Pokud bychom nyní postupovali striktně podle výše uvedených postupů, pracovali bychom s $Q = |x|$. Výhodnější je použít $Q(x) = x$ (ze zadání je jasné, že musíme pracovat zvlášť na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$, nijak tedy nevádí, když na těchto intervalech použijeme odlišné multiplikativní konstanty pro integrační faktor). Celkově tedy máme rovnici

$$(xy)' = 3x^2$$

a dostáváme

$$xy = x^3 + C \quad \Longrightarrow \quad y = x^2 + \frac{C}{x} \quad \text{na } (-\infty, 0) \text{ nebo na } (0, \infty).$$

Pokud bychom zvolili metodu variace konstant, nejprve bychom řešili

$$y'_h = -\frac{1}{x}y_h.$$

Odtud

$$\log |y_h| = \int \frac{dy_h}{y_h} = -\int \frac{1}{x} dx = -\log |x| + C$$

a po přidání triviálního řešení, úpravě a přeznačení multiplikativních konstant na jednotlivých intervalech (jako výše) máme

$$y_h = K\frac{1}{x}.$$

Variaci konstant provádíme v podobě $y_p = c(x)\frac{1}{x}$ a po dosazení máme

$$3x = y'_p + \frac{1}{x}y_p = c'(x)\frac{1}{x} - c(x)\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}c(x)\frac{1}{x} = c'(x)\frac{1}{x}.$$

Proto

$$c'(x) = 3x^2 \quad \Longrightarrow \quad c(x) = x^3$$

a celkově

$$y = y_h + y_p = K\frac{1}{x} + x^2 \quad \text{na } (-\infty, 0) \text{ nebo na } (0, \infty).$$

Poznámka 8.4.17. (i) Obě metody řešení obsahují dvě integrace, takže při standardním provedení bývají přibližně stejně dlouhé. Nicméně metoda integračního faktoru se dá občas urychlit tím, že se v jednoduchých situacích integrační faktor uhodne.

(ii) Uvedení dvou metod řešení u jednoho typu rovnice se může zdát jako plýtvání časem čtenáře. Uvedené metody však budou mít další uplatnění a lineární rovnice prvního řádu nabízejí jednoduchý typ problémů, kde se tyto metody dají procvičit. Metodu variace konstant budeme později používat u řešení lineárních rovnic vyššího řádu (v kapitole o primitivní funkci jsme ji používali na rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty, tuto metodu však lze použít i na rovnice vyššího řádu a dokonce koeficienty nemusí být konstantní ale zastoupené spojitou funkcí). Metodu integračního faktoru naopak použijeme u rovnic *ve tvaru totálního diferenciálu*, což jsou rovnice prvního řádu s komplikovanější závislostí y' na x a y , než s jakou pracujeme zde. Tento typ diferenciálních rovnic však nejprve vyžaduje důkladnou přípravu z diferenciálního počtu funkcí více proměnných.

Cvičení 8.4.18. Dokažte existenci a jednoznačnost řešení lineární rovnice prvního řádu pomocí Picard–Lindelöfovy existenční věty (Věta 8.3.5).

8.4.7 Bernoulliova rovnice

Bernoulliovou rovnicí se nazývá

$$y'(x) + p(x)y(x) = f(x)y^\alpha.$$

Opět uvažujeme počáteční podmínku

$$y(x_0) = y_0.$$

Předpokládáme $p, f \in C((a, b))$, $x_0 \in (a, b)$, $y_0 \in \mathbb{R}$ a $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Předně poznamenejme, že vynechání případů $\alpha = 0$ a $\alpha = 1$ nám není na škodu, neboť v takových případech se jedná o lineární rovnici prvního řádu, kterou už umíme řešit.

Pokud je $\alpha < 0$, Bernoulliova rovnice nemá dobrý smysl na x -ové ose, je tedy ještě nutné požadovat $y_0 \neq 0$ a úloha se řeší zvlášť na množinách $(a, b) \times (-\infty, 0)$ a $(a, b) \times (0, \infty)$ (bez možnosti slepení; navíc druhá z množin připadá v úvahu jen pro některé hodnoty exponentu α : celočíselné exponenty či exponenty odpovídající lichým odmocninám). Naopak, pro $\alpha \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ máme vždy triviální řešení $y \equiv 0$. Netriviální řešení hledáme opět na množinách $(a, b) \times (-\infty, 0)$ a $(a, b) \times (0, \infty)$ (vyžaduje to metoda, kterou si uvedeme níže; druhá z množin připadá v úvahu opět jen pro některá α) a případné slepení diskutujeme na konci výpočtu.

Když máme zaručenou nenulovost y , naše úloha je ekvivalentní (rovnici dělíme y^α)

$$y' y^{-\alpha} + p(x) y^{1-\alpha} = f(x).$$

Definujme novou funkci $z(x) = y^{1-\alpha}(x)$, máme $z' = (1 - \alpha)y^{-\alpha}y'$ (oprávněnost zderivování vysvětlíme níže), a proto

$$\frac{1}{1-\alpha} z' + pz = f. \tag{8.4.1}$$

Po přenásobení konstantou $1 - \alpha$ dostáváme lineární diferenciální rovnici prvního řádu, která má za našich předpokladů na p, f jednoznačné řešení pro každou počáteční podmínku z na $(a, b) \times \mathbb{R}$.

Nyní každé počáteční podmínce $(x_0, y_0) \in (a, b) \times (0, \infty)$ pro původní rovnici odpovídá počáteční podmínka $(x_0, z_0) = (x_0, y_0^{1-\alpha}) \in (a, b) \times (0, \infty)$. Dále, řeší-li y původní rovnici na $(a, b) \times (0, \infty)$, pak y je diferencovatelné, platí

$$\frac{d}{dx}(y^{1-\alpha}(x)) = (1-\alpha)y^{-\alpha}y' \quad \text{na } (a, b)$$

a $z = y^{1-\alpha}$ řeší rovnici (8.4.1) na $(a, b) \times (0, \infty)$. Naopak, pokud z řeší rovnici (8.4.1) na $(a, b) \times (0, \infty)$, pak je

$$\frac{d}{dx}z^{\frac{1}{1-\alpha}} = \frac{1}{1-\alpha}z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}z' \quad \text{na } (a, b)$$

a $y = z^{\frac{1}{1-\alpha}}$ splňuje

$$y' = \frac{d}{dx}z^{\frac{1}{1-\alpha}} = \frac{1}{1-\alpha}z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}z' = z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}(f - pz) = y^\alpha f - y^\alpha p y^{1-\alpha} = f y^\alpha - p y,$$

tedy y řeší původní rovnici. Celkově jsme z existence a jednoznačnosti rovnice (8.4.1) na $(a, b) \times (0, \infty)$ získali existenci a jednoznačnost Bernoulliovy rovnice na $(a, b) \times (0, \infty)$. Podobně se postupuje na $(a, b) \times (-\infty, 0)$ (pro exponenty α přípustnější práci se zápornými čísly). Obecně však může řešení Bernoulliovy rovnice na $(a, b) \times (-\infty, 0)$ být také odvozeno z řešení rovnice (8.4.1) na $(a, b) \times (0, \infty)$ (podívejte se na Příklad 8.4.20). Povšimněme si, že podle Picard–Lindelöfovy věty (Věta 8.3.5) slepování s triviálním řešením může nastat jen pro $\alpha \in (0, 1)$.

Příklad 8.4.19. Řešme úlohu

$$y' + 2y = y^2 e^x$$

se dvěma variantami počáteční podmínky

$$y(0) = \frac{1}{2} \quad \text{a} \quad y(0) = -\frac{1}{2}.$$

Postupem popsáním výše dostáváme na množinách $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a $\mathbb{R} \times (0, \infty)$

$$y'y^{-2} + 2y^{-1} = e^x.$$

Pro $z = y^{-1}$ pak máme $z' = -y^{-2}y'$, a proto má rovnice (8.4.1) tvar

$$-z' + 2z = e^x \quad \iff \quad z' - 2z = -e^x.$$

Integrační faktor e^{-2x} dává

$$z = e^{2x} \int (-e^{-x}) dx = e^x + C e^{2x}.$$

V případě počáteční podmínky $y(0) = \frac{1}{2}$ pracujeme na $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ (na stejné množině probíhalo řešení pomocné diferenciální rovnice) a z možných větví obecného řešení

$$y(x) = \frac{1}{e^x + Ce^{2x}}$$

nám počáteční podmínka vybírá větev

$$y(x) = \frac{1}{e^x + e^{2x}} \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$

V případě počáteční podmínky $y(0) = -\frac{1}{2}$ pracujeme na $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a dostáváme

$$y(x) = \frac{1}{e^x - 3e^{2x}} \quad \text{pro } x \in (-\log 3, \infty).$$

Příklad 8.4.20. Řešme počáteční úlohu

$$y' + \frac{3}{2}y = \frac{3}{2}xy^{\frac{1}{3}} \quad y(2) = 1.$$

Nejprve si povšimněme, že jako obecné řešení připadá také v úvahu triviální řešení $y \equiv 0$. Na množinách $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ postupujeme standardně a dostáváme pro pomocnou funkci $z = y^{1-\frac{1}{3}} = y^{\frac{2}{3}}$

$$y'y^{-\frac{1}{3}} + \frac{3}{2}y^{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}x \quad \iff \quad z' + z = x.$$

Pro rovnici výše lze zřejmě použít integrační faktor e^x a dostáváme obecné řešení na $\mathbb{R} \times (0, \infty)$

$$z = e^{-x} \int xe^x dx = e^{-x}((x-1)e^x + C) = x - 1 + Ce^{-x}.$$

Odtud máme obecné řešení Bernoulliovy rovnice na $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ tvaru

$$y = (x - 1 + Ce^{-x})^{\frac{3}{2}} \quad \text{pro } x \text{ z intervalu, kde } x - 1 + Ce^{-x} > 0$$

a na $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$

$$y = -(x - 1 + Ce^{-x})^{\frac{3}{2}} \quad \text{pro } x \text{ z intervalu, kde } x - 1 + Ce^{-x} > 0.$$

Díky počáteční podmínce $y(2) = 1$ z množiny $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ vybíráme jednoznačnou větev $y = (x - 1)^{\frac{3}{2}}$. Protože však pro tuto funkci platí $y'(x) \rightarrow 0$ pro $x \rightarrow 1_+$, lze toto řešení slepit v bodě $(1, 0)$ s řešením triviálním. Možným řešením je tedy

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in (-\infty, 1] \\ (x - 1)^{\frac{3}{2}} & \text{pro } x \in (1, \infty). \end{cases}$$

Podobně se dá ověřit, že máme i další řešení, například

$$y(x) = \begin{cases} (x - 1 + e^{-x})^{\frac{3}{2}} & \text{pro } x \in (-\infty, 0) \\ 0 & \text{pro } x \in [0, 1] \\ (x - 1)^{\frac{3}{2}} & \text{pro } x \in (1, \infty). \end{cases}$$

a

$$y(x) = \begin{cases} -(x-1 + e^{-x})^{\frac{3}{2}} & \text{pro } x \in (-\infty, 0) \\ 0 & \text{pro } x \in [0, 1] \\ (x-1)^{\frac{3}{2}} & \text{pro } x \in (1, \infty). \end{cases}$$

S Bernoulliovou rovnicí úzce souvisí Riccatiova rovnice

$$y'(x) + p(x)y(x) + q(x)y^2(x) = f(x),$$

kde $p, q, f \in C((a, b))$. Obecný postup řešení není znám, ale v případě znalosti jednoho řešení y_1 dostáváme pro $z = y - y_1$

$$\begin{aligned} z' + y_1' + pz + py_1 + qy_1^2 + 2qy_1z + qz^2 &= f \\ \iff z' + pz + 2qy_1z + qz^2 &= 0 \\ \iff z' + (p + 2qy_1)z &= -qz^2. \end{aligned}$$

Tím jsme Riccatiovu rovnici převedli na rovnici Bernoulliovu, kterou jsme se naučili řešit výše. Protože jsme od Riccatiový rovnice přešli k Bernoulliově rovnici jen přičtením diferencovatelné funkce, je zřejmé, že pokud nalezneme nějaké řešení Riccatiový rovnice, existence a jednoznačnost řešení příslušné počáteční úlohy je potom ekvivalentní existenci a jednoznačnosti získané Bernoulliovy rovnice na příslušném intervalu (musí se ale přepočítat počáteční podmínka).

Poznámka 8.4.21. Řešení y_1 se obvykle hledá metodou uhodnutí kombinovanou s metodou neurčitých koeficientů.

Příklad 8.4.22. Na intervalu $(0, \infty)$ řešme rovnici

$$y' + \frac{1}{x}y + y^2 = \frac{4}{x^2}.$$

Pokud se pokusíme typnout řešení ve tvaru $y_1 := ax + b$, dostáváme

$$a + a + \frac{b}{x} + a^2x^2 + 2abx + b^2 = \frac{4}{x^2},$$

což je rovnost, kterou nemůžeme splnit žádnou volbou koeficientů, neboť žádný člen levé strany není násobkem $\frac{1}{x^2}$.

Pokud zkusíme volbu $y_1 := \frac{a}{x} + b$, dostáváme

$$-\frac{a}{x^2} + \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + \frac{a^2}{x^2} + \frac{2ab}{x} + b^2 = \frac{4}{x^2},$$

čemuž vyhovíme například volbou $a = 2$ a $b = 0$ (šlo by i $a = -2$ a $b = 0$, odpovídající řešení získáme spolu se ostatními pomocí Bernoulliovy rovnice). Dostáváme tedy Bernoulliovu rovnici (píšeme $y_1 := \frac{2}{x}$ a rovnou dosazujeme do vzorce získaného v obecném případě)

$$z' + \left(\frac{1}{x} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{x}\right)z = -z^2 \quad \iff \quad z' + \frac{5}{x}z = -z^2.$$

Tuto Bernoulliuvu rovnici řešíme na množinách $(0, \infty) \times (-\infty, 0)$ a $(0, \infty) \times (0, \infty)$ (vzhledem k zadání příkladu), kde dostáváme pro $w := \frac{1}{z}$

$$\frac{-z'}{z^2} - \frac{5}{x} \frac{1}{z} = 1 \iff w' - \frac{5}{x}w = 1 \iff \left(\frac{1}{x^5}w\right)' = \frac{1}{x^5}w' + \frac{-5}{x^6}w = \frac{1}{x^5}.$$

Odtud

$$w = x^5 \int \frac{1}{x^5} dx = x^5 \left(-\frac{1}{4x^4} + C\right) = -\frac{x}{4} + Cx^5.$$

Proto

$$z = \frac{1}{-\frac{x}{4} + Cx^5} = \frac{-4}{x - 4Cx^5}.$$

Tato řešení máme jen na intervalech, kde je výraz $x - 4Cx^5$ nenulový. Navíc máme ještě triviální řešení $z \equiv 0$. Konečně dostáváme obecné řešení Riccatiový rovnice

$$y = \frac{-4}{x - 4Cx^5} + \frac{2}{x} \quad \text{respektive} \quad y = \frac{2}{x}.$$

Příklad 8.4.23. Na \mathbb{R} řešíme rovnici

$$y' = y^2 - (2x + 1)y + (1 + x + x^2).$$

Zkusme hledat řešení y_1 ve tvaru $y_1 := ax + b$. Pak máme

$$\begin{aligned} a &= (ax + b)^2 - (2x + 1)(ax + b) + 1 + x + x^2 \\ &= a^2x^2 + 2abx + b^2 - (2ax^2 + 2bx + ax + b) + 1 + x + x^2 \\ &= (a^2 - 2a + 1)x^2 + (2ab - 2b - a + 1)x + b^2 - b + 1. \end{aligned}$$

Porovnání koeficientů u x^2 dává $a = 1$. Dále pozorujeme, že buď $b = 0$ nebo $b = 1$. Položme tedy třeba $y_1 := x$ a následně $z := y - x$. Pak po úpravě dostáváme rovnici

$$z' + z = z^2.$$

Tuto Bernoulliuvu rovnici řešíme na množinách $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ a $\mathbb{R} \times (0, \infty)$, kde dostáváme pro $w := \frac{1}{z}$

$$\frac{-z'}{z^2} - \frac{1}{z} = -1 \iff w' - w = -1 \iff \left(e^{-x}w\right)' = e^{-x}w' - e^{-x}w = -e^{-x}.$$

Odtud

$$w = e^x \int (-e^{-x}) dx = e^x (e^{-x} + C) = 1 + Ce^x.$$

Proto

$$z = \frac{1}{1 + Ce^x} \quad a \quad y = x + \frac{1}{1 + Ce^x}$$

na intervalech, kde $1 + Ce^x \neq 0$. Triviální řešení Bernoulliovy rovnice $z \equiv 0$ ještě dává řešení $y = x$, ale to jsme již znali.

8.5 Lineární rovnice n -tého řádu

Nechť $f, a_0, a_1, \dots, a_n \in C((a, b))$. Rovnice

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

se nazývá *lineární rovnice n -tého řádu*. Funkcím a_0, \dots, a_n říkáme *koefficienty* a f je *pravá strana*. Pro jednoduchost zápisu budeme v dalším používat značení

$$Ly := a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y.$$

Naše úloha má tedy tvar $Ly = f$. Rovnice

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \quad \text{neboli} \quad Ly = 0$$

se nazývá *homogenní rovnice* příslušející k $Ly = f$.

Základní existenční výsledek je vybudován na Picard–Lindelöfově existenční větě (Věta 8.3.5).

Věta 8.5.1 (Globální existence a jednoznačnost pro rovnici n -tého řádu). *Nechť $f, a_0, a_1, \dots, a_n \in C((a, b))$ a $a_n \neq 0$ na (a, b) . Pak pro každé $x_0 \in (a, b)$ a každé $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ existuje jednoznačné řešení rovnice $Ly = f$ na (a, b) splňující*

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Důkaz. Podělíme-li rovnici $Ly = f$ nenulovým výrazem $a_n(x)$ a přepíšeme-li si výsledek jako soustavu rovnic prvního řádu (používáme postup ze začátku kapitoly), dostáváme soustavu $\mathbf{u}' = G(x, \mathbf{u})$ ve tvaru

$$\begin{aligned} u_1' &= u_2 \\ u_2' &= u_3 \\ &\vdots \\ u_{n-1}' &= u_n \\ u_n' &= -\frac{a_0(x)}{a_n(x)}u_1 - \frac{a_1(x)}{a_n(x)}u_2 - \dots - \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)}u_n + \frac{f(x)}{a_n(x)} \end{aligned} \tag{8.5.1}$$

s počáteční podmínkou

$$u_1(x_0) = y_0, \quad u_2(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad u_n(x_0) = y_{n-1}. \tag{8.5.2}$$

Tato úloha splňuje předpoklady Picard–Lindelöfovy existenční věty a dostáváme lokální existenci a jednoznačnost na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ pro jisté $\delta > 0$. Zbývá ukázat, že řešení dokážeme jednoznačně prodloužit na celé (a, b) . Prodloužení zkonstruujeme v několika krocích. Podrobný důkaz provedeme jen pro prodloužení doleva do bodu a , pro prodloužení do bodu b se postupuje analogicky.

Předpokládejme, že máme řešení na intervalu $(z, x_0 + \delta)$, kde $a < z \leq x_0 - \delta$ (v první fázi pracujeme s $z := x_0 - \delta$) a $x_0 + \delta < b$.

Krok 1: omezenost řešení a jeho derivací na $(z, x_0 + \delta)$.

Nejprve odhadneme eukleidovskou velikost vektoru $u = (u_1, \dots, u_n)$ pro $x \in (z, x_0 + \delta)$. Pro derivaci její druhé mocniny ze soustavy (8.5.1) vyčteme rovnost, na kterou následně použijeme Youngovu nerovnost spolu s omezeností spojitých koeficientů a_j a pravé strany f na omezeném uzavřeném intervalu $[z, x_0 + \delta]$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} |\mathbf{u}|^2 &= \frac{d}{dx} \sum_{i=1}^n u_i^2 = 2 \sum_{i=1}^n u_i u_i' \\ &= 2 \sum_{i=1}^{n-1} u_i u_{i+1} - 2 \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j(x)}{a_n(x)} u_{j+1} u_n + 2 \frac{f(x)}{a_n(x)} u_n \\ &\leq \sum_{i=1}^{n-1} (u_i^2 + u_{i+1}^2) + \sum_{j=0}^{n-1} \max_{[z, x_0 + \delta]} \left| \frac{a_j(x)}{a_n(x)} \right| (u_{j+1}^2 + u_n^2) \\ &\quad + \max_{[z, x_0 + \delta]} \frac{1}{|a_n(x)|} \left(\max_{[z, x_0 + \delta]} f^2 + u_n^2 \right) \\ &\leq C_1 |\mathbf{u}|^2 + C_2, \end{aligned}$$

kde $C_1, C_2 > 0$. Proto také platí pro všechna $x \in (z, x_0 + \delta)$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(e^{-C_1(x-x_0)} |\mathbf{u}|^2 \right) &= e^{-C_1(x-x_0)} \frac{d}{dx} |\mathbf{u}|^2 - e^{-C_1(x-x_0)} C_1 |\mathbf{u}|^2 \\ &= e^{-C_1(x-x_0)} \left(\frac{d}{dx} |\mathbf{u}|^2 - C_1 |\mathbf{u}|^2 \right) \\ &\leq C_2 e^{-C_1(x-x_0)} \leq C_3. \end{aligned}$$

Odtud

$$\begin{aligned} |\mathbf{u}(x)|^2 &= e^{C_1(x-x_0)} |\mathbf{u}(x_0)|^2 + e^{C_1(x-x_0)} \left(e^{-C_1(x-x_0)} |\mathbf{u}(x)|^2 - |\mathbf{u}(x_0)|^2 \right) \\ &= e^{C_1(x-x_0)} |\mathbf{u}(x_0)|^2 + e^{C_1(x-x_0)} \left(\int_{x_0}^x \frac{d}{dt} \left(e^{-C_1(t-x_0)} |\mathbf{u}|^2(t) \right) dt \right) \\ &\leq C + C \left| \int_{x_0}^x C_3 dt \right| \leq C. \end{aligned}$$

Vektor $\mathbf{u}(x)$ má díky tomu omezené složky na $(z, x_0 + \delta)$. Následně jsou zde také omezené derivace jednotlivých složek (máme omezené pravé strany v (8.5.1)). Z toho také plyne, že řešení je lipschitzovské na $(z, x_0 + \delta)$.

Krok 2: limity v krajním bodě z .

Zafixujme $i \in \{1, \dots, n\}$. Zvolme posloupnost $\{x_j\} \subset (z, x_0 + \delta)$ takovou, aby $x_j \rightarrow z$. Protože funkce u_i je podle předchozího kroku omezená na $(z, x_0 + \delta)$, je omezená i posloupnost $\{u_i(x_j)\}$. Po přechodu k podposloupnosti dostáváme $U_i \in \mathbb{R}$ tak, že $u_i(x_{j_k}) \rightarrow U_i$. Ke zvolenému $\varepsilon > 0$ díky lipschitzovskosti u_i (konstantu lipschitzovskosti označme L) snadno obdržíme pro $k \in \mathbb{N}$ dost velké a $x \in (z, x_0 + \delta)$ dost blízko k z

$$|u_i(x) - U_i| \leq |u_i(x) - u_i(x_{j_k})| + |u_i(x_{j_k}) - U_i| \leq L|x - x_{j_k}| + |u_i(x_{j_k}) - U_i| \leq L\varepsilon + \varepsilon.$$

Odtud

$$\lim_{x \rightarrow z_+} u_i(x) = U_i.$$

Krok 3: platnost (8.5.1) v krajním bodě z .

Podle předchozího kroku lze vektorovou funkci u spojitě dodefinovat v bodě z . Ukažme, že pro takto dodefinovanou funkci je soustava rovnic (8.5.1) splněna i v bodě z , uvažujeme-li jednostranné derivace (z vnitřní strany intervalu). To však okamžitě plyne z Věty o limitě derivací (Věta 6.3.9) a spojitosti jednotlivých složek vektorové funkce \mathbf{u} na $[z, x_0 + \delta)$ a spojitosti koeficientů a pravé strany.

Krok 4: prodloužení řešení za bod z .

Uvažujme soustavu rovnic (8.5.1) tentokrát s počáteční podmínkou odpovídající našim výsledkům ze druhého kroku

$$u_1(z) = U_1, \quad u_2(z) = U_2, \quad \dots, \quad u_n(z) = U_n.$$

Podle Picard–Lindelöfovy existenční věty má nová úloha jednoznačné řešení na jistém $(z - \tau, z + \tau)$. Toto řešení se na množině $[z, z + \tau) \cap [z, x_0 + \delta)$ musí shodovat s řešením, o kterém jsme hovořili v předchozích krocích (kdyby tomu tak nebylo, mohli bychom díky třetímu kroku v bodě z slepit naše původní řešení s restrikcí nového řešení na $(z - \tau, z]$ a byla by porušena jednoznačnost z Picard–Lindelöfovy existenční věty). Umíme tedy prodloužit řešení za bod z .

Krok 5: prodloužení řešení na $(a, x_0 + \delta)$.

Definujme množinu intervalů

$$\mathcal{M} := \{(\alpha, x_0 + \delta) \subset (a, b) : \text{na } (\alpha, x_0 + \delta) \text{ existuje řešení (8.5.1) a (8.5.2)}\}.$$

Množina \mathcal{M} je neprázdná, neboť $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \in \mathcal{M}$. Dále z Picard–Lindelöfovy existenční věty plyne, že kdykoliv $(\alpha_1, x_0 + \delta), (\alpha_2, x_0 + \delta) \in \mathcal{M}$, jim odpovídající řešení se shodují na průniku těchto intervalů (v Kroku 4 jsme provedli podrobné zdůvodnění v analogické situaci). Definujme

$$A := \inf_{(\alpha, x_0 + \delta) \in \mathcal{M}} \alpha.$$

Zřejmě platí $a \leq A \leq x_0 - \delta$. Ukažme, že platí $A = a$. Pokud by tomu tak nebylo, využili bychom toho, že z definice infima umíme zkonstruovat posloupnost $\{\alpha_n\} \subset (A, x_0 + \delta)$ takovou, že $\alpha_n \rightarrow A$ a $(\alpha_n, x_0 + \delta) \in \mathcal{M}$. Díky tomu a jednoznačnosti zmíněné výše bychom měli řešení úlohy (8.5.1) a (8.5.2) definované na intervalu $(A, x_0 + \delta)$ (skutečně, každý bod $x \in (A, x_0 + \delta)$ leží v některém z intervalů $(\alpha_n, x_0 + \delta)$). Ale v takové situaci bychom mohli použít Kroky 1 až 4 na prodloužení našeho řešení až za bod A (opět se využije toho, že $[A, x_0 + \delta]$ je omezený uzavřený interval). Tím ale dostáváme spor s definicí A .

Proto $A = a$ a výše uvedenou konstrukcí využívající posloupnost $\{\alpha_n\} \subset (A, x_0 + \delta)$ splňující $\alpha_n \rightarrow A$ dostaneme řešení (8.5.1) a (8.5.2) na $(a, x_0 + \delta)$. Prodloužení řešení na celé (a, b) se provede analogicky. \square

Tvrzení 8.5.2 (Tvar řešení při nulových datech). *Jestliže pravá strana splňuje $f \equiv 0$ na (a, b) a pro počáteční podmínky platí $y_0 = \dots = y_{n-1} = 0$, pak řešení úlohy $Ly = f$ platí $y \equiv 0$ na (a, b) .*

Důkaz. Zřejmě identicky nulová funkce je řešením s předepsanými vlastnostmi. Dále jednoznačnost daná předchozí větou zaručuje, že jiné řešení není. \square

Podobně jako u lineárních rovnic druhého řádu s konstantními koeficienty, s nimiž jsme se seznámili v kapitole o primitivní funkci, i zde budeme hledat všechna řešení rovnice $Ly = f$ za pomoci linearitě diferenciálního operátoru L . Opět nalezneme všechna řešení y_h jednodušší *homogenní rovnice* $Ly = 0$ a pak budeme hledat jedno *partikulární* řešení y_p původní rovnice $Ly = f$. Celkově pak předpis $y = y_h + y_p$, kde y_h probíhá všechna řešení homogenní rovnice, bude dávat všechna řešení rovnice $Ly = f$.

8.5.1 Homogenní rovnice: obecné výsledky

V dalším se budeme snažit nalézt všechna řešení homogenní úlohy $Ly = 0$. Tato řešení díky linearitě operátoru L tvoří vektorový prostor (podprostor prostoru $C^n((a, b))$). Strukturu na tomto prostoru nám dá vhodná definice lineární nezávislosti.

Definice 8.5.3 (Lineární nezávislost funkcí). Řekneme, že $u_1, \dots, u_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definované na $(a, b) \subset \mathbb{R}$ jsou *lineárně nezávislé* na (a, b) , jestliže pro každou n -tici $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \equiv 0 \quad \text{na } (a, b) \quad \implies \quad \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

V opačném případě říkáme, že u_1, \dots, u_n jsou *lineárně závislé* na (a, b) .

Věta 8.5.4 (O prostoru řešení homogenní rovnice). *Množina všech řešení homogenní rovnice $Ly = 0$ tvoří n -dimenzionální podprostor prostoru $C^n((a, b))$.*

Důkaz. Každé řešení je podle definice pojmu řešení n -krát diferencovatelné. Navíc přepis rovnice $Ly = 0$ do tvaru

$$y^{(n)}(x) = - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i(x)}{a_n(x)} y^{(i)}(x)$$

zaručuje, že dokonce máme $y \in C^n((a, b))$.

Z linearitě operátoru L navíc plyne, že řešení tvoří podprostor $C^n((a, b))$. Zbývá zjistit jeho dimenzi.

Zafixujme libovolné $x_0 \in (a, b)$. Podle Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu (Věta 8.5.1) existují funkce $u_0, \dots, u_{n-1} \in C^n((a, b))$ takové, že u_i splňuje úlohu $Ly = 0$ s počátečními podmínkami

$$u_i^{(j)}(x_0) = \delta_{ij}$$

(δ_{ij} je *Kroneckerovo delta*). Tato řešení jsou lineárně nezávislá, neboť pokud máme

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(x) \equiv 0 \quad \text{na } (a, b),$$

nutně totéž platí pro všechny derivace funkce nalevo a po dosazení $x = x_0$ z počátečních podmínek postupně získáme $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Odtud vidíme, že dimenze prostoru řešení je alespoň n . Ukažme ještě, že každé řešení úlohy $Ly = 0$ je lineární kombinací funkcí u_0, \dots, u_{n-1} . Nechť tedy y řeší $Ly = 0$ na (a, b) . Pro $i = 0, \dots, n-1$ definujme $\beta_i = y^{(i)}(x_0)$. Pak funkce

$$w := y - \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i u_i$$

je lineární kombinací řešení homogenní rovnice, a proto ji řeší také. Dále v bodě x_0 platí

$$w^{(j)}(x_0) = 0 \quad \text{pro všechna } j \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Odtud podle Tvzení o tvaru řešení při nulových datech (Tvzení 8.5.2) dostáváme $w \equiv 0$ na (a, b) , tedy $y = \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i u_i$ na (a, b) . \square

Postupně si odvodíme další výsledky o prostoru řešení homogenní rovnice. K tomu potřebujeme ještě zadefinovat dva nové pojmy.

Definice 8.5.5 (Fundamentální systém). Množina u_1, \dots, u_n se nazývá *fundamentální systém* rovnice $Ly = 0$ na (a, b) , jestliže funkce u_1, \dots, u_n řeší $Ly = 0$ na (a, b) a jsou zde lineárně nezávislé.

Definice 8.5.6 (Wronskián). *Wronského determinant* (častěji zkráceně *wronskián*) funkcí $u_1, \dots, u_n \in C^{(n-1)}((a, b))$ v bodě $x \in (a, b)$ je

$$W_{[u_1, u_2, \dots, u_n]}(x) := \det \begin{pmatrix} u_1(x) & u_2(x) & \dots & u_n(x) \\ u_1'(x) & u_2'(x) & \dots & u_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)}(x) & u_2^{(n-1)}(x) & \dots & u_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}.$$

Výše uvedená matice se nazývá *Wronského matice*.

Věta 8.5.7 (Obecný vztah lineární závislosti a wronskiánu). *Jsou-li $u_1, \dots, u_n \in C^{(n-1)}((a, b))$ lineárně závislé na (a, b) , pak $W_{[u_1, u_2, \dots, u_n]} \equiv 0$ na (a, b) .*

Důkaz. Lineární závislost implikuje, že matice z definice wronskiánu má lineárně závislé sloupce, a proto je wronskián nulový. \square

Obrácená implikace v předchozí větě obecně neplatí. Skutečně, funkce

$$u_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in (-\infty, 0] \\ x^3 & \text{pro } x \in (0, \infty) \end{cases} \quad \text{a} \quad u_2(x) = \begin{cases} x^3 & \text{pro } x \in (-\infty, 0] \\ 0 & \text{pro } x \in (0, \infty) \end{cases}$$

jsou lineárně nezávislé na \mathbb{R} , ale snadno se spočítá, že $W_{[u_1, u_2]} \equiv 0$ na \mathbb{R} . Všimněme si, že obě funkce jsou třídy $C^2(\mathbb{R})$.

Na druhou stranu, řešení rovnice $Ly = 0$ jsou velmi speciální funkce, pro které zmíněná obrácená implikace platí vždy. Dokonce stačí ověřovat nenulovost wronskiánu v jediném bodě. Pro získání tohoto výsledku potřebujeme ještě jedno mocné tvrzení.

Lemma 8.5.8 (Derivace wronskiánu). *Nechť u_1, \dots, u_n řeší $Ly = 0$ na (a, b) . Označme $W(x) = W_{[u_1, u_2, \dots, u_n]}(x)$. Pak*

$$W'(x) = -\frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)}W(x) \quad \text{na } (a, b).$$

Speciálně, pro libovolná $x_0, x \in (a, b)$ máme

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} dt}.$$

Důkaz. Platí následující rovnosti, které si zdůvodníme pod výpočtem

$$\begin{aligned} W' &= \frac{d}{dx} \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u_1' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} u_1' & \cdots & u_n' \\ u_1' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u_1'' & \cdots & u_n'' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \\ &\quad + \cdots + \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u_1' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n)} & \cdots & u_n^{(n)} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u_1' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{a_n} \sum_{i=0}^{n-1} a_i u_1^{(i)} & \cdots & -\frac{1}{a_n} \sum_{i=0}^{n-1} a_i u_n^{(i)} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u_1' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{n-1}}{a_n} u_1^{(n-1)} & \cdots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = -\frac{a_{n-1}}{a_n} W. \end{aligned}$$

Nejprve jsme si uvědomili, že při počítání determinantu se sčítají členy obsahující po jednom prvku z každého řádku. To nám s ohledem na pravidla derivování součiny více funkcí dává první rovnost. Získali jsme tím součet determinantů, v němž všechny matice s výjimkou té poslední obsahují dvojici totožných řádků, což má za následek nulovost odpovídajícího determinantu. V jediném zbývajícím determinantu jsme na posledním řádku využili toho, že jednotlivé funkce u_i řeší $Lu_i = 0$. Zároveň z předpisu pro operátor L zjišťujeme, že poslední řádek je součtem násobků řádků předchozích (což opět vede na nulový příspěvek do determinantu) a

členů s $(n-1)$ -tými derivacemi funkcí u_i . Celkově jsme tedy dostali násobek wronskiánu. Speciální část lemmatu plyne z první části po přenásobení integračním faktorem $e^{\int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} dt}$. \square

Poznámka 8.5.9. Ze speciální části předchozího lemmatu okamžitě plyne, že pro n -tici řešení rovnice $Ly = 0$ se wronskián buď rovná nule ve všech bodech intervalu (a, b) a nebo je ve všech bodech intervalu (a, b) nenulový.

Věta 8.5.10 (Vztah lineární závislosti a wronskiánu pro řešení). *Nechť funkce u_1, \dots, u_n řeší $Ly = 0$ na (a, b) . Pak u_1, \dots, u_n jsou lineárně nezávislá na (a, b) právě tehdy, když existuje $x_0 \in (a, b)$ splňující $W_{[u_1, u_2, \dots, u_n]}(x_0) \neq 0$.*

Důkaz. Dle Věty o obecném vztahu lineární závislosti a wronskiánu (Věta 8.5.10) implikuje lineární závislost u_1, \dots, u_n nulovost wronskiánu ve všech bodech. S ohledem na předchozí poznámku tedy zbývá ukázat, že pokud $W_{[u_1, u_2, \dots, u_n]}(x_0) = 0$ pro nějaké $x_0 \in (a, b)$, pak u_1, \dots, u_n jsou lineárně závislá.

Podmínka $W_{[u_1, u_2, \dots, u_n]}(x_0) = 0$ však znamená, že v bodě x_0 má Wronského matice lineárně závislé sloupce, a proto existuje netriviální n -tice $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tak, že

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^{(k)}(x_0) = 0 \quad \text{pro všechna } k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Pokud tedy definujeme $u := \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$, díky linearitě L je u řešením úlohy $Ly = 0$ se sadou počátečních podmínek

$$y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

Tuto úlohu zároveň zřejmě řeší i $y \equiv 0$. Díky globální jednoznačnosti řešení proto dostáváme

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \equiv 0 \quad \text{na } (a, b)$$

a jsme hotovi. \square

Naše výsledky týkající se vlastností wronskiánu se dají využívat hned několika způsoby. Jednak jde o ověření lineární nezávislosti sady řešení homogenní rovnice získané kupříkladu uhodnutím. Druhou možnou aplikací je doplnění chybějících funkcí do neúplné sady. Třetí aplikací bude zanedlouho představená metoda *variace konstant* pro hledání partikulárního řešení nehomogenní rovnice. Čtvrtou aplikací je určení konstant v předpisu pro obecné řešení, abychom zajistili splnění počátečních podmínek.

Příklad 8.5.11. V kapitole o primitivních funkcích jsme se krátce zabývali lineárními rovnicemi druhého řádu s konstantními koeficienty. Představili jsme si tři možné dvojice řešení homogenní úlohy v závislosti na kořenech charakteristického polynomu. Jednalo se o $\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}\}$ pro $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ různé, $\{e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}\}$ pro $\lambda \in \mathbb{R}$ a $\{e^{\mu x} \cos \nu x, e^{\mu x} \sin \nu x\}$ pro $\mu, \nu \in \mathbb{R}$. Snadno se ověří, že každá z těchto dvojic má nenulový wronskián, jedná se tedy pokaždé o fundamentální systém.

Příklad 8.5.12. (i) Předpokládejme, že se nám k rovnici

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

kde $p, q \in C((a, b))$, podařilo nalézt jedno řešení $u \in C^2((a, b))$, které splňuje $u \neq 0$ na (a, b) . Podle Věty o prostoru řešení homogenní rovnice (Věta 8.5.4) pak musí existovat ještě jedno lineárně nezávislé řešení v . Pak máme podle Lemmatu o derivaci wronskiánu (Lemma 8.5.8), kde můžeme předpokládat, že $W(x_0) = 1$ (neboť libovolný nenulový násobek řešení homogenní rovnice je rovněž řešením),

$$e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} = W(x) = uv' - u'v.$$

Odtud díky nenulovosti u dostáváme

$$\left(\frac{v}{u}\right)' = \frac{v'u - vu'}{u^2} = \frac{1}{u^2} e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt}.$$

Proto

$$v(x) = u(x) \int \frac{1}{u^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} dx.$$

Poznamenejme, že aditivní konstanta z integrace napravo není podstatná, neboť se ve výsledku projeví jako násobek nám již známé funkce u .

(ii) Řešme konkrétně rovnici

$$y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0 \quad \text{na } (0, \infty)$$

a předpokládejme, že se nám nějak podařilo uhodnout, že řešením je $u(x) = \frac{\sin x}{x}$ (ověřte dosazením). Pak předchozí obecný postup dává (vezmeme $x_0 = 1$ a nejjednodušší aditivní konstantu) na intervalu $(0, \pi)$

$$\begin{aligned} v(x) &= u(x) \int \frac{1}{u^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} dx = \frac{\sin x}{x} \int \frac{x^2}{\sin^2 x} e^{-\int_1^x \frac{2}{t} dt} dx \\ &= \frac{\sin x}{x} \int \frac{x^2}{\sin^2 x} e^{-2[\log t]_1^x} dx = \frac{\sin x}{x} \int \frac{x^2}{\sin^2 x} \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{\sin x}{x} (-\cot x) = -\frac{\cos x}{x}. \end{aligned}$$

Díky linearitě L není znaménko podstatné. Snadno ověříme, že v je řešením naší rovnice na $(0, \pi)$. Nenulovost wronskiánu na $(0, \pi)$ implikuje jeho nenulovost na $(0, \infty)$. Jedním z možných fundamentálních systémů je tedy $\left\{\frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x}{x}\right\}$.

(iii) U lineárních rovnic druhého řádu s konstantními koeficienty je v případě rovnice s dvojnásobným kořenem charakteristického polynomu, tedy

$$y'' - 2ay' + a^2y = 0,$$

kde $a \in \mathbb{R}$, fundamentální systém tvořen funkcemi e^{ax} a xe^{ax} . První z těchto funkcí jsme v kapitole o primitivní funkci získali pokusným dosazením funkce $x \mapsto e^{\lambda x}$,

$\lambda \in \mathbb{R}$. Druhou funkci jsme tenkrát prozradili a ověřili, že je řešením, ale neřekli, jak se na ni přijde. K tomu lze užít předchozí metodu. Při volbě $u(x) = e^{ax}$ totiž dostáváme

$$\begin{aligned} v(x) &= u(x) \int \frac{1}{u^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} dx = e^{ax} \int e^{-2ax} e^{\int_{x_0}^x 2a dt} dx \\ &= e^{ax} \int e^{-2ax_0} dx = e^{-2ax_0} x e^{ax}. \end{aligned}$$

Tedy až na (nepodstatnou) multiplikatívni konstantu jsme dostali nám známý výsledek.

(iv) V případě rovnice $y'' + 1 = 0$ a znalosti řešení $u(x) = \cos x$ dostáváme jako druhou funkci

$$\begin{aligned} v(x) &= u(x) \int \frac{1}{u^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} dx = \cos x \int \frac{1}{\cos^2 x} e^{-\int_{x_0}^x 0 dt} dx \\ &= \cos x \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \cos x \tan x = \sin x. \end{aligned}$$

Výsledek jsme získali na intervalech, kde $\cos \neq 0$. Pak použijeme lepení, či ověříme přímo zderivováním, že jsme získali opět nám známý fundamentální systém.

Cvičení 8.5.13. Rovnici $x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0$ řeší lineárně nezávislé funkce $y_1(x) = x^2$ a $y_2(x) = x^3$. Jim odpovídající wronskián je však v počátku nulový. Proč tento jev není ve sporu s výše získanými výsledky?

8.5.2 Nehomogenní rovnice. Variace konstant

Metoda variace konstant, se kterou jsme se setkali u lineárních rovnic druhého řádu s konstantními koeficienty v kapitole o primitivních funkcích a také u lineárních rovnic prvního řádu, umožňuje najít partikulární řešení i v případě naší úlohy $Ly = f$ (poznamenejme, že tato úloha v sobě zahrnuje oba zmíněné případy). Předpokládejme, že máme fundamentální systém $\{u_1, \dots, u_n\}$. Řešení homogenní rovnice jsou pak dána předpisem

$$y(x) = \sum_{i=1}^n C_i u_i(x),$$

kde C_1, \dots, C_n jsou reálné konstanty. Metoda *variace konstant* spočívá v tom, že tyto konstanty nahradíme (neznámými) $C^1((a, b))$ -funkcemi $c_1(x), \dots, c_n(x)$ (na následujícím postupu bude vidět, že skutečně nepotřebujeme vyšší derivace než první). U lineární rovnice prvního řádu jsme viděli, že už toto přepsání náš problém natolik zprůhlednilo, že jsme po dosazení nového tvaru do diferenciální rovnice okamžitě dostali předpis pro $c_1'(x)$. Zde se do podobné situace dostaneme až poté, co si uměle přidáme $n - 1$ podmínek, které zvolíme co nejvýhodněji. Postupně

derivujme předpis pro y . Dostáváme

$$\begin{aligned}
 y(x) &= \sum_{i=1}^n c_i u_i \\
 y'(x) &= \sum_{i=1}^n c_i u_i' + \sum_{i=1}^n c_i' u_i && \text{s podmínkou} && \sum_{i=1}^n c_i' u_i \equiv 0 \\
 y''(x) &= \sum_{i=1}^n c_i u_i'' + \sum_{i=1}^n c_i' u_i' && \text{s podmínkou} && \sum_{i=1}^n c_i' u_i' \equiv 0 \\
 y'''(x) &= \sum_{i=1}^n c_i u_i''' + \sum_{i=1}^n c_i' u_i'' && \text{s podmínkou} && \sum_{i=1}^n c_i' u_i'' \equiv 0 \\
 &\vdots && && \vdots \\
 y^{(n-1)}(x) &= \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-1)} + \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-2)} && \text{s podmínkou} && \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-2)} \equiv 0 \\
 y^{(n)}(x) &= \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n)} + \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-1)}.
 \end{aligned} \tag{8.5.3}$$

Právě odvozené vztahy pro derivace funkce y dosadíme do rovnice $Ly = f$. Protože funkce u_i splňují $Lu_i = 0$, máme také

$$0 = a_n \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n)} + a_{n-1} \sum_{i=1}^n c_i u_i^{(n-1)} + \cdots + a_0 \sum_{i=1}^n c_i u_i. \tag{8.5.4}$$

Proto se po dosazení odpovídající členy na levé straně vyruší a zůstane jen

$$Ly = a_n \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-1)} = f.$$

Celkově máme soustavu

$$\sum_{i=1}^n c_i' u_i \equiv 0, \quad \sum_{i=1}^n c_i' u_i' \equiv 0, \quad \dots, \quad \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-2)} \equiv 0, \quad \sum_{i=1}^n c_i' u_i^{(n-1)} = \frac{f}{a_n}.$$

Jedná se o soustavu reprezentovanou Wronského maticí. Protože wronskián odpovídající fundamentálnímu systému je vždy nenulový, dostáváme pro každé $x \in (a, b)$ jednoznačně danou hodnotu $c_1'(x), \dots, c_n'(x)$. Aplikujeme-li na soustavu Cramerovo pravidlo, dostáváme

$$c_i' = \frac{1}{W} \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_{i-1} & 0 & u_{i+1} & \cdots & u_n \\ u_1' & \cdots & u_{i-1}' & 0 & u_{i+1}' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_{i-1}^{(n-1)} & \frac{f}{a_n} & u_{i+1}^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Ze spojitosti použitých funkcí vidíme, že funkce $x \mapsto c'_i(x)$ jsou spojité a jsou tedy skutečně derivacemi nějakých $C^1((a, b))$ -funkcí c_i splňujících námi požadované podmínky.

Poznámka 8.5.14. (i) Zatímco u lineárních rovnic prvního řádu při variaci konstant dochází k tomu, že se na levé straně rovnice vyruší dva členy ze tří, u rovnic vyššího řádu je do vzájemného vyrušování reprezentovaného formulí (8.5.4) zapojeno často velmi velké množství členů levé strany a je poměrně časově náročné dohledávání vzájemně se vyrušujících skupin. Proto čtenáři silně doporučujeme, aby si buď pamatoval tvar výsledné soustavy nebo princip celého postupu, kdy se ve schématu (8.5.3) (po přenásobení jednotlivých řádků odpovídajícími koeficienty a_i) na pravé straně vyrušily všechny první sumy a druhé sumy zmizely díky námi vytvořeným požadavkům na jejich nulovost. Proto po dosazení do rovnice $Ly = f$ levou stranu zastupuje jen druhá suma z výrazu pro $y^{(n-1)}$ (vynásobená koeficientem a_n).

(ii) Metoda variace konstant bývá časově velmi náročná. Je-li to možné, určitě se vyplatí upřednostnit metodu pro speciální pravou stranu (zatím jsme ji viděli u lineárních rovnic druhého řádu s konstantními koeficienty v kapitole o primitivních funkcích, brzy se ji však naučíme používat i u rovnic vyššího řádu), kde stačí vyřešit jen jedinou soustavu rovnic pro neurčité koeficienty (u variace konstant řešíme různé soustavy rovnic pro každé $x \in (a, b)$ a výsledek navíc musíme integrovat).

(iii) V praxi se při aplikaci metody variace konstant používá Cramerovo pravidlo spíše výjimečně. Většinou se nám podaří vyjádřit derivace funkcí c_i méně pracně (zejména u rovnic s konstantními koeficienty, kde se ve fundamentálním systému vyskytují jen velmi speciální funkce). Kupříkladu u rovnice

$$y'' + y = f(x)$$

je fundamentální systém tvořen funkcemi \cos a \sin . Proto při variaci konstant přicházíme k soustavě

$$\begin{aligned} c'_1(x) \cos x + c'_2(x) \sin x &= 0 \\ -c'_1(x) \sin x + c'_2(x) \cos x &= f(x). \end{aligned}$$

Vynásobíme-li první řádek výrazem $\sin x$, druhý výrazem $\cos x$ a pak řadky sečteme, máme $c'_2(x) = f(x) \cos x$. Podobně se získá $c'_1(x) = -f(x) \sin x$.

8.5.3 Splnění počátečních podmínek

Podle Věty o globální existenci a jednoznačnosti řešení (Věta 8.5.1) pro rovnici $Ly = f$ víme, že při zadaných počátečních podmínkách

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

je řešení jednoznačné. Zde si stručně vysvětlíme, že k jeho určení stačí jen vyřešit soustavu lineárních rovnic s regulární maticí. Skutečně, je-li fundamentální systém

tvořen funkcemi u_1, \dots, u_n a partikulární řešení značíme y_p , pak obecné řešení má tvar

$$y(x) = C_1 u_1(x) + \dots + C_n u_n(x) + y_p(x) \quad \text{na } (a, b).$$

Počáteční podmínky nám pak dávají soustavu pro neznámé konstanty C_1, \dots, C_n

$$\begin{array}{rcccc} C_1 u_1(x_0) & + & \dots & + & C_n u_n(x_0) & = & y_0 - y_p(x_0) \\ C_1 u_1'(x_0) & + & \dots & + & C_n u_n'(x_0) & = & y_1 - y_p'(x_0) \\ \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ C_1 u_1^{(n-1)}(x_0) & + & \dots & + & C_n u_n^{(n-1)}(x_0) & = & y_0 - y_p^{(n-1)}(x_0). \end{array}$$

Levá strana je reprezentována Wronského maticí v bodě x_0 . Tato matice je vždy regulární (odpovídá fundamentálnímu systému).

Příklad 8.5.15. Řešme počáteční úlohu

$$y''' - y'' + y' - y = 1 - x \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad y''(0) = 3.$$

Obecné řešení homogenní rovnice má tvar (srovnejte s Příkladem 8.5.26)

$$y_h = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x \quad \text{na } \mathbb{R},$$

kde $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$. Partikulární řešení v tomto jednoduchém případě není obtížné uhadnout, lze vzít $y_p = x$. Pak máme obecné řešení

$$y = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x + x \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Počáteční podmínky dávají soustavu (partikulární řešení přesouváme na pravou stranu)

$$\begin{array}{rcccc} C_1 e^0 + C_2 \cos 0 + C_3 \sin 0 & = & C_1 + C_2 & = & 1 \\ C_1 e^0 - C_2 \sin 0 + C_3 \cos 0 & = & C_1 + C_3 & = & 1 \\ C_1 e^0 - C_2 \cos 0 - C_3 \sin 0 & = & C_1 - C_2 & = & 3. \end{array}$$

Odtud $C_1 = 2$, $C_2 = C_3 = -1$ a dostáváme řešení počáteční úlohy

$$y = 2e^x - \cos x - \sin x + x \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

8.5.4 Homogenní rovnice s konstantními koeficienty

V případě, že koeficienty a_i , $i = 0, \dots, n$, jsou konstantní funkce, je známa metoda hledání fundamentálního systému rovnice $Ly = 0$. Tuto metodu si zde předvedeme. V dalším budeme symboly a_i používat k označení konstantní hodnoty koeficientů (tedy a_i pro nás budou reálná čísla, nikoliv funkce).

Zkusme hledat řešení úlohy $Ly = 0$ ve tvaru $y = e^{\lambda x}$, kde $\lambda \in \mathbb{C}$. Dostáváme

$$e^{\lambda x} \text{ splňuje } Ly = 0 \quad \iff \quad \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = 0.$$

Výraz $p(\lambda) := \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i$ (přesněji, funkce $\lambda \mapsto \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i$) se nazývá *charakteristický polynom* rovnice $Ly = 0$. V dalším se budeme zabývat otázkou, zda se dá z případné znalosti kořenů charakteristického polynomu vytvořit fundamentální systém řešení. Budeme tedy chtít získat n lineárně nezávislých funkcí splňujících $Ly = 0$.

Poznámka 8.5.16. Naše teorie z předchozích částí kapitoly vychází z Picard–Lindelöfovy existenční věty (Věta 8.3.5), kterou budeme dokazovat pouze v reálném případě. Není tedy jasné, že v komplexním oboru je n správný počet lineárně nezávislých řešení (i když není až tak těžké nahlédnout, že tomu tak je). Nás skutečně budou zajímat jen řešení reálná, ale budeme postupovat tak, že nejprve zkonstruujeme n lineárně nezávislých komplexních řešení a později z nich získáme n lineárně nezávislých reálných řešení.

Poznámka 8.5.17. Nalezneme-li n různých kořenů charakteristického polynomu, není těžké přímo dokázat, že funkce $\{e^{\lambda_i x}\}_{i=1}^n$ tvoří fundamentální systém dané rovnice. Zřejmě totiž

$$\begin{aligned} W_{[e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}]}(x) &= e^{\sum_{i=1}^n \lambda_i x} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= e^{\sum_{i=1}^n \lambda_i x} \prod_{i>j} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0. \end{aligned}$$

Příslušný determinant se nazývá Vandermondův determinant a jeho hodnotu lze nalézt použitím matematické indukce.

Cvičení 8.5.18. Dokažte vztah pro Vandermondův determinant, tedy ukažte, že pro libovolné $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, platí

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{i>j} (\lambda_i - \lambda_j).$$

Pokud ale některé kořeny jsou vícenásobné, musíme postupovat jinak. Využijeme toho, že polynom stupně n má právě n komplexních kořenů, započítáváme-li násobnost. Vícenásobné kořeny přispějí odpovídajícím počtem funkcí díky následujícímu výsledku.

Tvrzení 8.5.19 (O vícenásobných kořenech charakteristického polynomu). *Nechť $\lambda_j \in \mathbb{C}$ je k -násobným kořenem charakteristického polynomu. Pak funkce*

$$e^{\lambda_j x}, \quad x e^{\lambda_j x}, \quad x^2 e^{\lambda_j x}, \quad \dots, \quad x^{k-1} e^{\lambda_j x}$$

řeší $Ly = 0$.

Důkaz. Pokud $\lambda_i = 0$ je k -násobným kořenem polynomu $p(\lambda)$, platí

$$p(\lambda) = \sum_{i=k}^n a_i \lambda^i \quad \text{a odtud} \quad Ly = \sum_{i=k}^n a_i y^{(i)}.$$

Proto funkce $1, x, \dots, x^{k-1}$ řeší $Ly = 0$.

Pro $\lambda_j \neq 0$ pišme $y(x) = z(x)e^{\lambda_j x}$. Po dosazení máme

$$Ly = a_n (ze^{\lambda_j x})^{(n)} + a_{n-1} (ze^{\lambda_j x})^{(n-1)} + \dots + a_1 (z'e^{\lambda_j x} + z\lambda_j e^{\lambda_j x}) + a_0 ze^{\lambda_j x}.$$

Ze všech členů na pravé straně se dá vytknout $e^{\lambda_j x}$, a proto dostáváme, že

$$Ly = e^{\lambda_j x} Mz,$$

kde M je lineární diferenciální operátor s konstantními koeficienty závislými na $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0, n, \lambda_j$. Necht' q je charakteristický polynom operátoru M . Pro libovolné $\mu \in \mathbb{C}$ pak máme

$$q(\mu) = \frac{Me^{\mu x}}{e^{\mu x}} = \frac{L(e^{\mu x} e^{\lambda_j x})}{e^{\mu x} e^{\lambda_j x}} = \frac{Le^{(\mu+\lambda_j)x}}{e^{(\mu+\lambda_j)x}} = p(\mu + \lambda_j).$$

Odtud, protože λ_j je k -násobným kořenem polynomu p , 0 je k -násobným kořenem polynomu q . Podle počátku důkazu tedy funkce $1, x, \dots, x^{k-1}$ řeší $Mz = 0$, což znamená, že funkce $e^{\lambda_j x}, xe^{\lambda_j x}, \dots, x^{k-1}e^{\lambda_j x}$ řeší $Ly = 0$. \square

V dalším nás bude zajímat lineární nezávislost právě získaných funkcí. K tomu využijeme následující obecný výsledek.

Lemma 8.5.20. *Necht' $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ jsou různá komplexní čísla a P_1, \dots, P_m jsou polynomy s komplexními koeficienty. Jestliže platí*

$$\sum_{i=1}^m P_i(x) e^{\lambda_i x} \equiv 0 \quad \text{na } (a, b),$$

pak $P_i \equiv 0$ na (a, b) pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$.

Důkaz. Postupujme indukci přes $m \in \mathbb{N}$. Pro $m = 1$ je výsledek zřejmý. Necht' dokazovaný výrok platí pro $m - 1 \in \mathbb{N}$ a máme

$$\sum_{i=1}^m P_i(x) e^{\lambda_i x} \equiv 0 \quad \text{na } (a, b).$$

Aritmetickou úpravou dostáváme

$$-P_m(x) = \sum_{i=1}^{m-1} P_i(x) e^{(\lambda_i - \lambda_m)x} \quad \text{na } (a, b).$$

Obě strany nyní (st $P_m + 1$)-krát zderivujeme a vychází nám (připomeňme, že $\lambda_i \neq \lambda_m$, $i = 1, 2, \dots, m - 1$)

$$0 \equiv \sum_{i=1}^{m-1} Q_i(x) e^{(\lambda_i - \lambda_m)x} \quad \text{na } (a, b),$$

kde koeficienty polynomu Q_i závisí na koeficientech polynomu P_i , číse $\lambda_i - \lambda_m$ a číse (st $P_m + 1$). Podle indukčního předpokladu proto máme $Q_i \equiv 0$ na (a, b) pro každé $i \in \{1, \dots, m - 1\}$. Zároveň si ale povšimněme, že pro $\lambda \neq 0$ a P polynom platí

$$(P(x)e^{\lambda x})' = (P'(x) + \lambda P(x))e^{\lambda x},$$

neboli při derivování výrazu $P(x)e^{\lambda x}$ neklesá stupeň polynomu doprovázejícího funkci $e^{\lambda x}$ a dokonce u nejvyššího koeficientu je nenulový násobek koeficientu původního. Díky tomuto pozorování a výsledku $Q_i \equiv 0$ na (a, b) dostáváme, že $P_i \equiv 0$ na (a, b) pro každé $i \in \{1, \dots, m - 1\}$. Proto nutně $P_m \equiv 0$ na (a, b) a jsme hotovi. \square

Tvrzení 8.5.21 (O nezávislosti komplexních řešení homogenní rovnice). *Nechť $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ jsou různé kořeny charakteristického polynomu příslušejícího rovnici $Ly = 0$ a k_1, \dots, k_m jsou jejich násobnosti. Pak*

$$\begin{array}{cccc} e^{\lambda_1 x}, & x e^{\lambda_1 x}, & \dots, & x^{k_1-1} e^{\lambda_1 x}, \\ e^{\lambda_2 x}, & x e^{\lambda_2 x}, & \dots, & x^{k_2-1} e^{\lambda_2 x}, \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{\lambda_m x}, & x e^{\lambda_m x}, & \dots, & x^{k_m-1} e^{\lambda_m x} \end{array}$$

jsou nezávislá řešení úlohy $Ly = 0$ (neexistuje netriviální sada komplexních konstant dávající $\sum_{i=1}^n c_i y_i \equiv 0$ na (a, b) , kde y_i jsou výše popsané funkce a $n = k_1 + \dots + k_m$).

Důkaz. Dle Tvrzení o vícenásobných kořenech charakteristického polynomu (Tvrzení 8.3.4) všechny uvedené funkce řeší $Ly = 0$. Pokud pro $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ platí

$$0 \equiv \sum_{i=1}^n c_i y_i =: \sum_{j=1}^m P_j(x) e^{\lambda_j x},$$

aplikací předchozího lemmatu dostáváme $P_1 \equiv \dots \equiv P_m \equiv 0$, tedy $c_1 = \dots = c_n = 0$ a máme dokázanou lineární nezávislost. \square

Zbývá ještě případná komplexní řešení nahradit stejným počtem řešení reálných. Připomeňme, že má-li polynom s reálnými koeficienty nereálný kořen, kořenem je i číslo komplexně sdružené a dokonce má stejnou násobnost (tento výsledek jsme si dokázali v kapitole o primitivních funkcích). Proto kdykoliv jsme v dosa-
vadním postupu získali komplexní řešení ve tvaru

$$y = x^l e^{\lambda x} = x^l e^{\operatorname{Re} \lambda x} (\cos(\operatorname{Im} \lambda x) + i \sin(\operatorname{Im} \lambda x)),$$

máme také řešení

$$\tilde{y} = x^l e^{\bar{\lambda}x} = x^l e^{\operatorname{Re} \lambda x} (\cos(\operatorname{Im} \lambda x) - i \sin(\operatorname{Im} \lambda x)).$$

Navíc díky linearitě operátoru L jsou funkce

$$u := \frac{y + \tilde{y}}{2} = x^l e^{\operatorname{Re} \lambda x} \cos(\operatorname{Im} \lambda x)$$

a

$$v := \frac{y - \tilde{y}}{2i} = x^l e^{\operatorname{Re} \lambda x} \sin(\operatorname{Im} \lambda x)$$

opět řešeními úlohy $Ly = 0$ a už se jedná o reálné funkce. Konečně, touto záměnou jsme si nemohli zkazit lineární nezávislost. Skutečně, pokud by nová sada řešení byla lineárně závislá, z předpisu pro u a v daných výše bychom dokázali spočítat netriviální (komplexní) koeficienty dávající lineární závislost původní sady řešení. Celkově jsme dostali následující výsledek.

Věta 8.5.22 (O fundamentálním systému rovnice s konstantními reálnými koeficienty). *Nechť charakteristický polynom rovnice $Ly = 0$ s konstantními reálnými koeficienty má reálné kořeny $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ a komplexní kořeny $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_l$, $\bar{\lambda}_{m+1}, \dots, \bar{\lambda}_l$ s násobnostmi k_1, \dots, k_l . Pak funkce*

$$\begin{array}{lll} e^{\lambda_1 x}, & \dots, & x^{k_1-1} e^{\lambda_1 x}, \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{\lambda_m x}, & \dots, & x^{k_m-1} e^{\lambda_m x}, \\ e^{\operatorname{Re} \lambda_{m+1} x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_{m+1} x), & \dots, & x^{k_{m+1}-1} e^{\operatorname{Re} \lambda_{m+1} x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_{m+1} x), \\ e^{\operatorname{Re} \lambda_{m+1} x} \sin(\operatorname{Im} \lambda_{m+1} x), & \dots, & x^{k_{m+1}-1} e^{\operatorname{Re} \lambda_{m+1} x} \sin(\operatorname{Im} \lambda_{m+1} x), \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{\operatorname{Re} \lambda_l x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_l x), & \dots, & x^{k_l-1} e^{\operatorname{Re} \lambda_l x} \cos(\operatorname{Im} \lambda_l x), \\ e^{\operatorname{Re} \lambda_l x} \sin(\operatorname{Im} \lambda_l x), & \dots, & x^{k_l-1} e^{\operatorname{Re} \lambda_l x} \sin(\operatorname{Im} \lambda_l x) \end{array}$$

tvoří fundamentální systém rovnice $Ly = 0$.

Příklad 8.5.23. Uvažme rovnici

$$y^{VII} + 2y^V + y^{III} = 0.$$

Charakteristický polynom pak má tvar

$$p(\lambda) = \lambda^7 + 2\lambda^5 + \lambda^3 = (\lambda^2 + 1)^2 \lambda^3.$$

Číslo 0 je jeho trojnásobným kořenem a čísla $\pm i$ jsou shodně dvojnásobné kořeny. Fundamentální systém je proto tvořen funkcemi

$$1, \quad x, \quad x^2, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad x \cos x \quad \text{a} \quad x \sin x \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Obecné řešení na \mathbb{R} je tedy dáno vztahem

$$y(x) = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 \cos x + C_5 \sin x + C_6 x \cos x + C_7 x \sin x,$$

kde C_1, \dots, C_7 jsou reálné konstanty.

8.5.5 Metoda speciální pravé strany pro rovnice s konstantními koeficienty

Partikulární řešení nehomogenní rovnice rovnice $Ly = f$ jsme se při znalosti fundamentálního systému naučili řešit pomocí metody variace konstant. V případě konstantních koeficientů lze pro některé typy funkce f volit podstatně jednodušší postup.

Tvrzení 8.5.24 (O speciální pravé straně). *Nechť*

$$f(x) = e^{\mu x} (P_1(x) \cos(\nu x) + P_2(x) \sin(\nu x)),$$

kde $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ a P_1, P_2 jsou polynomy. Pak existují polynomy Q_1, Q_2 stupně nejvýše $\max\{\text{st } P_1, \text{st } P_2\}$ takové, že funkce

$$y_p = e^{\mu x} x^k (Q_1(x) \cos(\nu x) + Q_2(x) \sin(\nu x)),$$

kde $k \in \mathbb{N}_0$ je násobnost čísla $\mu + \nu i$ jakožto kořene charakteristického polynomu, řeší nehomogenní rovnici $Ly = f$.

Poznámka 8.5.25. (i) Polynomy Q_1, Q_2 se hledají metodou neurčitých koeficientů.

(ii) V tvrzení připouštíme, že $\mu + \nu i$ není kořenem charakteristického polynomu a v tom případě je $k = 0$.

(iii) Pozor, i když je jeden z polynomů P_1, P_2 nulový, nemůžeme obecně předpokládat nulovost kteréhokoliv z polynomů Q_1, Q_2 (uvažte třeba rovnici $y''' - y' = \sin x$, kterou jistě neřeší žádný násobek funkce \sin , naopak ji řeší násobek funkce \cos).

(iv) Tvrzení o speciální pravé straně se na základních kurzech matematické analýzy nedokazuje. Bývá zahrnuto do případu uhodnutí (kdykoliv najdeme koeficienty polynomů Q_1, Q_2 , ukázali jsme, že Tvrzení o speciální pravé straně platí přinejmenším v našem případě).

(v) Metoda speciální pravé strany se u složitějších pravých stran aplikuje jen na některé části (sčítance) funkce f s využitím toho, že operátor L je lineární, a proto

$$Ly_1 = f_1 \quad \wedge \quad Ly_2 = f_2 \quad \implies \quad L(y_1 + y_2) = f_1 + f_2.$$

Tomuto jevu se říká *princip superpozice*.

Příklad 8.5.26. Hledejme obecné řešení úlohy

$$y''' - y'' + y' - y = 1 + \cos x + xe^{-x}.$$

Charakteristický polynom má tvar

$$\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1).$$

Jednonásobné kořeny $1, -i, i$ dávají fundamentální systém

$$\{e^x, \cos x, \sin x\}.$$

Obecné řešení homogenní rovnice má proto tvar

$$y_h = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x \quad \text{na } \mathbb{R},$$

kde $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$. Pravá strana jako celek nemá tvar popsany v Tvzení o speciální pravé straně (Tvzení 8.5.24), ale je součtem tří funkcí, které jednotlivě požadovaný tvar mají. Použijeme tedy princip superpozice a budeme hledat partikulární řešení úloh $Ly_1 = 1$, $Ly_2 = \cos x$, $Ly_3 = xe^{-x}$.

V prvním případě snadno uhadneme $y_1 \equiv -1$. Ve druhém případě hledáme řešení ve tvaru (číslo i je jednonásobný kořen charakteristického polynomu)

$$y_{p_2} = Ax \cos x + Bx \sin x.$$

Tento tvar dosadíme do řešené rovnice, použijeme Leibnizovo pravidlo a upravujeme

$$\begin{aligned} \cos x &= \left(-3A \cos x + Ax \sin x - 3B \sin x - Bx \cos x \right) \\ &\quad - \left(-2A \sin x - Ax \cos x + 2B \cos x - Bx \sin x \right) \\ &\quad + \left(A \cos x - Ax \sin x + B \sin x + Bx \cos x \right) - \left(Ax \cos x + Bx \sin x \right) \\ &= (2A - 2B) \sin x + (-2A - 2B) \cos x. \end{aligned}$$

Dostáváme $A = B = -\frac{1}{4}$ a odtud

$$y_{p_2} = -\frac{1}{4}x \cos x - \frac{1}{4}x \sin x.$$

Třetí partikulární řešení hledáme ve tvaru (číslo -1 není kořenem charakteristického polynomu)

$$y_{p_3} = (Ax + B)e^{-x}.$$

Opět dosadíme

$$\begin{aligned} xe^{-x} &= \left(3Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x} \right) - \left(-2Ae^{-x} + (Ax + B)e^{-x} \right) \\ &\quad + \left(Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x} \right) - (Ax + B)e^{-x} \\ &= (6A - 4(Ax + B))e^{-x}. \end{aligned}$$

Dostáváme $A = -\frac{1}{4}$, $B = -\frac{3}{8}$ a odtud

$$y_{p_3} = \left(-\frac{1}{4}x - \frac{3}{8} \right) e^{-x}.$$

Obecné řešení úlohy na \mathbb{R} má proto tvar

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3} \\ &= C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x - 1 - \frac{1}{4}x \cos x - \frac{1}{4}x \sin x - \left(\frac{1}{4}x + \frac{3}{8} \right) e^{-x}. \end{aligned}$$

8.5.6 Eulerova rovnice

Jednou z úloh s nekonstantními koeficienty, kde je znám postup řešení, je *Eulerova rovnice*

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i y^{(i)}(x) = f(x),$$

kde a_0, \dots, a_n jsou reálné konstanty a $f \in C((a, b))$. U této úlohy máme k dispozici metodu variace konstant. Naším dalším úkolem je nalezení fundamentálního systému. Budeme pracovat zvláště pro $x > 0$ a $x < 0$. Pro $x > 0$ zavádíme novou proměnnou předpisem $\xi = \log x$ (tedy $x = e^\xi$) a pomocnou funkci $z(\xi) := y(x(\xi))$. Pak máme

$$\begin{aligned} z'(\xi) &= y'(x(\xi))e^\xi & &= xy' \\ z''(\xi) &= y''(x(\xi))e^{2\xi} + y'(x(\xi))e^\xi & &= x^2y'' + xy' \end{aligned}$$

a tak dále. Je vidět, že po dosazení získaných vztahů do rovnice $Ly = 0$ dostaneme pro funkci $\xi \mapsto z(\xi)$ rovnici n -tého řádu s konstantními koeficienty, která závisí na číslech a_0, \dots, a_n .

Pro $x < 0$ zavádíme $\xi = \log |x|$ (tedy $x = -e^\xi$) a opět $z(\xi) = y(x(\xi))$. Pak máme

$$\begin{aligned} z'(\xi) &= y'(x(\xi))(-e^\xi) & &= xy' \\ z''(\xi) &= y''(x(\xi))(-e^\xi)^2 + y'(x(\xi))(-e^\xi) & &= x^2y'' + xy' \end{aligned}$$

a tak dále. Vyjde nám pomocná diferenciální rovnice se stejnými koeficienty jako v předchozím případě. Po vyřešení pomocné diferenciální rovnice se vrátíme k proměnné x a funkci y . Nakonec se ještě pokusíme řešení slepit v počátku.

Příklad 8.5.27. Hledejme obecné řešení rovnice

$$x^2y'' + y = x^3.$$

Nejprve řešme homogenní úlohu. Pro $x > 0$ (totéž vyjde i pro $x < 0$) máme podle vzorců odvozených výše

$$0 = x^2y'' + y = x^2y'' + xy' - xy' + y = z'' - z' + z.$$

Charakteristický polynom nové rovnice má tvar $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1$ a kořeny $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Odtud dostáváme

$$z(\xi) = C_1 e^{\frac{1}{2}\xi} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\xi\right) + C_2 e^{\frac{1}{2}\xi} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\xi\right) \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Proto máme pro $x > 0$ a $x < 0$ řešení (píšeme $\xi = \log |x|$ a lehce upravujeme)

$$y(x) = C_1 \sqrt{|x|} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log |x|\right) + C_2 \sqrt{|x|} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log |x|\right).$$

Partikulární řešení zkusíme uhodnout ve tvaru $y_p = Ax^3$, což okamžitě dává $A = \frac{1}{7}$. Dostali jsme obecné řešení

$$y(x) = C_1 \sqrt{|x|} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log |x|\right) + C_2 \sqrt{|x|} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log |x|\right) + \frac{1}{7}x^3.$$

Slepení řešení v počátku je možné v případě $C_1 = C_2 = 0$ (v počátku spojitě dodefinujeme nulou), v ostatních případech se dá nahlédnout, že po spojitě dodefinování v počátku nemá získaná funkce derivaci v počátku.

Poznámka 8.5.28. (i) Na Eulerovu rovnici se dají aplikovat všechny naše obecné výsledky (kromě výsledků pro rovnice s konstantními koeficienty). Připomeňme však, že pro tyto výsledky potřebujeme, aby byl činitel u nejvyšší derivace nenulový, což Eulerova rovnice nesplňuje v počátku. Není tedy žádným překvapením, že jsme předchozí příklad vyřešili právě na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$, zatímco jsme měli potíže se slepením v počátku.

(ii) Funkce $u_1(x) = \sqrt{|x|} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2} \log |x|)$ a $u_2(x) = \sqrt{|x|} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2} \log |x|)$ z minulého příkladu tvoří fundamentální systém. Skutečně, výpočtem jsme ověřili, že se jedná o řešení. Dále, pokud by existovala netriviální dvojice konstant C_1, C_2 tak, že

$$C_1 u_1 + C_2 u_2 \equiv 0,$$

tatáž dvojice konstant by u funkcí $e^{\frac{1}{2}\xi} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}\xi)$ a $e^{\frac{1}{2}\xi} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}\xi)$ vyvracela lineární nezávislost, kterou jsme dokázali v předchozí kapitole.

(iii) Díky předchozí části poznámky máme k dispozici variaci konstant, kdykoliv se nám podaří vyřešit homogenní rovnici.

(iv) Řešení homogenní Eulerovy rovnice se dá někdy uhodnout tak, že položíme $y = |x|^\lambda$ a funkci zkusíme dosadit do rovnice. Tento přístup vede na jakousi charakteristickou rovnici. Zatím však nevíme, že získaná řešení jsou lineárně nezávislá a neumíme ani zajistit jejich dostatečný počet (problémy dělají komplexní a vícenásobné kořeny). Můžeme si ale povšimnout (podrobně si rozmyslete sami), že zmíněná charakteristická rovnice je totožná s charakteristickou rovnicí pro úlohu s funkcí z . Díky tomu víme, že u vícenásobných kořenů máme do fundamentálního systému brát funkce typu

$$|x|^\lambda, \quad \log |x| |x|^\lambda, \quad \log^2 |x| |x|^\lambda, \quad \dots$$

a v případě komplexního kořene λ do fundamentálního systému přijdou funkce

$$|x|^{\operatorname{Re} \lambda} \cos(\operatorname{Im} \lambda \log |x|), \quad |x|^{\operatorname{Re} \lambda} \sin(\operatorname{Im} \lambda \log |x|), \quad \log |x| |x|^{\operatorname{Re} \lambda} \cos(\operatorname{Im} \lambda \log |x|)$$

a tak dále. Tato úvaha nám dokonce umožňuje používat Tvzení o speciální pravé straně (Tvzení 8.5.24), pokud ve všech jeho formulích nahradíme proměnnou x výrazem $\log |x|$.

Příklad 8.5.29. Řešme rovnici

$$x^3 y''' + 4x^2 y'' + 2xy' = x + \frac{1}{x} + x \log x.$$

Do homogenní rovnice dosadíme $y = x^\lambda$ pro $x > 0$ (pro záporná x pravá strana rovnice nemá smysl, jinak bychom pracovali s $|x|^\lambda$ a vyšla by tatáž charakteristická rovnice, neboť při každém derivování získáme činitel $\operatorname{sign} x$, který pak spolu s x dá $|x|$) a máme

$$0 = x^3 \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)x^{\lambda-3} + 4x^2 \lambda(\lambda - 1)x^{\lambda-2} + 2x \lambda x^{\lambda-1} = x^\lambda \lambda^2(\lambda + 1).$$

Dostáváme fundamentální systém

$$\left\{ 1, \log x, \frac{1}{x} \right\}.$$

Modifikované Tvrzení o speciální pravé straně (Tvrzení 8.5.24) (pro $x > 0$ nemusíme psát absolutní hodnoty) požaduje pravou stranu ve tvaru

$$f(x) = x^\mu \left(P_1(\log x) \cos(\nu \log x) + P_2(\log x) \sin(\nu \log x) \right)$$

a nabízí partikulární řešení ve tvaru

$$y_p(x) = x^\mu \log^k x \left(Q_1(\log x) \cos(\nu \log x) + Q_2(\log x) \sin(\nu \log x) \right),$$

kde k je násobnost čísla $\mu + i\nu$ jako kořene charakteristického polynomu. Využijme principu superpozice a řešme napřed úlohu $Ly_{p_1} = x$. Řešení hledáme ve tvaru

$$y_{p_1} = Ax.$$

Vychází nám $y_{p_1} = \frac{1}{2}x$. Dále řešme $Ly_{p_2} = \frac{1}{x}$. Protože číslo -1 je jednonásobným kořenem charakteristického polynomu, hledáme řešení ve tvaru

$$y_{p_2} = A \frac{\log x}{x}.$$

Dostáváme

$$\frac{1}{x} = Ax^3 \left(\frac{11}{x^4} - \frac{6 \log x}{x^4} \right) + 4Ax^2 \left(-\frac{3}{x^3} + \frac{2 \log x}{x^3} \right) + 2Ax \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\log x}{x^2} \right) = \frac{A}{x}.$$

Proto $y_{p_2} = \frac{\log x}{x}$. Konečně, řešme $Ly_{p_3} = x \log x$. Řešení hledáme ve tvaru

$$y_{p_3} = Ax \log x + Bx.$$

Dostáváme

$$\begin{aligned} x \log x &= x^3 \left(-\frac{A}{x^2} \right) + 4x^2 \left(\frac{A}{x} \right) + 2x \left(A \log x + A + B \right) \\ &= (5A + 2B)x + 2Ax \log x. \end{aligned}$$

Odtud $A = \frac{1}{2}$, $B = -\frac{5}{4}$ a $y_{p_3} = \frac{1}{2}x \log x - \frac{5}{4}x$. Obecným řešením naší úlohy tedy je

$$y = C_1 + C_2 \log x + C_3 \frac{1}{x} + \frac{1}{2}x + \frac{\log x}{x} + \frac{1}{2}x \log x - \frac{5}{4}x \quad \text{na } (0, \infty).$$

8.6 Další typy rovnic vyšších řádů

Nyní si představíme další typy rovnic, které umíme přímo vyřešit nebo alespoň převést na rovnice prvního řádu.

8.6.1 Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(x)$

Úlohu

$$y^{(n)} = f(x) \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

kde $f \in C((a, b))$, už umíme řešit, neboť je případem lineární diferenciální rovnice n -tého řádu s konstantními koeficienty (dokonce s velmi jednoduchým fundamentálním systémem $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$). Existuje však rychlejší postup, který zde umí zastoupit variaci konstant. Je založen na postupném integrování, které je zároveň možné přepsat do vzorce obsahujícího jediný integrál.

Tvrzení 8.6.1. *Je-li f spojitá na (a, b) , pak řešení počáteční úlohy splňuje*

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_{x_0}^x \int_{x_0}^{\tau_1} \dots \int_{x_0}^{\tau_{n-1}} f(\tau_n) d\tau_n \dots d\tau_2 d\tau_1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{y_k}{k!} (x - x_0)^k \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x - \tau)^{n-1} f(\tau) d\tau + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{y_k}{k!} (x - x_0)^k. \end{aligned}$$

Důkaz. První rovnost snadno ověříme postupným derivováním (indukcí přes $n \in \mathbb{N}$). I druhou rovnost ověříme indukcí. Pro $n = 1$ rovnost zřejmě platí. Pro $n > 1$ stačí ukázat klíčovou identitu

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x (x - t)^{n-1} f(t) dt = (n-1) \int_{x_0}^x (x - t)^{n-2} f(t) dt.$$

Zafixujme $x \in (x_0, b)$. Budeme postupovat podobně jako v důkazu takzvané hlavní věty diferenciálního a integrálního počtu (Věta 7.5.12). Označme

$$\Phi(x) := \int_{x_0}^x (x - t)^{n-1} f(t) dt \quad \text{a} \quad \varphi(x) := (n-1) \int_{x_0}^x (x - t)^{n-2} f(t) dt.$$

Zafixujme ještě $y \in (x, b)$. Pak díky spojitosti f na $[x_0, y] \subset (a, b)$ máme $K > 0$ takové, že

$$t \in [x_0, y] \quad \implies \quad |f(t)| \leq K.$$

Dále máme pro $h \in (0, y - x)$

$$\begin{aligned} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} (x+h-t)^{n-1} f(t) dt - \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_{x_0}^x ((x+h-t)^{n-1} - (x-t)^{n-1}) f(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (x+h-t)^{n-1} f(t) dt =: I_1 + I_2. \end{aligned}$$

Odtud

$$|I_2| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} h^{n-1} K dt = h^{n-1} K \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0.$$

Dále máme díky předchozím vzorcům a binomické větě

$$\begin{aligned} |I_1 - \varphi(x)| &= \left| \int_{x_0}^x \left(\frac{(x-t+h)^{n-1} - (x-t)^{n-1}}{h} - (n-1)(x-t)^{n-2} \right) f(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{x_0}^x \frac{1}{h} \sum_{j=2}^{n-1} \binom{n-1}{j} h^j (x-t)^{n-1-j} f(t) dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^x \sum_{j=2}^{n-1} \binom{n-1}{j} h^{j-1} (x-x_0)^{n-1-j} K dt \leq \sum_{j=2}^{n-1} C h^{j-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0. \end{aligned}$$

Celkově máme $\Phi'_+(x) = \varphi(x)$. Podobně se získá $\Phi'_-(x) = \varphi(x)$. Případy $x \in (a, x_0)$ a $x = x_0$ jsou analogické. Tím je dokázána klíčová identita pro (teď už snadnou) matematickou indukci. \square

8.6.2 Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(x, y^{(n-1)})$

U tohoto typu zavedeme pomocnou funkci $z(x) = y^{(n-1)}(x)$. Pro ni potom máme pomocnou úlohu

$$z' = f(x, z),$$

což je typ úlohy, pro který jsme si již představili několik metod (v závislosti na tvaru funkce f). Po nalezení funkce z ještě potřebujeme vyřešit úlohu

$$y^{(n-1)} = z,$$

kterou jsme řešili před chvílí. Poznamenejme, že řešení úlohy pomocné a úlohy původní si vzájemně odpovídají (přechodem k pomocné úloze žádná řešení nezískáme ani neztratíme). Skutečně, pokud nějaká funkce řeší úlohu původní, její derivace řádu $(n-1)$ zřejmě řeší úlohu pomocnou. Naopak, pokud nějaká funkce řeší úlohu pomocnou, je nutně spojitá, můžeme ji proto $(n-1)$ -krát integrovat a dostaneme řešení úlohy původní.

Příklad 8.6.2. Řešme úlohu

$$y^V = \frac{2y^{IV}}{x} \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 0, \quad y''(1) = 1, \quad y'''(1) = 0, \quad y^{IV}(1) = 1.$$

Položme $z := y^{IV}$. Tím jsme přešli k úloze

$$z' = \frac{2z}{x} \quad z(1) = 1$$

(díky včasné aplikaci počátečních podmínek se nebudeme muset zabývat všemi případy). Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými a máme pro ni

$$\log |z| = \int \frac{dz}{z} = \int \frac{2dx}{x} = 2 \log |x| + C,$$

odkud s využitím počáteční podmínky dostáváme řešení

$$z = x^2 \quad \text{na } (0, \infty).$$

Toto řešení je jednoznačné na $(0, \infty) \times (0, \infty)$, slepení (v počátku) zadání nepřípouští. Celkově pak na $(0, \infty)$ máme řešení

$$y(x) = \Phi(x) + 1 + \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^4}{24},$$

kde funkci Φ můžeme určit pomocí předchozího tvrzení. První možností jsou čtyři postupné integrace, které vzhledem k dolní mezi $x_0 = 1$ nejsou příliš příjemné. Druhou možností je použít jedinou integraci se vzorcem

$$\Phi(x) = \frac{1}{6} \int_1^x (x-t)^3 t^2 dt.$$

Cvičení 8.6.3. Řešte úlohu $y^{IV} = x^2$ pomocí Tvrzení o speciální pravé straně (Tvrzení 8.5.24) a pomocí variace konstant kombinované s Cramerovým pravidlem.

8.6.3 Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(y^{(n-2)})$

Zde pokládáme $z(x) = y^{(n-2)}(x)$ a tím dostáváme

$$z'' = f(z).$$

Nyní je výhodné obě strany vynásobit činitelem $2z'$ (nejedná se o ekvivalentní úpravu, novou rovnici řeší širší třída funkcí než rovnici původní), čímž obdržíme

$$(z'^2)' = 2z'z'' = 2z'f(z).$$

Má-li funkce f primitivní funkci F , potom máme

$$z'^2 = 2F(z) + C.$$

Uvážíme oba případy $z' = \pm\sqrt{2F(z) + C}$, nalezneme z a pak y (žádný z těchto kroků neprojde zcela obecně, nicméně třeba případná spojitost f zaručuje existenci všech zúčastněných primitivních funkcí).

Poznámka 8.6.4. Podobně by se postupovalo v případě rovnice

$$y^{(n)}(x) = f(x, y^{(n-2)}(x)).$$

Jako výše bychom přešli k rovnici

$$z''(x) = f(x, z(x)),$$

po vynásobení $2z'(x)$ potom

$$(z'^2)'(x) = 2z'(x)f(x, z(x)).$$

Označíme-li $F(x, z) = \int f(x, z) dz$, dostáváme podobně jako výše rovnici

$$z'(x) = \pm\sqrt{2F(x, z) + C},$$

kterou v některých případech můžeme být schopni řešit. Poslední krok je potom stejný jako výše.

Příklad 8.6.5. Řešme úlohu

$$y''' = \frac{1}{4\sqrt{y}} \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 1.$$

Položme $z = y'$. Pak máme

$$z'' = \frac{1}{4\sqrt{z}} \quad z(0) = 1, \quad z'(0) = 1$$

(díky včasné aplikaci počátečních podmínek se nebudeme muset zabývat všemi případy). Pak po přenásobení $2z'$ dostáváme

$$(z'^2)' = 2z' \frac{1}{4\sqrt{z}} \quad \implies \quad z'^2 = \sqrt{z} + C.$$

Z počátečních podmínek dále plyne

$$z' = \sqrt[4]{z}.$$

Tuto úlohu řešíme separací proměnných a získáváme

$$\frac{4}{3} z^{\frac{3}{4}} = \int \frac{dz}{\sqrt[4]{z}} = \int dx = x + C.$$

Odtud díky počáteční podmínce $z(0) = 1$ dostáváme

$$z = \left(\frac{3}{4}x + 1\right)^{\frac{4}{3}}.$$

Všimněme si, že tato funkce není v bodě $x = -\frac{4}{3}$ dvakrát spojitě diferencovatelná, což souvisí s tím, že $z'(-\frac{4}{3}) = 0$. V takovém případě nebyla výše provedená úprava ekvivalentní. Musíme se tedy omezit na interval $(-\frac{4}{3}, \infty)$.

Podle teorie rovnic se separovanými proměnnými je výše uvedené řešení jednoznačné na $\mathbb{R} \times (0, \infty)$. Slepování s triviálním řešením $z \equiv 0$ či řešeními na $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ nepřipadá v úvahu díky původní formulaci $z'' = \frac{1}{4\sqrt{z}}$. Nyní

$$y = \int \left(\frac{3}{4}x + 1\right)^{\frac{4}{3}} dx = \frac{4}{7} \left(\frac{3}{4}x + 1\right)^{\frac{7}{3}} + C \stackrel{y(0)=0}{=} \frac{4}{7} \left(\frac{3}{4}x + 1\right)^{\frac{7}{3}} - \frac{4}{7}$$

pro $x \in (-\frac{4}{3}, \infty)$.

8.6.4 Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n-1)})$

Definujeme-li pomocnou funkci $z := y^{(k)}$, dostáváme pro ni

$$z^{(n-k)} = f(x, z, z', \dots, z^{(n-k-1)}),$$

což je rovnice nižšího řádu.

Příklad 8.6.6. Úlohu

$$y^{XXII} - 2y^{XXI} + y^{XX} = e^{2x} \quad y(0) = y'(0) = \dots = y^{XX}(0) = 0, \quad y^{XXI}(0) = 1$$

můžeme řešit standardním způsobem. Jde také zavést pomocnou funkci $z = y^{XX}$ a řešit

$$z'' - 2z' + z = e^{2x} \quad z(0) = 0, \quad z'(0) = 1.$$

Obecné řešení má tvar

$$z = C_1 e^x + C_2 x e^x + e^{2x} \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Po aplikaci počátečních podmínek pro z dostáváme $z = e^{2x} - e^x$. Zbývá dořešit úlohu

$$y^{XX} = e^{2x} - e^x \quad y(0) = y'(0) = \dots = y^{XI}(0) = 0,$$

což je typ, kterým jsme se již podrobně zabývali (v tomto případě se dá poměrně rychle provést dvacet integrací za sebou) a dostaneme součet polynomu a funkce $2^{-20}e^{2x} - e^x$.

8.6.5 Rovnice tvaru $y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{n-1})$

V tomto případě se používá následující postup ke snížení řádu o jedna. Pokud má rovnice řešení, které splňuje

$$y'(x) = p(y(x))$$

pro nějakou $(n-1)$ -krát diferencovatelnou funkci p , pak pro ni máme

$$\begin{aligned} y'(x) &= p(y(x)) \\ y''(x) &= p'(y(x))y'(x) = p'(y(x))p(y(x)) \\ y'''(x) &= p''(y(x))y'(x)p(y(x)) + p'(y(x))p'(y(x))y'(x) \\ &= p''(y(x))p^2(y(x)) + (p'(y(x)))^2p(y(x)) \quad \text{atd.} \end{aligned}$$

Po dosazení do původní rovnice a zjednodušení zápisu položením $z := y(x)$ dostáváme pro hledanou funkci z diferenciální rovnici $(n-1)$ -tého řádu.

Zamysleme se ještě nad tím, jakým způsobem si odpovídají řešení původní a pomocné úlohy. Jak jsme již odvodili výše, pokud nějaké řešení původní úlohy má výše uvedenou speciální vlastnost, funkce p řeší pomocnou rovnici. Naopak, pokud funkce p řeší pomocnou rovnici a funkce y řeší $y'(x) = p(y(x))$, pak z výpočtu výše plyne (máme k dispozici hladkost potřebnou pro všechna složená derivování), že y řeší rovnici původní. Musíme být ale opatrní s definičními obory funkcí p a y .

Příklad 8.6.7. Uvažme úlohu

$$y'' = 2y'y \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

a pokusme se nalézt alespoň jedno její řešení. Popsaný postup nám dává rovnici

$$p'(z)p(z) = 2zp(z).$$

Tuto rovnici splňuje jednak $p \equiv 0$ (tedy $y' \equiv 0$, což nevyhovuje počáteční podmínce $y'(0) = 1$). Druhou možností je řešení rovnice

$$p'(z) = 2z,$$

tedy $p(z) = z^2 + C$, neboli $y' = y^2 + C$. Počáteční podmínka pak vyžaduje $C = 0$. Určením p jsme tedy získali diferenciální rovnici

$$y' = y^2.$$

Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými, proto pokračujeme

$$-\frac{1}{y} = \int \frac{dy}{y^2} = \int dx = x + C.$$

Odtud

$$y = \frac{-1}{x + C}$$

a počáteční podmínky dávají

$$y = \frac{1}{1 - x} \quad \text{na } (-\infty, 1).$$

Příklad 8.6.8. Zkusme naši novou metodu aplikovat na několik lineárních rovnic druhého řádu, kde jsme fundamentální systém získali pomocí uhodnutého řešení ve tvaru $e^{\lambda x}$.

(i) Uvažme rovnici

$$y'' = 0.$$

Naše metoda dává, že pokud existuje řešení splňující $y' = p(y)$, pak (připomeňme $y = z$, $y' = p(z)$, $y'' = p'(z)p(z)$)

$$p'p = 0.$$

Tuto rovnici zřejmě řeší $p \equiv C$. Odtud $y' \equiv C$, a proto $y = Cx + D$ je řešením původní úlohy.

(ii) Uvažme rovnici

$$y'' + y = 0.$$

Tentokrát dostáváme

$$p'p = -z.$$

Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými, ale rychlejší je přepis

$$\frac{1}{2}(p^2)' = -z.$$

Odtud

$$p(z) = \pm\sqrt{-z^2 + C} \quad \text{tedy} \quad y' = \pm\sqrt{-y^2 + C}.$$

Smysl má jen případ $C > 0$ a odpovídající rovnici se separovanými proměnnými řešíme postupem

$$\arcsin \frac{y}{\sqrt{C}} = \int \frac{dy}{\sqrt{-y^2 + C}} = \pm \int dx = \pm x + D.$$

Odtud (pro $\pm x + D \in (-1, 1)$)

$$y = \sqrt{C} \sin(\pm x + D).$$

Vhodnou volbou konstant a slepováním dostaneme sinus i kosinus (připomeňme, že $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$).

(iii) Pro rovnici

$$y'' - y = 0$$

dostáváme

$$p'p = z.$$

Přepis $\frac{1}{2}(p^2)' = z$ vede na

$$p(z) = \pm \sqrt{z^2 + C} \quad \text{tedy} \quad y' = \pm \sqrt{y^2 + C}.$$

Pro $C = 0$ máme $y' = \pm y$ a nám známá řešení e^x, e^{-x} . Ani případ $C > 0$ nedává nepoužitelný výsledek, neboť máme

$$\operatorname{argsinh} \frac{x}{\sqrt{C}} = \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + C}} = \pm \int dx = \pm x + D$$

a odtud

$$y = \sqrt{C} \sinh(\pm x + D).$$

Naopak pro $C < 0$ máme

$$\operatorname{argcosh} \frac{x}{\sqrt{|C|}} = \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 - |C|}} = \pm \int dx = \pm x + D$$

a odtud

$$y = \sqrt{|C|} \cosh(\pm x + D).$$

Poslední dva výsledky dávají opět řešení a dají se z nich získat funkce e^x, e^{-x} .

(iv) V případě rovnice

$$y'' - 2y' + y = 0$$

(charakteristická rovnice má tvar $(\lambda - 1)^2 = 0$ a fundamentální systém je $\{e^x, xe^x\}$) dostáváme

$$p'p - 2p + z = 0 \quad \text{tedy} \quad p' = \frac{2p - z}{p}.$$

Jedná se o homogenní rovnici, kterou umíme řešit. Jen poznamenejme, že jedním z řešení je zřejmě $p(z) = z$, což vede na rovnici $y' = y$ a řeší ji například e^x . Díky této znalosti a metodě doplňování fundamentálního systému pomocí vlastností wronskiánu se pak získá i xe^x .

Kapitola 9

Číselné řady

V dalším se budeme zabývat otázkou konvergence číselných řad. Podobně jako u konvergence Newtonova integrálu je konvergence řad jen mezivýsledek, který nám později umožní určovat součty řad za pomoci metod, které konvergenci vyžadují. Na druhou stranu, někdy nám výsledek, zda řada konverguje či ne, dává přesně tu informaci, kterou potřebujeme, a přesná hodnota součtu řady není až tak důležitá. Někdy zase vystačíme s více či méně přesným odhadem součtu řady.

9.1 Základní pojmy

Definice 9.1.1 (Řada). Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ je posloupnost. Symbol $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ budeme nazývat (číselnou) řadou. Pro $k \in \mathbb{N}$ se číslo a_k nazývá k -tý člen, číslo $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ se nazývá n -tý částečný součet a $\{s_n\}$ nazveme posloupností částečných součtů řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Existuje-li vlastní $s := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, říkáme, že řada *konverguje*. Pokud je uvedená limita nevlastní, řada *diverguje* a pokud limita částečných součtů neexistuje, řada *osciluje*.

V prvních dvou případech číslo s nazýváme *součtem řady*. Píšeme $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$.

Poznámka 9.1.2. V případě, kdy s existuje, má symbol $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ vlastně dva významy. Jednak zastupuje posloupnost, kterou se snažíme sečíst, jednak její součet (tedy číslo). Bývá zvykem v takovéto situaci přednostně chápat $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ jako číslo s .

Poznámka 9.1.3. V některých situacích bude přirozené pracovat s $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Nazýváme posloupností rovněž zobrazení z \mathbb{N}_0 do \mathbb{R} (opět budeme psát $\{a_k\}_{k=0}^{\infty}$ či jen $\{a_k\}$).

Poznámka 9.1.4. Řady komplexních čísel se definují analogicky. Nebude-li řečeno jinak, v dalším se budeme zabývat řadami reálných čísel. Odvození podobných výsledků pro komplexní řady přenecháváme čtenáři jako cvičení, popřípadě budou okomentovány zvlášť.

Příklad 9.1.5. (i) Necht $q \in \mathbb{C}$ a $a_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Pro každé $k \in \mathbb{N}_0$ definujme $a_k = a_0 q^k$. Vzniklá řada se nazývá *geometrická řada* a díky identitě

$$(1 + q + \dots + q^n)(1 - q) = 1 - q^{n+1} \quad \text{platné pro každé } n \in \mathbb{N}$$

její částečné součty splňují pro $q \neq 1$

$$s_n = a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Platí-li $|q| < 1$, řada konverguje a dostáváme $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 q^k = \frac{a_0}{1-q}$. Pokud $q = 1$, pracujeme s řadou $\sum_{k=0}^{\infty} a_0$ a dostáváme $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 = \infty \in \mathbb{C}^*$. Pokud $|q| = 1$ a $q \neq 1$, řada osciluje. Konečně, pro $|q| > 1$ dostáváme $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 q^k = \infty \in \mathbb{C}^*$ (reálný případ vyžaduje ohlédání jak sign a_0 tak sign q , pro $q < -1$ řada osciluje).

(ii) Uvažme *harmonickou řadu* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Její částečné součty tvoří monotonní posloupnost, mají tedy limitu v \mathbb{R}^* . Platí pro ně

$$\begin{aligned} s_1 &= 1 & s_2 &= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} & s_4 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{2} \\ s_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

a indukcí lze získat $s_{2^n} > \frac{n+2}{2}$. Odtud $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$. Připomeňme ještě, že v kapitole o určitém integrálu jsme divergenci této řady už ukázali takto

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > (\mathcal{R}) \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = (\mathcal{N}) \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\log]_1^{n+1} = \log(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

(iii) Dalším typem řad, které umíme sečíst, jsou *teleskopické řady*. Příkladem je řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, pro kterou máme

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1. \end{aligned}$$

Obecně pro teleskopickou řadu typu

$$a_k = b_k - b_{k+m} \quad \text{kde } m \in \mathbb{N} \text{ a } \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0,$$

máme

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+m}) = b_1 + \dots + b_n - (b_{m+1} + \dots + b_{m+n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b_1 + \dots + b_m.$$

(iv) Uvažme řadu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$. Opět se jedná o řadu s nezápornými členy, proto jsou částečné součty monotonní a existuje jejich limita. Navíc máme

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n},$$

odkud dostáváme konvergenci. Dalo by se také postupovat přes $(\mathcal{N}) \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$.

(v) Uvažme řadu $\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^k}{k}$. Částečné součty si přepíšme do tvaru

$$s_{2n} = \left(-1 + \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(-\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right)$$

a

$$s_{2n+1} = -1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right).$$

Odtud vidíme, že $\{s_{2n}\}$ a $\{s_{2n+1}\}$ jsou monotonní posloupnosti s členy v intervalu $[-1, 0]$ (neboť vždy $-1 < s_{2n+1} < s_{2n} < 0$). Obě tedy musí být konvergentní. Navíc

$$s_{2n+1} - s_{2n} = -\frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

a proto mají obě limity stejnou hodnotu. Zkoumaná řada tedy konverguje. Rozmyslete si, že v této situaci není možné použít přístup přes určitý integrál.

Poznámka 9.1.6. Konvergence řady byla definována jako konvergence jejích částečných součtů. Nabízí se tedy myšlenka, že budeme-li studovat limitní chování posloupnosti s_k , získáme tím nejen informaci o konvergenci studované řady, ale i její součet. Žádnou teorii pro řady by pak nebylo nutné budovat, neboť vystačíme s teorií pro limity posloupností. Velice často však bývá obtížné či nemožné z předpisu pro k -tý člen a_k získat vzorec pro s_k (ve vzácných případech se podle chování prvních několika členů posloupnosti $\{s_k\}$ dá odhadnout správný vzorec, ten se pak dokáže indukci). V dalším se nebudeme snažit vzorce pro s_k hledat a budeme budovat teorii pracující jen s předpisem pro člen a_k .

Poznámka 9.1.7. Povšimněte si, že na konvergenci řady nemá vliv přidání, vynechání či změna hodnoty u konečného počtu členů.

Nejprve si uvedeme kritérium, pomocí něhož konvergenci vylučujeme.

Věta 9.1.8 (Nutná podmínka konvergence řady). *Nechť řada $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konverguje. Pak $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.*

Důkaz. Označme $L := \sum_{k=1}^\infty a_k$. Pro částečné součty pak platí $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = L$, a proto

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_k - s_{k-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k - \lim_{k \rightarrow \infty} s_{k-1} = L - L = 0.$$

□

Silnějším nástrojem je B-C podmínka (jedná se jen o přepis B-C podmínky pro posloupnosti), která dává ekvivalentní charakterizaci konvergence číselných řad.

Věta 9.1.9 (B-C podmínka pro řady). *Číselná řada $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konverguje právě tehdy, když splňuje B-C podmínku*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \cap [n_0, \infty) \forall p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Cvičení 9.1.10. Dokažte tuto větu přepisem na standardní Bolzano–Cauchyovu podmínku pro konvergenci číselných posloupností.

Příklad 9.1.11. (i) Necht $a_1, d \in \mathbb{R}$. Definujme *aritmetickou posloupnost* předpisem $a_k = a_1 + (k-1)d$. S výjimkou případu $a_1 = d = 0$ odpovídající řada nemůže konvergovat kvůli nutné podmínce konvergence.

(ii) Harmonická řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ nesplňuje B-C podmínku díky vlastnosti

$$\frac{1}{2^n + 1} + \frac{1}{2^n + 2} + \cdots + \frac{1}{2^n + 2^n} > \frac{1}{2}.$$

Poznámka 9.1.12. (i) Později si představíme ještě několik dalších kritérií pro vyloučení konvergence řady. Tato kritéria budou však pracovat jen s řadami, jejichž členy nemění znaménko (myslíme nekonečněkrát, nezapomínejme na poznámku o konečném počtu změn).

(ii) Nutná podmínka je jen speciálním případem B-C podmínky, v němž vlastně uvažujeme $p = 1$, tedy zkoumáme $\sum_{k=n+1}^{n+1} a_k = a_{n+1}$.

(iii) Ve světle předchozích dvou částí této poznámky bude B-C podmínka jediným naším kritériem pro vyloučení konvergence řady u řad s takzvanými obecnými členy (kde nekontrolujeme znaménkové změny).

Z aritmetiky (nevlastních) limit aplikované na částečné součty dostáváme okamžitě následující výsledek.

Věta 9.1.13 (Aritmetika řad). *Necht $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A \in \mathbb{R}^*$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = B \in \mathbb{R}^*$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Pak*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha A + \beta B,$$

kdykoliv má pravá strana smysl.

Příklad 9.1.14. (i) Řada $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k^2}\right)$ diverguje, neboť její členy jsou součty členů divergentní a konvergentní řady.

(ii) Řada $\sum_{k=1}^{\infty} \left((-1)^k + \frac{1}{k^2}\right)$ osciluje. Skutečně, pokud by konvergovala, musela by konvergovat i

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \left((-1)^k + \frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^2}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \left((-1)^k + \frac{1}{k^2}\right) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Divergenci vyvrátíme podobně.

Při našem budoucím studiu nás bude jen zřídka zajímat konvergence řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Podstatně důležitější pro nás bude konvergence $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. Proto zavádíme následující pojmy.

Definice 9.1.15 (Absolutní a neabsolutní konvergence). Říkáme, že číselná řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *konverguje absolutně*, jestliže konverguje $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. Říkáme, že řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *konverguje neabsolutně*, jestliže konverguje $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ale nekonverguje $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Poznámka 9.1.16. Řada $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ má monotonní částečné součty. Může tedy jen konvergovat a divergovat, nikoliv oscilovat.

Příklad 9.1.17. Již jsme si ukázali, že $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ konverguje a $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverguje. Proto $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ konverguje neabsolutně.

Věta 9.1.18 (Absolutní konvergence implikuje konvergenci). *Jestliže číselná řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně, pak konverguje klasicky.*

Důkaz. Splnění B-C podmínky pro $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ implikuje splnění B-C podmínky pro $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, neboť pro všechna $n, p \in \mathbb{N}$ máme

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k|.$$

□

Stejná myšlenka důkazu nám dává následující kritérium.

Věta 9.1.19 (Srovnávací kritérium I). *Nechť pro všechna $k \in \mathbb{N}$ platí $a_k \in \mathbb{R}$, $b_k \geq 0$ a $|a_k| \leq b_k$. Jestliže $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje (dokonce absolutně).*

Důkaz. Splnění B-C podmínky pro $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ implikuje splnění B-C podmínky pro $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, neboť pro všechna $n, p \in \mathbb{N}$ máme

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k.$$

Podle předchozí věty proto také $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. □

Příklad 9.1.20. (i) Řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ konverguje, neboť $\frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{k^2}$ pro všechna $k \in \mathbb{N}$ a $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ konverguje.

(ii) Řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\log(k-\frac{1}{2})k^2}$ konverguje, neboť $|\frac{1}{\log(k-\frac{1}{2})k^2}| \leq \frac{1}{k^2}$ pro všechna $k \in \mathbb{N} \cap [4, \infty)$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ konverguje a konvergence řady nezávisí na chování konečného počtu členů (můžeme kupříkladu první tři členy studované řady nahradit nulou).

(iii) Řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ diverguje, neboť díky nezáporným členům nemůže oscilovat a kdyby konvergovala, konvergovala by i $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ (používáme $\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{k} \forall k \in \mathbb{N}$), což není pravda.

Další kritérium je založené na našich myšlenkách z důkazu konvergence řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$.

Věta 9.1.21 (Leibnizovo kritérium). *Nechť $\{a_n\}$ je nezáporná nerostoucí posloupnost. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ konverguje právě tehdy, když $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.*

Důkaz. "⇒" Tato implikace plyne z nutné podmínky konvergence.
 "⇐" Částečné součty si přepíšme do tvaru

$$s_{2n} = (-a_1 + a_2) + (-a_3 + a_4) + \dots + (-a_{2n-1} + a_{2n})$$

a

$$s_{2n+1} = -a_1 + (a_2 - a_3) + (a_4 - a_5) + \dots + (a_{2n} - a_{2n+1}).$$

Odtud vidíme, že $\{s_{2n}\}$ a $\{s_{2n+1}\}$ jsou monotonní posloupnosti s členy v intervalu $[-a_1, 0]$ (neboť vždy $-a_1 \leq s_{2n+1} < s_{2n} \leq 0$). Obě tedy musí být konvergentní. Navíc

$$s_{2n+1} - s_{2n} = -a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

a proto mají obě posloupnosti stejnou limitu. Zkoumaná řada tedy konverguje. \square

Poznámka 9.1.22. Předchozí kritérium by se dalo aplikovat také na řadu

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots,$$

pokud bychom pracovali s $b_k := a_{2k-1} + a_{2k}$ (dostáváme nové členy střídající znaménko s nerostoucími absolutními hodnotami). Časem si představíme Dirichletovo kritérium, které bude zobecňovat Leibnizovo kritérium tímto směrem.

9.2 Řady s nezápornými členy

Připomeňme, že v této situaci má posloupnost částečných součtů vždy limitu, a proto může řada jen konvergovat nebo divergovat. Představíme si zde další kritéria konvergence. Ještě připomeňme, že se zabýváme případem, kdy není znám obecný předpis pro s_n , a proto musíme pracovat s předpisem pro a_k . V některých případech vznikají jednoduché formule z výrazů $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ či $\sqrt[k]{a_k}$. Naše kritéria budou připravena pracovat i s těmito výrazy. Často budeme využívat skutečnost, že změna konečného počtu členů neovlivní konvergenci řady.

Poznamenejme ještě, že všechny naše výsledky v této části textu lze také chápat jako výsledky pro absolutní konvergenci řad.

Věta 9.2.1 (Srovnávací kritérium II). *Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset [0, \infty)$, $k_0 \in \mathbb{N}$ a je splněna alespoň jedna z podmínek*

- (i) $a_k \geq b_k \quad \forall k \geq k_0$
 (ii) $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{b_{k+1}}{b_k} \quad \forall k \geq k_0$ (tedy $\{a_k\}, \{b_k\} \subset (0, \infty)$)

a $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje.

Důkaz. U obou podmínek můžeme předpokládat, že $k_0 = 1$, jinak vhodným způsobem změníme prvních $k_0 - 1$ členů zkoumaných řad. Platí-li podmínka (i), výsledek plyne ze Srovnávacího kritéria I (Věta 9.1.19). Nechť platí podmínka (ii), pak pro všechna $k \in \mathbb{N}$ máme

$$a_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \frac{a_{k-1}}{a_{k-2}} \dots \frac{a_2}{a_1} a_1 \geq \frac{b_k}{b_{k-1}} \frac{b_{k-1}}{b_{k-2}} \dots \frac{b_2}{b_1} a_1 = \frac{a_1}{b_1} b_k.$$

Odtud $b_k \leq \frac{b_1}{a_1} a_k$ pro všechna $k \in \mathbb{N}$. Napravo máme členy konvergentní řady, proto lze užít první část věty a jsme hotovi. \square

Poznámka 9.2.2. (i) První podmínku ve větě je možno také nahradit podmínkou $Ca_k \geq b_k$ (díky aritmetice řad).

(ii) Předchozí věta také říká, že pokud dvě řady s nezápornými členy splňují (i) nebo (ii) a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje.

(iii) Podmínka (ii) se dá přepsat do tvaru $\frac{a_k}{a_{k+1}} \leq \frac{b_k}{b_{k+1}}$. S tímto tvarem se příjemně pracuje v případě řad typu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ (velice brzy budeme umět charakterizovat konvergenci těchto řad v závislosti na $\alpha \in \mathbb{R}$ a pak je budeme velice často používat ve srovnávacích kritériích), neboť $\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{\frac{1}{k^\alpha}}{\frac{1}{(k+1)^\alpha}} = (1 + \frac{1}{k})^\alpha$ a pravá strana se dá ještě upravovat pomocí Taylorova rozvoje.

Z první části Srovnávacího kritéria II se snadno získá další užitečný nástroj.

Věta 9.2.3 (Limitní srovnávací kritérium). *Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset (0, \infty)$ a dále necht' $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} \in (0, \infty)$. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje právě tehdy, když $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje.*

Jestliže $\{a_k\}, \{b_k\} \subset (0, \infty)$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} \in [0, \infty)$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje.

Důkaz. Nejprve dokažme první část kritéria. Označme $L := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k}$. Z definice limity existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\frac{L}{2} b_k \leq a_k \leq 2L b_k \quad \text{pro } k \geq k_0.$$

Nyní již stačí použít první část Srovnávacího kritéria II (Věta 9.2.1).

Důkaz druhé části je podobný, používáme nerovnost $a_k \leq (L + 1)b_k$. \square

Poznámka 9.2.4. Limitní srovnávací kritérium je díky použití limity v předpokladech poměrně rychlý nástroj. Na druhou stranu není tak silný jako jeho původní nelimitní verze, která existenci limity nepožaduje a umožňuje díky tomu třeba ukázat konvergenci řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^k}{k^2}$ pomocí konvergence řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$.

Nyní si značně rozšíříme množství známých řad, s nimiž budeme vyšetřované řady srovnávat (zejména o řady typu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$).

Věta 9.2.5 (Integrální kritérium). *Nechť $a \in \mathbb{N}$ a $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá, kladná a nerostoucí na $[a, \infty)$. Pak*

$$\sum_{k=a}^{\infty} f(k) \text{ konverguje} \iff (\mathcal{N}) \int_a^{\infty} f \, dx \in \mathbb{R}.$$


Důkaz. Díky monotonii funkce f máme

$$f(k+1) \leq (\mathcal{N}) \int_k^{k+1} f \, dx \leq f(k).$$

Proto pro libovolné $n \in \mathbb{N}$, $n > a$, platí

$$\sum_{k=a+1}^{n+1} f(k) = \sum_{k=a}^n f(k+1) \leq (\mathcal{N}) \int_a^{n+1} f \, dx \leq \sum_{k=a}^n f(k).$$

Pokud Newtonův integrál konverguje, je (neklesající) primitivní funkce omezená a nutně pak jsou podle levé části našeho odhadu omezené (neklesající) částečné součty řady $\sum_{k=a}^{\infty} f(k)$. Tato řada proto konverguje. Naopak, omezenost částečných součtů řady $\sum_{k=a}^{\infty} f(k)$ implikuje omezenost (neklesající) primitivní funkce, ta proto musí mít vlastní limitu v nekonečnu. \square



Obrázek 9.1: Integrální kritérium: odhady integrálu.

Příklad 9.2.6. (i) Funkce $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ splňuje pro $\alpha > 0$ předpoklady Integrálního kritéria (Věta 9.2.5), a protože

$$(\mathcal{N}) \int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \begin{cases} \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \right]_1^{\infty} = \infty & \text{pro } \alpha < 1 \\ \left[\log x \right]_1^{\infty} = \infty & \text{pro } \alpha = 1 \\ \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \right]_1^{\infty} = \frac{1}{1-\alpha} & \text{pro } \alpha > 1, \end{cases}$$

dostáváme (pro $\alpha \leq 0$ je dokonce porušena nutná podmínka konvergence řad)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \text{ konverguje} \iff \alpha > 1.$$

(ii) Uvažme řadu typu $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha \log^\beta k}$, kde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (řadu sčítáme až od druhého členu, neboť první není definován). Pokud $\alpha > 1$ a $\beta \in \mathbb{R}$, Limitní srovnávací kritérium (Věta 9.2.3) aplikované na naši řadu a řadu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\frac{\alpha+1}{2}}}$ ($\frac{k^{\frac{\alpha+1}{2}}}{k^\alpha \log^\beta k} \rightarrow 0$) spolu s předchozí částí příkladu dávají konvergenci naší řady.

Pokud $\alpha < 1$ a $\beta \in \mathbb{R}$, srovnání s $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\frac{\alpha+1}{2}}}$ dává divergenci. Pokud $\alpha = 1$, Limitní srovnávací kritérium (Věta 9.2.3) kombinované s první částí příkladu je

nepoužitelné. Na druhou stranu, pro $\alpha = 1$ umíme funkce tvaru $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha \log^\beta x}$ snadno integrovat a máme

$$(\mathcal{N}) \int_2^\infty \frac{1}{x \log^\beta x} dx = \begin{cases} [\frac{1}{1-\beta} \log^{1-\beta} x]_2^\infty = \infty & \text{pro } \beta < 1 \\ [\log(\log x)]_2^\infty = \infty & \text{pro } \beta = 1 \\ [\frac{1}{1-\beta} \log^{1-\beta} x]_2^\infty = \frac{1}{\beta-1} \log^{1-\beta} 2 & \text{pro } \beta > 1. \end{cases}$$

Integrální kritérium (Věta 9.2.5) aplikujeme na $[a, \infty)$, kde $a > 2$ je dost velké, aby zde platilo

$$\left(\frac{1}{x} \log^{-\beta} x\right)' = \frac{-\log^{-\beta} x}{x^2} + \frac{-\beta \log^{-\beta-1} x}{x^2} = \frac{\log^{-\beta-1} x}{x^2} (-\log x - \beta) < 0.$$

Celkově dostáváme

$$\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k^\alpha \log^\beta k} \text{ konverguje} \iff \alpha > 1 \vee (\alpha = 1 \wedge \beta > 1).$$

(iii) Mohli bychom náš postup použít i na případ $\sum_{k=3}^\infty \frac{1}{k^\alpha \log^\beta k \log^\gamma(\log k)}$. S výjimkou případu $\alpha = \beta = 1$ se dají opět kombinovat předchozí výsledky spolu s Limitním srovnávacím kritériem (Věta 9.2.3). Ve vyloučeném případě se naopak dobře integruje. Celkově se dostane

$$\sum_{k=3}^\infty \frac{1}{k^\alpha \log^\beta k \log^\gamma(\log k)} \text{ konverguje} \\ \iff \alpha > 1 \vee (\alpha = 1 \wedge \beta > 1) \vee (\alpha = 1 \wedge \beta = 1 \wedge \gamma > 1).$$

Poznámka 9.2.7. (i) Povšimněme si, že například ke zkoumání konvergence řad typu $\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k^\alpha \log^\beta k}$ pro $\alpha \neq 1$ nám stačí znalost chování řad $\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k \log^\beta k}$, neboť pro $\alpha_1 < 1 < \alpha_2$, $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ a $k \in \mathbb{N}$ dostatečně velké máme

$$\frac{1}{k^{\alpha_2} \log^{\beta_2} k} < \frac{1}{k \log^\beta k} < \frac{1}{k^{\alpha_1} \log^{\beta_1} k}$$

($\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k \log^2 k}$ konverguje, $\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k \log k}$ diverguje).

(ii) Nejčastěji budeme studované řady srovnávat s řadami

$$\sum_{k=1}^\infty q^k, \quad \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^\alpha}, \quad \sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k \log^\alpha k}, \quad \sum_{k=3}^\infty \frac{1}{k \log k \log^\alpha(\log k)}, \quad \dots$$

Je výhodné si pamatovat, že ve všech výše uvedených typech řad je číslo jedna hraniční hodnotou parametru (q či α) z hlediska konvergence řady.

Poznámka 9.2.8. Nikdy nebudeme mít natolik univerzální kritérium, aby nám o každé řadě řeklo, zda konverguje či diverguje. Jednak je to tím, že se nám nepodařilo najít „hraniční řadu“ takovou, že by řady s většími členy divergovaly a

s menšími konvergovaly (taková řada ani existovat nemůže, ať už by konvergovala či divergovala, neboť aritmetika řad, konkrétně násobení kladným číslem, by nám dala spor). Navíc členy řad nemusí mít srovnatelný pokles s nějakou důležitou řadou uvedenou výše. Lze třeba vymyslet konvergentní i divergentní řady splňující

$$a_k \leq \frac{1}{k^2} \quad \text{pro nekonečně mnoho } k \quad \text{a} \quad a_k \geq \frac{1}{k} \quad \text{pro nekonečně mnoho } k.$$

Nyní si uvedeme dvě kritéria založená na srovnání s geometrickou řadou.

Věta 9.2.9 (Cauchyovo odmocninové kritérium). *Nechť $\{a_k\} \subset [0, \infty)$ a $k_0 \in \mathbb{N}$.*
 (i) *Jestliže existuje $q \in [0, 1)$ takové, že $\sqrt[k]{a_k} \leq q$ pro všechna $k \geq k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Speciálně, pokud $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$, řada konverguje.*
 (ii) *Jestliže $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$ pro všechna $k \geq k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje. Speciálně, pokud $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} > 1$, řada diverguje.*

Důkaz. Dokažme (i). V prvním případě máme $a_k \leq q^k$ pro $q \in [0, 1)$ a $k \geq k_0$, přičemž řada $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ je konvergentní. Výsledek tedy plyne ze Srovnávacího kritéria II (Věta 9.2.1). Pokud $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$, stačí zafixovat $q \in (\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k}, 1)$. Najdeme k_0 tak, že platí $\sqrt[k]{a_k} \leq q$ pro všechna $k \geq k_0$ a jsme v situaci jako výše.

Dokažme (ii). Zde máme odhad $a_k \geq 1$ a pro všechna $k \geq k_0$ máme porušení nutnou podmínku konvergence číselných řad. Předpoklad $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} > 1$ vede na tutéž situaci. \square

Příklad 9.2.10. Studujeme konvergenci řady $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{k+2}\right)^{k^2}$. Máme

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{k+2}\right)^k = e^{-2} < 1$$

(lze využít $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e$, nebo si přepsat obecnou mocninu pomocí funkce exp, což vede na limitu standardní obtížnosti).

Poznámka 9.2.11. (i) Cauchyovo odmocninové kritérium (Věta 9.2.9) si neporadí s žádnou z řad $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\alpha > 0$, neboť $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{1}{k^\alpha}} = 1$. Zároveň vidíme, že případ $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = 1$ připouští jak konvergentní, tak divergentní řady.
 (ii) Přestože je odmocninové kritérium poměrně slabé, nachází uplatnění v situacích, kdy se zápis členu a_k značně zjednoduší po aplikaci k -té odmocniny. Aplikace mocného integrálního kritéria na předchozí příklad by jistě příjemná nebyla.

Další kritérium je opět slabé, leč leckdy uživatelsky velice příjemné.

Věta 9.2.12 (d'Alembertovo podílové kritérium). *Nechť $\{a_k\} \subset (0, \infty)$ a $k_0 \in \mathbb{N}$.*
 (i) *Jestliže existuje $q \in [0, 1)$ takové, že $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q$ pro všechna $k \geq k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Speciálně, pokud $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$, řada konverguje.*
 (ii) *Jestliže $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1$ pro všechna $k \geq k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje. Speciálně, pokud $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$, řada diverguje.*

Důkaz. Dokažme (i). V prvním případě máme pro libovolné $k > k_0$

$$a_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \frac{a_{k-1}}{a_{k-2}} \dots \frac{a_{k_0+1}}{a_{k_0}} a_{k_0} \leq q^{k-k_0} a_{k_0} = Cq^k$$

a konvergence studované řady je důsledkem konvergence geometrické řady. V případě, že $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$, pro zafixované $q \in (\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}, 1)$ vždy najdeme $k_0 \in \mathbb{N}$ tak, že máme $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q$ pro všechna $k \geq k_0$ a jsme v situaci jako výše.

Dokažme (ii). V tomto případě máme pro libovolné $k > k_0$

$$a_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \frac{a_{k-1}}{a_{k-2}} \dots \frac{a_{k_0+1}}{a_{k_0}} a_{k_0} \geq a_{k_0},$$

je tedy porušena nutná podmínka konvergence. Předpoklad $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$ vede na tutéž situaci. \square

Příklad 9.2.13. Studujme konvergenci řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!}$. Máme

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{((k+1)!)^2 (2k)!}{(k!)^2 (2k+2)!} = \frac{(k+1)^2}{(2k+2)(2k+1)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{4}.$$

Naše řada proto konverguje podle d'Alembertova podílového kritéria (Věta 9.2.12).

Poznámka 9.2.14. (i) Ani toto kritérium nefunguje na řady typu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\alpha > 0$, či obecně v případě $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$. Oceníme jej zejména v situacích, kdy se dobře počítá $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ a nerovná se jedné.

(ii) Poznamenejme ještě, že ve výrazu $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ dochází ke značnému zjednodušení faktoriálu, který se často vyskytuje v Taylorových řadách.

Poznámka 9.2.15. Limitní verze kritéria je opět rychlejší, ale slabší než nelimitní. Stačí uvážit řadu

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \dots$$

(střídá se $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{2}$ a $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{4}$).

Poznámka 9.2.16. Přestože obě výše dokázaná kritéria jsou shodně založena na vlastnostech geometrické řady, fungují odlišně. Například s řadou

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \dots$$

(střídá se $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{4}$ a $\frac{a_{k+1}}{a_k} = 2$), si odmocninové kritérium poradí, podílové nikoliv.

Podílové kritérium se dá zobecnit tak, že si spočítáme $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ pro řady typu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ a získaný výsledek budeme kombinovat s druhou částí Srovnávacího kritéria II (Věta 9.2.1).

Věta 9.2.17 (Raabeho kritérium). *Nechť $\{a_k\} \subset (0, \infty)$ a $k_0 \in \mathbb{N}$.*

(i) *Existuje-li $q > 1$ tak, že $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \geq q$ pro všechna $k \geq k_0$, pak řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Speciálně, jestliže $\lim_{k \rightarrow \infty} k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) > 1$, řada konverguje.*

(ii) *Jestliže $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \leq 1$ pro všechna $k \geq k_0$, pak řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje. Speciálně, jestliže $\lim_{k \rightarrow \infty} k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) < 1$, řada diverguje.*

Důkaz. V prvním případě provedeme srovnání s konvergentní řadou $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, kde zafixujeme $\alpha \in (1, q)$. Položme tedy $b_k = \frac{1}{k^\alpha}$ pro $k \in \mathbb{N}$ a zafixujme ještě $\beta \in (\alpha, q)$. Pro k dostatečně velké dostáváme odhad

$$\frac{b_k}{b_{k+1}} = \left(\frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k+1}} \right)^\alpha = \left(1 + \frac{1}{k} \right)^\alpha \leq 1 + \frac{\beta}{k}.$$

Skutečně, Taylorův rozvoj funkce $(1+x)^\alpha$ v počátku a Lagrangeův tvar zbytku dávají

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{1}{2} \alpha(\alpha-1)(1+\xi)^{\alpha-2} x^2,$$

kde $\xi \in (0, x)$. Pro x dostatečně blízko k počátku proto můžeme poslední člen pravé strany odhadnout libovolně malým násobkem předposledního.

Z předchozích odhadů a předpokladu $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \geq q$ máme

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} \geq 1 + \frac{q}{k} > 1 + \frac{\beta}{k} \geq \frac{b_k}{b_{k+1}}.$$

Druhá část Srovnávacího kritéria II (Věta 9.2.1) nám dává konvergenci $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Nechť nyní $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \leq 1$ pro všechna $k \geq k_0$. Odtud

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} \leq 1 + \frac{1}{k} = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k+1}}$$

a druhá část Srovnávacího kritéria II nám dává divergenci, neboť $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverguje. \square

Poznámka 9.2.18. (i) Raabeho kritérium se používá v situacích, kdy je zápis $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ jednodušší než zápis a_k , ale podílové kritérium je v dané situaci příliš slabé. Typicky se k Raabeho kritériu přechází po neúspěšné aplikaci podílového kritéria (mějte ovšem na paměti, že jedno z kritérií pracuje s výrazem $\frac{a_{k+1}}{a_k}$, zatímco druhé s $\frac{a_k}{a_{k+1}}$).

(ii) Raabeho kritérium není v žádném případě všemocné. Ověřte si sami, že si neporadí s řadami typu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \log^\alpha k}$, $\alpha > 0$.

Další krůček ve zjemnění práce s výrazem $\frac{a_k}{a_{k+1}}$ nám dává následující kritérium.

Věta 9.2.19 (Gaussovo kritérium). *Nechť $\{a_k\} \subset (0, \infty)$. Nechť existují $p, q \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon, C > 0$ tak, že*

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = p + \frac{q}{k} + \frac{t_k}{k^{1+\varepsilon}}, \quad \text{kde } |t_k| \leq C.$$

- (i) Jestliže $p > 1$, řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje. Jestliže $p < 1$, řada diverguje.
(ii) Jestliže $p = 1$ a $q > 1$, řada konverguje.
(iii) Jestliže $p = 1$ a $q \leq 1$, řada diverguje.

Důkaz. Všechny případy, kdy $p \neq 1$ nebo $q \neq 1$ nám dává Raabeho případně podílové kritérium. Uvažme zbývající případ $p = q = 1$. Definujme $b_k = \frac{1}{k \log k}$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Pak

$$\begin{aligned} \frac{b_k}{b_{k+1}} &= \frac{(k+1) \log(k+1)}{k \log k} = \frac{(k+1)(\log k + \log(1 + \frac{1}{k}))}{k \log k} \\ &= 1 + \frac{1}{k} + \frac{\log(1 + \frac{1}{k})}{\log k} + \frac{\log(1 + \frac{1}{k})}{k \log k}. \end{aligned}$$

Protože pro dostatečně velké k máme odhad $\log(1 + \frac{1}{k}) \geq \frac{1}{2k}$ (využíváme známou limitu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$), dostáváme

$$\frac{b_k}{b_{k+1}} \geq 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{2k \log k} \quad \text{pro } k \text{ dostatečně velké.}$$

Celkově i s předpokladem $\frac{a_k}{a_{k+1}} \leq 1 + \frac{1}{k} + \frac{C}{k^{1+\varepsilon}}$ proto máme pro k dostatečně velké

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} \leq 1 + \frac{1}{k} + \frac{C}{k^{1+\varepsilon}} \leq 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{2k \log k} \leq \frac{b_k}{b_{k+1}}$$

a Srovnávací kritérium II (Věta 9.2.1) nám dává divergenci studované řady, neboť $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log k}$ diverguje. \square

Poznámka 9.2.20. Přestože jsme v důkazu používali řadu $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log k}$, s touto řadou si Gaussovo kritérium neporadí, neboť pro žádnou volbu $p, q \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon > 0$ zbytkový člen $\frac{t_k}{k^{1+\varepsilon}}$ nemá omezený čitatel (podívejte se na „nejnadějnější“ případ $p = q = 1$ v předchozím důkazu). Dokonce nepomůže ani zesílená verze Gaussova kritéria z Cvičení 9.2.21 níže.

Cvičení 9.2.21. Dokažte, že řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje i za předpokladu, že pro $\alpha > 1$ a $k \geq k_0$

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = 1 + \frac{1}{k} + \frac{t_k}{k \log^{\alpha} k},$$

kde $|t_k| \leq C$, nezávisle na k .

Příklad 9.2.22. Nechť $a, b \in \mathbb{R}$. Zkoumejme konvergenci $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+a)(k-1+a)\dots a}{k!k^b}$. Platí (ověřte si sami pomocí Taylorova rozvoje, že r_k, s_k, t_k jsou v dalším omezené)

$$\begin{aligned} \frac{a_k}{a_{k+1}} &= \frac{k+1}{k+1+a} \left(\frac{k+1}{k}\right)^b = \left(1 - \frac{a}{k+1+a}\right) \left(1 + \frac{1}{k}\right)^b \\ &= \left(1 - \frac{a}{k} + \frac{r_k}{k^2}\right) \left(1 + \frac{b}{k} + \frac{s_k}{k^2}\right) = 1 + \frac{b-a}{k} + \frac{t_k}{k^2}. \end{aligned}$$

Zkoumaná řada tedy konverguje právě tehdy, když $b - a > 1$.

Poznámka 9.2.23. Celá výše probíraná teorie se dá aplikovat na řady se zápornými členy (vytkneme znaménko mínus, nebo ve všech kritériích nahradíme a_k za $|a_k|$). Vzhledem k tomu, že změna konečného počtu členů neovlivní konvergenci řady, naše teorie se dá rozšířit i na všechny řady, které nemají zároveň nekonečně mnoho kladných členů a nekonečně mnoho záporných členů.

9.3 Řady s obecnými členy

Nyní se budeme zabývat řadami, jejichž členy nekonečněkrát změni znaménko, neboli nekonečně mnoho členů má znaménko kladné a nekonečně mnoho záporné. Tato situace je provázána hned několika jevy, které se u řad s kladným znaménkem nevyskytovaly. Jednak kromě konvergence a divergence nyní může nastat i oscilace. Dalším jevem je neabsolutní konvergence. Absolutní konvergence znamenala, že je vhodným způsobem kontrolována velikost členů studované řady. V případě neabsolutní konvergence již nemusí velikost (absolutní hodnota) členů řady splňovat tak přísné podmínky, je-li to kompenzováno dostatečným vzájemným vyrušením kladných a záporných členů (uvažte $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\log k}$). V této situaci už informace typů třeba $a_k \leq b_k$, $|a_k| \leq |b_k|$, $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{b_{k+1}}{b_k}$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} \in (0, \infty)$ neimplikují žádný vztah mezi konvergencí řad $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ (samí si zkonstruuje příklady jako třeba $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ a $\sum_{k=1}^{\infty} (\frac{(-1)^k}{k} + \frac{1}{\sqrt{k}})$).

Věta 9.3.1 (Abelovo a Dirichletovo kritérium). *Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset \mathbb{R}$ a $\{a_k\}$ je monotonní.*

(Dirichlet) *Jestliže $a_k \rightarrow 0$ a $\{b_k\}$ má omezené částečné součty, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ konverguje.*

(Abel) *Jestliže $\{a_k\}$ je omezená a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ konverguje.*

Důkaz. Nejprve předpokládejme Dirichletovy podmínky a ukažme, že zkoumaná řada splňuje B-C podmínku. Zvolme $\varepsilon > 0$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\{a_n\}$ je nerostoucí. Ve znění nerovnosti z B-C podmínky si členy posloupnosti $\{b_k\}$ vyjádříme pomocí částečných součtů této posloupnosti, které budeme značit B_n , a máme (tzv. Abelova parciální sumace)

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k &= a_{n+1} b_{n+1} + a_{n+2} b_{n+2} + \cdots + a_{n+p-1} b_{n+p-1} + a_{n+p} b_{n+p} \\ &= a_{n+1} (B_{n+1} - B_n) + a_{n+2} (B_{n+2} - B_{n+1}) \\ &\quad + \cdots + a_{n+p-1} (B_{n+p-1} - B_{n+p-2}) + a_{n+p} (B_{n+p} - B_{n+p-1}) \\ &= -B_n a_{n+1} + B_{n+1} (a_{n+1} - a_{n+2}) + B_{n+2} (a_{n+2} - a_{n+3}) \\ &\quad + \cdots + B_{n+p-1} (a_{n+p-1} - a_{n+p}) + a_{n+p} B_{n+p}. \end{aligned}$$

Odtud s využitím monotonie $\{a_k\}$, omezenosti $\{B_n\}$ a vlastnosti $a_k \rightarrow 0$ dostá-

váme pro n dostatečně velká následující odhad

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| &\leq | -B_n a_{n+1} | + |B_{n+1}|(a_{n+1} - a_{n+2}) + |B_{n+2}|(a_{n+2} - a_{n+3}) \\ &\quad + \cdots + |B_{n+p-1}|(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + |a_{n+p} B_{n+p}| \\ &\leq C\varepsilon + C(a_{n+1} - a_{n+2}) + C(a_{n+2} - a_{n+3}) \\ &\quad + \cdots + C(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + C\varepsilon \\ &= C\varepsilon + C(a_{n+1} - a_{n+p}) + C\varepsilon \leq C\varepsilon + C a_{n+1} + C\varepsilon \leq 3C\varepsilon. \end{aligned}$$

Ověřili jsme B-C podmínku pro limitu částečných součtů řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ a jsme v prvním případě hotovi.

Nyní předpokládejme Abelovy podmínky. Protože posloupnost $\{a_k\}$ je monotónní a omezená, má vlastní limitu. Označme ji A . Pak

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} A b_k + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - A) b_k,$$

kde první řada napravo konverguje díky aritmetice řad a druhá splňuje předpoklady Dirichletova kritéria. Proto díky aritmetice řad konverguje i řada nalevo. \square

Příklad 9.3.2. (i) Z Dirichletova kritéria plyne Leibnizovo kritérium (tedy Věta 9.1.21), neboť posloupnost $\{(-1)^k\}$ má omezené částečné součty (střídají se hodnoty -1 a 0).

(ii) Často se dá kombinovat Dirichletovo kritérium s Abelovým, jak nám ukazuje příklad $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \arctan k$, kde nejprve použijeme Dirichletovo kritérium k ověření konvergence $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ a pak využijeme právě získanou konvergenci spolu s monotonií a omezeností posloupnosti $\{\arctan k\}$ při aplikaci Abelova kritéria.

(ii) Abelovo kritérium se dá použít i vícekrát za sebou. Uvažme například řadu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \frac{k}{k+1} \arctan k$, kde jedna aplikace Dirichletova kritéria a jedna aplikace Abelova kritéria dávají konvergenci $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \arctan k$ (bylo výše) a pak díky Abelovu kritériu ještě můžeme do řady přidat omezený monotónní činitel $\frac{k}{k+1} = 1 - \frac{1}{k+1}$.

Poznámka 9.3.3. (i) Dirichletovo kritérium oproti Abelovu má přísnější podmínky na $\{a_k\}$ (konvergence k nule implikuje omezenost) a volnější podmínky na $\{b_k\}$ (konvergence řady implikuje omezenost jejich částečných součtů). Není možné vzít jen omezenost $\{a_k\}$ a omezenost částečných součtů $\{b_k\}$, jak ukazuje volba $a_k := 1$, $b_k := (-1)^k$.

(ii) Není radno zapomínat na monotonií posloupnosti $\{a_k\}$. Jinak Dirichletovo ani Abelovo kritérium neplatí ($a_k := \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \rightarrow 0$, pro $b_k := \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ je odpovídající řada konvergentní, ale celkově $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverguje).

(iii) Komplexní varianta Abelova a Dirichletova kritéria vypadá tak, že $\{a_k\}$ je

reálná monotonní posloupnost, $\{b_k\}$ je komplexní posloupnost a zbytek znění je stejný jako v reálném případě. Důkaz se získá rozkladem posloupnosti $\{b_k\}$ na reálnou a imaginární složku, případně se zopakuje důkaz Věty 9.3.1 pro komplexní částečné součty. Nemůže platit varianta s $\{a_k\}, \{b_k\} \in \mathbb{C}$, neboť pak bychom neměli pojem monotonie a bez něho Věta 9.3.1 nemůže platit, jak bylo ukázáno výše.

Poznámka 9.3.4. Povšimněte si, že v případě řad s nezápornými členy nám ani Abelovo ani Dirichletovo kritérium nenabízí nic, co by nám nedalo Srovnávací kritérium I (Věta 9.1.19).

Představíme si ještě dva typy posloupností s omezenými částečnými součty.

Tvrzení 9.3.5. *Nechť $a \in \mathbb{R}$. Pak posloupnost $k \mapsto \sin(ak)$ má omezené částečné součty. Posloupnost $k \mapsto \cos(ak)$ má omezené částečné součty právě tehdy, když a není násobkem čísla 2π .*

Důkaz. Pokud a není násobkem 2π , máme

$$\begin{aligned} s_n &:= \sum_{k=1}^n \sin(ak) = \sum_{k=1}^n \frac{e^{iak} - e^{-iak}}{2i} = \frac{\sum_{k=1}^n e^{iak} - \sum_{k=1}^n e^{-iak}}{2i} \\ &= \frac{1}{2i} e^{ia} \frac{1 - e^{ia(n+1)}}{1 - e^{ia}} - \frac{1}{2i} e^{-ia} \frac{1 - e^{-ia(n+1)}}{1 - e^{-ia}}. \end{aligned}$$

Odtud

$$\begin{aligned} |s_n| &\leq \frac{1}{|2i|} |e^{ia}| \frac{1 + |e^{ia(n+1)}|}{|1 - e^{ia}|} + \frac{1}{|2i|} |e^{-ia}| \frac{1 + |e^{-ia(n+1)}|}{|1 - e^{-ia}|} \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1 + 1}{|1 - e^{ia}|} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1 + 1}{|1 - e^{-ia}|}, \end{aligned}$$

tedy částečné součty posloupnosti $k \mapsto \sin(ak)$ jsou omezené. Pokud a je násobkem 2π , sčítáme samé nulové členy a výsledek platí triviálně. Při práci s posloupností $k \mapsto \cos(ak)$ použijeme vzorec $\cos(ak) = \frac{e^{iak} + e^{-iak}}{2}$. Je-li a násobkem 2π , máme $\cos(ak) \equiv 1$ a částečné součty nejsou omezené. \square

Cvičení 9.3.6. Postupem ukázaným výše ukažte, že číselné posloupnosti $\{\sin^3 k\}$, $\{\cos^3 k\}$, $\{(-1)^k \sin^3 k\}$, $\{(-1)^k \cos^3 k\}$ mají omezené částečné součty (při výpočtu budete vždy pracovat se čtveřicí konvergentních geometrických řad). Tímto postupem se dá rovněž ukázat, že $\sin^2 k$ nemá omezené částečné součty (postup výše vede na součet dvou konvergentních geometrických řad a řady reálných konstant).

Poznámka 9.3.7. Samozřejmě, pokud čtenář umí zacházet se součtovými vzorci pro goniometrické funkce a všimne si, že $(-1)^k = \cos(k\pi)$, lze předchozí cvičení vyřešit mnohem snadněji použitím Věty o aritmetice řad (Věta 9.1.13).

Příklad 9.3.8. Řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^3 k}{k}$ a $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sin^3 k}{k}$ jsou konvergentní podle Dirichletova kritéria.

Pro důkaz toho, že zkoumaná řada nekonverguje, máme jedinou přímou metodu a sice porušení B-C podmínky (případně porušení nutné podmínky konvergence, což je ovšem speciální případ B-C podmínky).

Příklad 9.3.9. Ukažme, že nekongruje řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{k}}{\sqrt{k}}$. Dokážeme, že je splněna negace B-C podmínky, tedy

$$\exists \varepsilon > 0 \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} \cap [n_0, \infty) \exists p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \geq \varepsilon.$$

K porušení B-C podmínky využijeme toho, že pro velká k jsou řetězce členů stejného znaménka velmi dlouhé. Předně si povšimněme, že

$$\sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}}.$$

Pro každé $m \in \mathbb{N}$ zvolme $k_m \in \mathbb{N}$ takové, že $\sqrt{k_m} \in [2m\pi + \frac{\pi}{6}, 2m\pi + \frac{\pi}{4}]$ (aspoň jedno takové číslo existovat musí, neboť pro $m \geq 1$ pracujeme napravo od bodu 2π , tedy $\sqrt{k} \geq 6$, odtud $\sqrt{k+1} - \sqrt{k} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}} \leq \frac{1}{12}$, a proto není možné, aby dvojice \sqrt{k} a $\sqrt{k+1}$ „přeskočila“ interval délky $\frac{\pi}{12} > \frac{1}{12}$). Z odhadu výše také vidíme, že

$$\sqrt{k_m + j} \in [2m\pi + \frac{\pi}{6}, 2m\pi + \frac{5\pi}{6}] \quad \text{pro } j = 0, 1, 2, \dots, 2[\sqrt{k_m}].$$

Odtud

$$\sum_{k=k_m}^{k_m+2[\sqrt{k_m}]} \frac{\sin \sqrt{k}}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=k_m}^{k_m+2[\sqrt{k_m}]} \frac{\frac{1}{2}}{2\sqrt{k_m}} = \frac{1}{4\sqrt{k_m}} (2[\sqrt{k_m}] + 1) \geq \frac{1}{2\sqrt{k_m}} \sqrt{k_m} = \frac{1}{2}.$$

Nedá se proto splnit B-C podmínka s volbou $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

Výpočet spojený s porušením B-C podmínky bývá často zdlouhavý. Občas se proto vyplatí jít na příklad oklikou.

Příklad 9.3.10. Ukažme, že řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2 k}{k}$ nekongruje. Máme

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2 k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k} - \frac{\cos(2k)}{2k} \right).$$

Protože řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k)}{2k}$ kongruje podle Dirichletova kritéria (Věta 9.3.1), pokud by kongruovala naše řada, podle aritmetiky řad by kongruovala i řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ a tím bychom dostali spor.

9.4 Přerovnávání řad a součin řad

V dalším si ukážeme, že na součet absolutně konvergentní řady nemá přerovnání členů žádný vliv. Naproti tomu u neabsolutně konvergentních řad může mít tato operace závažné následky.

Definice 9.4.1 (Přerovnání řady). Necht $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ a $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je bijekce. Pak řadu $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$ nazveme *přerovnaním* řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (odpovídajícím bijekci φ).

Definice 9.4.2 (Kladná a záporná část). Necht $x \in \mathbb{R}$. *Kladnou část* čísla x definujeme jako $x^+ := \max\{x, 0\}$ a *zápornou část* jako $x^- := \max\{-x, 0\}$.

Příklad 9.4.3. Pro $x \geq 0$ máme $x^+ = x$ a $x^- = 0$, pro $x \leq 0$ máme $x^+ = 0$ a $x^- = -x = |x|$. Vždy platí $x = x^+ - x^-$ a $|x| = x^+ + x^-$.

Věta 9.4.4 (Charakterizace absolutní a neabsolutní konvergence). *Necht $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$. Pak*

- (i) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně $\iff \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+$ a $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^-$ konvergují.
(ii) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně $\implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \infty$.

Důkaz. V části (i) plyne implikace „ \implies “ z odhadů $0 \leq a_k^+ \leq |a_k|$ a $0 \leq a_k^- \leq |a_k|$. Implikace „ \impliedby “ plyne z identity $|a_k| = a_k^+ + a_k^-$ a aritmetiky konvergentních řad.

V části (ii) máme $\infty = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^+ + a_k^-)$. Alespoň jedna z řad na pravé straně implikace proto musí mít nekonečný součet. Protože zároveň $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^+ - a_k^-)$ konverguje, podle aritmetiky řad nemůže mít nekonečný součet právě jedna řada na pravé straně dokazované implikace. \square

Poznámka 9.4.5. Implikace v části (ii) se nedá otočit, jak ukazuje řada

$$1 - 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + \dots$$

Věta 9.4.6 (O přerovnání absolutně konvergentní řady). *Necht $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ a řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně. Pak každé její přerovnání konverguje absolutně a má stejný součet.*

Důkaz. Necht $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ je přerovnáním $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Nejprve uvažme jednoduchý případ $\{a_k\} \subset [0, \infty)$. Je-li $n \in \mathbb{N}$, pak existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\{b_1, \dots, b_n\} \subset \{a_1, \dots, a_{k_0}\}$, a proto

$$\sum_{k=1}^n b_k \leq \sum_{k=1}^{k_0} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k \in \mathbb{R}.$$

Odtud $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ má omezené monotonní částečné součty, tedy (absolutně) konverguje a platí $\sum_{k=1}^{\infty} b_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Prohozením rolí $\{a_k\}$ a $\{b_k\}$ dostáváme obrácenou nerovnost. Proto jsou součty obou řad stejné.

V obecném případě si napíšeme $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^-$. Pro každou z řad na pravé straně platí výsledek dokázaný výše. Odtud

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Absolutní konvergence plyne z konvergence řad $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^+$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^-$. \square

Věta 9.4.7 (Riemannova věta o přerovnání neabsolutně konvergentní řady). *Necht $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ a řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně. Pak pro každé $S \in \mathbb{R}^*$ existuje přerovnání řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se součtem S .*

Důkaz. Máme $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \infty$ a $a_k \rightarrow 0$ pro $k \rightarrow \infty$. Nechť nejprve $S \in \mathbb{R}$. Zvolme $n_1 \in \mathbb{N}$ jako nejmenší přirozené číslo splňující

$$S_1 := a_1^+ + a_2^+ + \cdots + a_{n_1}^+ > S.$$

Dále vezmeme $m_1 \in \mathbb{N}$ jako nejmenší přirozené číslo splňující

$$S_2 := a_1^+ + a_2^+ + \cdots + a_{n_1}^+ - a_1^- - a_2^- - \cdots - a_{m_1}^- < S.$$

Nyní zase zvolíme $n_2 > n_1$ jako nejmenší číslo splňující

$$S_3 := a_1^+ + a_2^+ + \cdots + a_{n_1}^+ - a_1^- - a_2^- - \cdots - a_{m_1}^- + a_{n_1+1}^+ + \cdots + a_{n_2}^+ > S.$$

Dále pokračujeme indukcí. Konstrukce se nikdy nezastaví, neboť $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \infty$. Navíc pro libovolné $j \in \mathbb{N}$, $j \geq 2$ máme

$$|S_{2j-1} - S| \leq a_{n_j}^+ \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0 \quad a \quad |S_{2j} - S| \leq a_{m_j}^- \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0,$$

neboť vždy $n_i \geq i$, $m_i \geq i$ a $a_k \rightarrow 0$. Pro definici přerovnání vynecháváme nulové členy; je-li ale $a_k = 0$, použijeme právě jednu z hodnot a_k^+ a a_k^- . Celkově dostáváme přerovnanou řadu se součtem S .

Pokud $S = \infty$, provedeme variantu konstrukce s $S_1 > 1$, $S_2 < 1$, $S_3 > 2$, $S_4 < 2$, $S_5 > 3$, atd. Pro $S = -\infty$ pracujeme podobně. \square

Naším dalším cílem je studovat součiny řad. Pro absolutně konvergentní řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ dostaneme vzorec

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \right) = \sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j.$$

Výraz napravo obsahuje zápis sumy, s nímž jsme se dosud nesetkali a neumíme s ním pracovat. Začneme tedy opatrně definicí.

Definice 9.4.8 (Zobecněná řada a její konvergence). Nechť M je spočetná množina (existuje bijekce mezi M a \mathbb{N}). Řekneme, že *zobecněná řada* $\sum_{m \in M} a_m$ konverguje, jestliže existuje taková bijekce $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow M$, že $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$ je absolutně konvergentní. Pak definujeme $\sum_{m \in M} a_m := \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$.

Poznámka 9.4.9. Protože absolutně konvergentní řady mají součet stabilní vůči přerovnání, pokud existuje jedna bijekce s vlastností z definice, všechny ostatní bijekce mezi \mathbb{N} a M dávají absolutně konvergentní řady se stejným součtem.

Příklad 9.4.10. Uvažme $M = \mathbb{N}^2$ a řadu $\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} 2^{-(i+j)}$. Uvažme bijekci φ , která prvky \mathbb{N}^2 seřadí do posloupnosti

$$(1, 1), (2, 1), (1, 2), (3, 1), (2, 2), (1, 3), (4, 1), \dots$$

V tomto případě máme

$$S := \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)} = 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-4} + 2^{-4} + 2^{-5} + \dots$$

Dostáváme absolutně konvergentní řadu (porovnejte částečné součty naší řady s částečnými součty řady $\sum_{k=1}^{\infty} k2^{-k-1}$, jejíž konvergenci umíte ověřit pomocí odmocninového kritéria). Odtud $\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} 2^{-(i+j)} = S$ (zatím S neumíme vyčíslit, ale již brzy to umět budeme) a tento výsledek nezávisí na volbě bijekce mezi \mathbb{N}^2 a \mathbb{N} .

Poznámka 9.4.11. Často se pro $\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} a_{(i,j)}$ používá značení $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{i,j}$ nebo $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$.

Věta 9.4.12 (Cauchyova věta o součinu řad). *Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset \mathbb{R}$ a nechtě řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergují absolutně. Pak je řada $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j$ absolutně konvergentní a platí*

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j = \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \right).$$

Důkaz. Definujme $\tilde{A}_n := \sum_{k=1}^n |a_k|$, $\tilde{B}_n := \sum_{k=1}^n |b_k|$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Bijekci $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ (jednotlivé složky budeme později značit φ_1 a φ_2) tentokrát zavedme konstrukcí

$$(1, 1), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 3), (4, 1), \dots$$

Dále definujme $S_n := \sum_{k=1}^n a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)}$ a $\tilde{S}_n := \sum_{k=1}^n |a_{\varphi_1(k)}| |b_{\varphi_2(k)}|$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Absolutní konvergence $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j$ plyne z toho, že $\{\tilde{S}_n\}$ je neklesající posloupnost splňující

$$\tilde{S}_{n^2} = \sum_{k=1}^{n^2} |a_{\varphi_1(k)}| |b_{\varphi_2(k)}| = \sum_{i=1}^n |a_i| \sum_{j=1}^n |b_j| = \tilde{A}_n \tilde{B}_n \leq \sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|.$$


Proto je také $\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)}$ konvergentní a platí

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j &:= \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \sum_{j=1}^{\infty} b_j. \end{aligned}$$

□

Příklad 9.4.13. Díky Větě 9.4.12 dostáváme, že

$$\sum_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} 2^{-(i+j)} = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = 1.$$




Obrázek 9.2: Částečné znázornění bijekce z důkazu Cauchyovy věty.

Poznámka 9.4.14. Někdy se používá pro součin řad jiná bijekce, která se zapisuje jako

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n+1} a_i b_j \right).$$

Tento vztah se také někdy nazývá Cauchyův vzorec.



Obrázek 9.3: Částečné znázornění bijekce z Poznámky 9.4.14.

9.5 Metoda aritmetických průměrů a cesarovské součty

Nyní se budeme zabývat otázkou, zda je možné nekonvergentní řadě přiřadit číslo, které bude mít alespoň částečně vlastnosti jejího součtu. Náš přístup bude založen na následující konstrukci.

Lemma 9.5.1 (O konvergenci aritmetických průměrů). *Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ splňuje $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = A \in \mathbb{R}^*$. Definujme posloupnost $\{b_k\}$ předpisem*

$$b_1 = a_1, b_2 = \frac{a_1 + a_2}{2}, b_3 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}, \dots, \quad \text{neboli} \quad b_j = \frac{1}{j} \sum_{k=1}^j a_k.$$

Pak $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = A$.

Důkaz. Budeme se zabývat jen případem $A \in \mathbb{R}$, v ostatních případech se použije podobná myšlenka. Zvolme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ tak, že $A - \varepsilon < a_k < A + \varepsilon$ pro $k > k_0$. Je-li potom $k > k_0$ dostatečně velké, dostáváme

$$b_k = \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} = \frac{a_1 + \cdots + a_{k_0}}{k} + \frac{a_{k_0+1} + \cdots + a_k}{k - k_0} \frac{k - k_0}{k} < \varepsilon + A + \varepsilon$$

a

$$b_k = \frac{a_1 + \cdots + a_{k_0}}{k} + \frac{a_{k_0+1} + \cdots + a_k}{k - k_0} - \frac{k_0}{k} \frac{a_{k_0+1} + \cdots + a_k}{k - k_0} > -\varepsilon + A - \varepsilon - \varepsilon(|A| + \varepsilon).$$

Proto $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = A$. □

Poznámka 9.5.2. Obrácená implikace neplatí. Abychom to demonstrovali, uvažme posloupnost $\{a_k\} = \{(-1)^k\}$. Tato posloupnost limitu nemá. Pro aritmetické průměry však platí

$$\{b_k\} = \{-1, 0, -\frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{5}, \dots\} \quad a \quad \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0.$$

Příklad 9.5.3. Z teorie Taylorových rozvoju víme, že

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad \text{na } (-1, 1).$$

Jinými slovy, máme posloupnost polynomů $\{P_k\}$ takových, že $\text{st } P_k = k$ pro každé $k \in \mathbb{N}_0$ a $P_k(x) \rightarrow \frac{1}{1-x}$ pro každé $x \in (-1, 1)$ (a v žádném jiném bodě to neplatí). Pokud však definujeme polynomy

$$Q_k := \frac{1}{k+1} \sum_{j=0}^k P_j,$$

dostáváme posloupnost polynomů stupně k s o něco lepší aproximační vlastností $Q_k(x) \rightarrow \frac{1}{1-x}$ pro každé $x \in [-1, 1)$.

Poznámka 9.5.4. Výsledek předchozího příkladu, tedy získání konvergence v jednom bodě navíc, není příliš oslnivý. Později se budeme zabývat teorií Fourierových řad, tedy rozvoju typu

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (c_k \cos(kx) + d_k \sin(kx))$$

($\{c_k\}, \{d_k\}$ jsou posloupnosti reálných koeficientů), kde metoda aritmetických průměrů přináší podstatně zajímavější výsledky. Poznamenejme ještě, že Fourierovy řady mají široké uplatnění od teorie parciálních diferenciálních rovnic až třeba po zpracování zvukového záznamu.

Metoda aritmetických průměrů aplikovaná na částečné součty posloupnosti $\{a_k\}$ má vlastní stručnou terminologii danou následující definicí.

Definice 9.5.5 (Cesarovská sčítatelnost). Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$. Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ definujeme $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ a $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k$. Řekneme, že $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ je *cesarovsky sčítatelná*, jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n \in \mathbb{R}$. Číslo $A := \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$ pak nazveme *cesarovským součtem* řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a píšeme $(C, 1) \sum_{k=1}^{\infty} a_k = A$.

Poznámka 9.5.6. Podle Lemmatu o konvergenci aritmetických průměrů (Lemma 9.5.1) je každá konvergentní řada cesarovsky sčítatelná a součty v obou smyslech jsou totožné.

Poznámka 9.5.7. Metoda aritmetických průměrů se dá iterovat. Pro posloupnost $\{a_k\}$ definujeme (použijeme trochu odlišné značení od definice)

$$s_n^0 := s_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad s_n^1 := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k^0, \quad s_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k^1, \quad \dots$$

(pozor, horní index není mocnina). Řadu $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ nazveme (C, r) -sčítatelnou, jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^r \in \mathbb{R}$. Pak píšeme $(C, r) \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n^r$. Je-li řada (C, r) -sčítatelná, je i (C, s) -sčítatelná pro každé $s \geq r$ (podle Lemmatu o konvergenci aritmetických průměrů, tedy Lemmatu 9.5.1). Tato implikace se nedá obrátit.

Příklad 9.5.8. Položme $\{a_k\} = \{1, -2, 3, -4, 5, \dots\}$. Pak posloupnost částečných součtů je $\{s_k\} = \{s_k^0\} = \{1, -1, 2, -2, 3, \dots\}$, a proto $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ nekonverguje (klasická konvergence je totéž, co $(C, 0)$ -sčítatelnost). Dále máme $\{s_k^1\} = \{1, 0, \frac{2}{3}, 0, \frac{3}{5}, \dots\}$. Cesarovské součty (podle definice) řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ také nekonvergují. Povšimneme-li si však, že pro každé $m \in \mathbb{N}$ platí $s_{2m}^1 = 0$ a $s_{2m-1}^1 = \frac{m}{2m-1} \rightarrow \frac{1}{2}$, plyne odsud, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^2 = \frac{1}{4}, \quad \text{a proto} \quad (C, 2) \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \frac{1}{4}.$$

9.6 Dodatek 1: kondenzační kritérium

Někdy se používá ještě následující kritérium, zejména v případě, kdy se teorie číselných řad vykládá dříve než teorie integrálu.

Věta 9.6.1 (Lobačevského kondenzační kritérium). *Nechť $\{a_k\} \subset [0, \infty)$ je nerostoucí posloupnost. Pak*

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konverguje} \iff \sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konverguje.}$$

Důkaz. Implikace „ \Leftarrow “ plyne z odhadu (používáme monotonii)

$$(a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \dots \leq 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \dots$$

Implikace „ \Rightarrow “ plyne z odhadu (opět používáme monotonii)

$$\begin{aligned} (a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6 + a_7 + a_8) + \dots &\geq a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \dots \\ &= \frac{1}{2} (2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \dots). \end{aligned}$$

□

Příklad 9.6.2. (i) Konvergence řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ je podle Lobačevského kritéria ekvivalentní konvergenci řady

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^\alpha} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2^k)^{\alpha-1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2^{\alpha-1})^k},$$

což nastává právě tehdy, když $\alpha > 1$.

(ii) Konvergence řady $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log^\alpha k}$ je podle Lobačevského kritéria ekvivalentní (připomeňme, že konečný počet členů není schopen ovlivnit konvergenci, proto nám stačí monotonie od jistého $k_0 \in \mathbb{N}$) konvergenci řady

$$\sum_{k=2}^{\infty} 2^k \frac{1}{2^k \log^\alpha(2^k)} = \log^{-\alpha}(2) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$$

a opět dostáváme nám již známý výsledek.

Poznámka 9.6.3. (i) Pokud bychom předchozí příklad zkoumali z pohledu Integrálního kritéria (Věta 9.2.5), zjistili bychom, že Lobačevského kritérium (Věta 9.6.1) vlastně jen pod integrálem provádí logaritmickou substituci.

(ii) Lobačevského kritérium nám podobně jako Integrální kritérium umožní určit konvergenci několika důležitých (a obtížných) řad. Na druhou stranu si neporadí s řadami, kde není předpis pro a_k velice jednoduchý.

(iii) Zhruba se dá říci, že je jedno, které ze dvojice Integrální a Lobačevského kritérium ovládáme, obě zaberou na důležité řady typů $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log^\alpha k}$, atd. Vyšetřením konvergence těchto řad obě kritéria splnila svou úlohu a už je s největší pravděpodobností čtenář nikdy nevyužije.

(iv) Lobačevského kritérium by se dalo přeformulovat a dokázat rovněž pro pomocnou řadu $\sum_{k=1}^{\infty} 3^k a_{3^k}$. Nic nového bychom tím ovšem nezískali, stále by se jednalo o ekvivalent jedné logaritmické substituce pod integrálem. Skutečný přínos přináší teprve iterování Lobačevského kritéria, tedy například

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konverguje} \iff \sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konverguje} \iff \sum_{k=1}^{\infty} 2^k 2^{2^k} a_{2^{2^k}} \text{ konverguje}.$$

Zde jsme provedli operaci odpovídající dvěma logaritmickým substitucím.

9.7 Dodatek 2: nekonečné součiny

Nechť $\{p_k\} \subset (0, \infty)$ je posloupnost. Symbol $\prod_{k=1}^{\infty} p_k$ nazýváme *nekonečným součinem*. K jeho vyčíslení definujeme $P_n = p_1 p_2 \dots p_n$. Nekonečný součin nazveme

konvergentní, jestliže existuje vlastní nenulová $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n =: P$. Pak píšeme

$$\prod_{k=1}^{\infty} p_k := P.$$

Věta 9.7.1 (Nutná podmínka konvergence). *Nechť posloupnost $\{p_k\} \subset (0, \infty)$ a nechť $\prod_{k=1}^{\infty} p_k$ konverguje. Pak $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$.*

Důkaz. Jestliže $\prod_{k=1}^{\infty} p_k$ konverguje, máme

$$p_{k+1} = \frac{P_{k+1}}{P_k} \rightarrow \frac{P}{P} = 1.$$

□

Poznámka 9.7.2. Vynechání, přidání či změna konečného počtu činitelů neovlivní konvergenci nekonečného součinu.

Pokud $P_n \rightarrow P \in (0, \infty)$, máme ze spojitosti funkce \log

$$\begin{aligned} \log P &= \log\left(\lim_{n \rightarrow \infty} P_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(P_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \log(p_1 \dots p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \log p_k = \sum_{k=1}^{\infty} \log p_k, \end{aligned}$$

tedy $\sum_{k=1}^{\infty} \log p_k$ konverguje. Tato implikace se dá zřejmě otočit. Existuje ale ještě jednodušší charakterizace konvergence nekonečného součinu, v níž pracujeme s $u_k := p_k - 1 \in (-1, \infty)$.

Věta 9.7.3 (Charakterizace konvergence nekonečného součinu). *Nechť posloupnost $\{u_k\} \subset (0, \infty)$ nebo $\{u_k\} \subset (-1, 0)$. Pak nekonečný součin $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + u_k)$ konverguje právě tehdy, když konverguje řada $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$.*

Důkaz. Nejprve si povšimněme, že díky tomu, že $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$, existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\frac{1}{2} \leq \frac{\log(1+x)}{x} \leq 2 \quad \text{pro } x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}.$$

V dalším uvažujeme případ $\{u_k\} \subset (0, \infty)$. Dokažme implikaci „ \Rightarrow “. Pokud konverguje $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + u_k)$, z nutné podmínky konvergence součinu dostáváme $u_k \rightarrow 0$. Proto $u_k < \delta$ od jistého $k_0 \in \mathbb{N}$. Navíc jsme si výše ukázali, že $\sum_{k=1}^{\infty} \log(1 + u_k)$ konverguje. Celkově

$$-\infty < \frac{1}{2} \sum_{k=k_0}^{\infty} \log(1 + u_k) \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} u_k \leq 2 \sum_{k=k_0}^{\infty} \log(1 + u_k) < \infty.$$

Protože konvergence řady nezávisí na chování konečného počtu členů, máme konvergenci $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$.

Dokažme nyní implikaci „ \Leftarrow “. Pokud konverguje $\sum_{k=k_0}^{\infty} u_k$, z nutné podmínky konvergence řady dostáváme, že $u_k < \delta$ od jistého $k_0 \in \mathbb{N}$. Důkaz dokončíme pomocí nerovností

$$-\infty < \frac{1}{2} \sum_{k=k_0}^{\infty} u_k \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} \log(1 + u_k) \leq 2 \sum_{k=k_0}^{\infty} u_k < \infty.$$

V případě $\{u_k\} \subset (-1, 0)$ postupujeme podobně. \square

Příklad 9.7.4 (Cantorovo discontinuum kladné délky). V šesté kapitole z prvního dílu skript věnované hlubším vlastnostem spojitých a diferencovatelných funkcí jsme si představili Cantorovo discontinuum $C \subset [0, 1]$. Získali jsme jej tak, že jsme z intervalu $[0, 1]$ nejprve vynechali prostřední třetinu. V dalším kroku vynecháme prostřední třetinu v každém ze vzniklých podintervalů a takto pokračujeme dále. Získáme neprázdnou množinu C (například $0, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ leží v C). Dá se nahlédnout, že každý bod této množiny se dá ztotožnit s nekonečnou posloupností nul a jedniček. Množina C je tedy nespočetná a má stejnou mohutnost jako $[0, 1]$. Na druhou stranu vzniklá množina je v jistém smyslu velice malá, neboť v každém okolí libovolného bodu z $[0, 1]$ najdeme otevřený interval, který má s C prázdný průnik (srovnejte s racionálními čísly, která mají s každým otevřeným intervalem neprázdný průnik, třebaže jsou spočetná). Navíc celková délka vynechaných intervalů je

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{3} + \cdots = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

Pokud bychom nevynechávali prostřední třetinu, ale interval délky $q \in (0, 1)$, dostali bychom stejné vlastnosti, neboť

$$q + (1 - q)q + (1 - q)^2 q + \cdots = q \sum_{k=0}^{\infty} (1 - q)^k = q \frac{1}{1 - (1 - q)} = 1.$$

Podívejme se na věc nyní trochu jinak, po k -tém kroku má ořezaná množina celkovou délku q^n . Pokud budeme v jednotlivých krocích vhodně měnit délku vynechaných částí, můžeme dostat odlišný výsledek. Skutečně, protože například $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ konverguje, konverguje rovněž nekonečný součin $\prod_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$. Pokud tedy v prvním kroku vynecháme prostřední čtvrtinu intervalu $[0, 1]$, ve druhém kroku prostřední devětinu vzniklých intervalů, atd., získáme Cantorovo discontinuum kladné délky.

Kapitola 10

Mocninné řady

V následujícím textu se budeme zabývat zobecněním Taylorových rozvoju re-
spektive Taylorových řad. Bude nás zajímat, na jakých množinách studované
řady konvergují, ale i hlubší výsledky, jako jsou rovnosti typu $(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k)' =$
 $\sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^{k-1}$. Tyto rovnosti neplynou z aritmetiky derivace (ta si v kombinaci s
matematickou indukcí poradí jen s konečnými součty), dokonce ani nemají šanci
platit obecně pro řady funkcí, jak si později ukážeme v kapitole o stejnoměrné
konvergenci.

V celé kapitole budeme pracovat především v komplexním oboru. Pozname-
nejme, že v komplexním oboru absolutní konvergenci definujeme jako konvergenci
řady (komplexních) velikostí jejích členů. Snadno se ověří, že absolutní konvergence
opět implikuje konvergenci.

10.1 Základní vlastnosti mocninných řad

Definice 10.1.1 (Mocninná řada). Necht' $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ a $z_0 \in \mathbb{C}$. Pak řadu

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

nazýváme *mocninnou řadou se středem* z_0 . Čísla a_k nazýváme *koeficienty* mocninné
řady.

Často je výhodné použít přeznačení $w := z - z_0$, které vede na mocninnou řadu
se středem v počátku (a hlavně s jednodušším zápisem). Proto nám stačí veškeré
výsledky formulovat pro řady se středem v počátku. Pro $\varrho > 0$ a $z_0 \in \mathbb{C}$ budeme
značit

$$B_{\varrho}(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varrho\} \quad \text{a} \quad B_{\varrho} := B_{\varrho}(0) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < \varrho\}.$$

Věta 10.1.2 (O konvergenci mocninné řady). Necht' $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$. Položme

$$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \quad \text{s konvencí } \frac{1}{0} = \infty \text{ a } \frac{1}{\infty} = 0.$$

Pak

- (i) řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ konverguje absolutně na B_R
- (ii) řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ nekonverguje na $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$
- (iii) existuje-li $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, pak se rovná R
- (iv) existuje-li $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$, pak se rovná $\frac{1}{R}$.

Důkaz. Část (iv) je zřejmá a část (i) snadno plyne z odmocninového kritéria. Dokažme (ii) v případě $R \in (0, \infty)$. V tomto případě pišme $|z| = (1 + \delta)R$, kde $\delta > 0$, a máme

$$|a_k z^k| = |a_k| |z|^k = \left((1 + \delta) \frac{\sqrt[k]{|a_k|}}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \right)^k.$$

Z definice veličiny \limsup musí být vnitřek závorky větší než 1 pro nekonečně mnoho indexů. Je tedy porušena nutná podmínka konvergence. Pro $R = \infty$ není co dokazovat a pokud $R = 0$, pro každé $z \neq 0$ najdeme nekonečně mnoho indexů, kde $\sqrt[k]{|a_k|} \geq \frac{1}{|z|}$, což opět vede na porušení nutné podmínky.

Dokažme zbývající část (iii). Položme $r := \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$. Pro zafixované $z \in \mathbb{C}$ pak máme

$$\frac{|a_{k+1} z^{k+1}|}{|a_k z^k|} = \frac{|z|}{\left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{|z|}{r}.$$

Podle podílového kritéria naše řada konverguje absolutně pro $|z| < r$, naopak pro $|z| > r$ absolutně konvergovat nemůže. Podle výsledků (i) a (ii) tedy máme $r = R$. \square

Definice 10.1.3 (Poloměr konvergence mocninné řady). Číslo $R \in [0, \infty]$ z minulé věty se nazývá *poloměr konvergence* mocninné řady $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$.

Poznámka 10.1.4. Předchozí věta nic neříká o konvergenci pro $|z| = R$. Situace se zde liší případ od případu.

Příklad 10.1.5. (i) Řada $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ má $R = 1$ ($\forall k \in \mathbb{N} \quad \sqrt[k]{a_k} = 1$) a pro $|z| = 1$ je vždy porušena nutná podmínka konvergence.

(ii) Řada $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ má $R = 1$ ($\frac{a_k}{a_{k+1}} \rightarrow 1$) a pro $|z| = 1$ vždy absolutně konverguje, neboť

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z^k|}{k^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2} \in \mathbb{R}.$$

(iii) Řada $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k}$ má $R = 1$ ($\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow 1$). Pro $z = 1$ dostáváme harmonickou řadu. Pro $|z| = 1$, $z \neq 1$, dává Dirichletovo kritérium neabsolutní konvergenci (zde $z = e^{i\theta}$, kde $\theta \in (0, 2\pi)$, a $\{z^k\} = \{e^{i\theta k}\} = \{\cos(\theta k) + i \sin(\theta k)\}$ je geometrická posloupnost s omezenými částečnými součty).

(iv) Řada $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ má $R = \infty$, neboť $\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{(k+1)!}{k!} = k \rightarrow \infty$.

(v) Řada $\sum_{k=0}^{\infty} k! z^k$ má $R = 0$, neboť $\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{k!}{(k+1)!} = \frac{1}{k} \rightarrow 0$.

Nyní se budeme zabývat otázkou derivování mocninných řad. Budeme potřebovat verzi aritmetiky limit pro \limsup .

Cvičení 10.1.6. Necht $\{b_k\}, \{c_k\} \subset [0, \infty)$.

(i) Dokažte, že $\limsup_{k \rightarrow \infty} b_k c_k \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} b_k \limsup_{k \rightarrow \infty} c_k$, pokud má pravá strana smysl v \mathbb{R}^* .

(ii) Ukažte, že výše obecně neplatí rovnost.

(iii) Ukažte, že má-li alespoň jedna z posloupností limitu, platí rovnost.

Protože $\sqrt[k]{k} \rightarrow 1$ pro $k \rightarrow \infty$, z předchozího cvičení okamžitě dostáváme následující výsledek.

Lemma 10.1.7. Necht $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$. Mocninné řady $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}$ mají potom stejný poloměr konvergence.

Ještě potřebujeme jeden jednoduchý odhad.

Lemma 10.1.8. Necht $\alpha, \beta > 0$ a $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Pak

$$(\alpha + \beta)^k - \alpha^k - k\alpha^{k-1}\beta \leq \frac{k(k-1)(\alpha + \beta)^{k-2}}{2} \beta^2.$$

Důkaz. Definujme $f(x) = (\alpha + x)^k$. Pro odpovídající Taylorův polynom stupně 1 máme

$$T_1(\beta) = \alpha^k + k\alpha^{k-1}\beta$$

a pro Lagrangeův tvar zbytku R_2 v bodě β platí ($\xi \in (0, \beta)$)

$$R_2(\beta) = \frac{f''(\alpha + \xi)}{2!} \beta^2 = \frac{k(k-1)(\alpha + \xi)^{k-2}}{2} \beta^2 \leq \frac{k(k-1)(\alpha + \beta)^{k-2}}{2} \beta^2.$$

Odtud plyne dokazovaná nerovnost. \square

Věta 10.1.9 (Derivace mocninné řady). Necht $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$. Pak pro $x \in (-R, R)$, kde $R \geq 0$ je poloměr konvergence příslušné mocninné řady, platí

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}.$$

Důkaz. Provedeme přímé ověření definice derivace. Předpokládejme $R > 0$, jinak není co dokazovat. Zafixujme $x \in (-R, R)$ a $\delta < R - |x|$. Pak pro $h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ má podle aritmetiky konvergentních řad dobrý smysl veličina

$$\begin{aligned} \Psi(x, h) &:= \frac{\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x+h)^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k}{h} - \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \left(a_k \frac{(x+h)^k - x^k}{h} - k a_k x^{k-1} \right). \end{aligned}$$

Naším cílem je ukázat, že $\Psi(x, h) \rightarrow 0$ pro $h \rightarrow 0$. Použijme Lemma 10.1.8 a skutečnost, že $\sum_{k=2}^{\infty} k(k+1)|a_k|(|x| + \delta)^{k-2}$ konverguje (neboť $|x| + \delta < R$), tedy

Lemma 10.1.7. Potom

$$\begin{aligned}
|\Psi(x, h)| &= \frac{1}{|h|} \left| \sum_{k=2}^{\infty} a_k ((x+h)^k - x^k - kx^{k-1}h) \right| \\
&= \frac{1}{|h|} \left| \sum_{k=2}^{\infty} a_k \left(\binom{k}{2} x^{k-2} h^2 + \dots + \binom{k}{k} h^k \right) \right| \\
&\leq \frac{1}{|h|} \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| \left(\binom{k}{2} |x|^{k-2} |h|^2 + \dots + \binom{k}{k} |h|^k \right) \\
&= \frac{1}{|h|} \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| \left((|x| + |h|)^k - |x|^k - k|x|^{k-1}|h| \right) \\
&\leq \frac{1}{|h|} \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| \frac{k(k-1)(|x| + |h|)^{k-2}}{2} |h|^2 \\
&\leq \frac{1}{2} |h| \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| k(k-1) (|x| + \delta)^{k-2} = C|h| \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

□

Poznámka 10.1.10. Mohli bychom pokračovat indukcí s dalšími derivacemi a řadami $\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k x^{k-2}$, $\sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2)a_k x^{k-3}$, atd.

Důsledek 10.1.11. Každá mocninná řada na svém kruhu konvergence definuje nekonečněkrát spojitě diferencovatelnou funkci.

Mocninné řady můžeme na jejich kruhu konvergence rovněž integrovat.

Věta 10.1.12 (Integrace mocninné řady). *Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$.*

(i) *Pro $x \in \mathbb{R}$ ležící uvnitř konvergenčního kruhu platí*

$$\int \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + C.$$

(ii) *Jestliže $a, b \in (-R, R)$, kde R je poloměr konvergence řady $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, pak*

$$\begin{aligned}
(\mathcal{R}) \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx &= (\mathcal{N}) \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{N}) \int_a^b a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{R}) \int_a^b a_k x^k dx.
\end{aligned}$$

Důkaz. První část věty je jen důsledkem Věty o derivaci mocninné řady (Věta 10.1.9). Dokažme druhou část věty. Předpokládejme $a < b$ (pro $b < a$ pracujeme podobně, pro $a = b$ je důkaz triviální). První a třetí rovnost ve druhé části věty plynou z toho, že Riemannův a Newtonův integrál se pro omezené spojitě funkce

rovnají (pro rovnost nalevo spojitost plyne z diferencovatelnosti a omezenost plyne ze spojitosti na omezeném uzavřeném intervalu $[a, b]$). Nyní podle první části věty máme, že

$$F(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$$

je primitivní funkce k $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ na $(-R, R)$, a proto díky aritmetice konvergentních řad

$$\begin{aligned} (\mathcal{N}) \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx &= F(b) - F(a) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (b^{k+1} - a^{k+1}) = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{N}) \int_a^b a_k x^k dx. \end{aligned}$$

□

Příklad 10.1.13. Sečtěme mocninnou řadu $\sum_{k=1}^{\infty} kx^k$. Poloměr konvergence je roven jedné, proto budeme pracovat na intervalu $(-1, 1)$. Platí

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = x \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = x \sum_{k=1}^{\infty} (x^k)' = x \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

Odtud

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = x \frac{1 \cdot (1-x) - x \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2} \quad \text{pro } x \in (-1, 1).$$

Příklad 10.1.14. Sečtěme řadu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{2^k}$. Povšimněme si, že výsledek získáme dosazením $x = \frac{1}{2}$ do mocniné řady $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k$ s poloměrem konvergence rovným jedné. Na intervalu $(-1, 1)$ proto platí (využijeme výsledek předchozího příkladu)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k &= x \sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = x \sum_{k=1}^{\infty} (kx^k)' = x \left(\sum_{k=1}^{\infty} kx^k \right)' = x \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' \\ &= x \frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

Odtud

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{2^k} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = 6.$$

Příklad 10.1.15. Sečtěme řadu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{k}$. Poloměr konvergence je roven jedné a na $(-1, 1) \setminus \{0\}$ platí

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{k} &= \frac{1}{x} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = \frac{1}{x} \sum_{k=1}^{\infty} \int x^{k-1} dx = \frac{1}{x} \int \sum_{k=1}^{\infty} x^{k-1} dx = \frac{1}{x} \int \frac{1}{1-x} dx \\ &= \frac{1}{x} \left(-\log(1-x) + C \right) = -\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{C}{x}. \end{aligned}$$

Protože funkce úplně nalevo se v počátku rovná jedné, musí jít funkce napravo spojitě dodefinovat v počátku stejnou hodnotou. Odtud $C = 0$ a

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{k} = \begin{cases} -\frac{\log(1-x)}{x} & \text{pro } x \in (-1, 1) \setminus \{0\} \\ 1 & \text{pro } x = 0. \end{cases}$$

10.2 Vztah mezi mocninnými a Taylorovými řadami

V kapitole o hlubších vlastnostech spojitých a diferencovatelných funkcí jsme si u několika elementárních funkcí zkonstruovali nekonečné Taylorovy rozvoje, které měly tvar mocninné řady. Zde si postupně ukážeme, že každá mocninná řada je uvnitř svého konvergenčního kruhu Taylorovým rozvojem nějaké nekonečněkrát diferencovatelné funkce (v předchozím textu jsme již získali nekonečnásobnou diferencovatelnost, nyní nás už zajímá jen shoda s Taylorovým rozvojem).

Definice 10.2.1 (Taylorova řada). Necht' $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je nekonečněkrát diferencovatelná v $x_0 \in \mathbb{R}$. Pak řadu

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

nazveme *Taylorovou řadou* funkce f v bodě x_0 .

Příklad 10.2.2. (i) V kapitole o Taylorových rozvojech jsme si ukázali, že $\log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$ na $(-1, 1]$.

(ii) Funkce $x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$ dodefinovaná nulou v počátku je nekonečněkrát diferencovatelná na \mathbb{R} a má v počátku všechny derivace nulové. Odpovídající Taylorova řada v počátku se s původní funkcí shoduje jen v počátku.

Věta 10.2.3 (O vztahu mocninných a Taylorových řad). Necht' $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a existuje $\delta > 0$ takové, že mocninná řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ konverguje na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Pak je Taylorovou řadou svého součtu v bodě x_0 .

Důkaz. Podle Věty o derivaci mocninné řady (Věta 10.1.9) víme, že funkce $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ je C^∞ -funkce na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ pro jisté $\delta > 0$ a pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1)\dots(k-n+1)a_k(x-x_0)^{k-n} \quad \text{na } (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Odtud $f^{(n)}(x_0) = n!a_n$, proto $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Naše mocninná řada má tedy stejné koeficienty jako Taylorova řada. \square

Předchozí věta nám umožňuje hledat Taylorovy řady i jinými metodami, než je postupné derivování zadané funkce. To si teď ukážeme na příkladech.

Příklad 10.2.4. (i) Platí

$$(\log(1+x))' = \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k \quad \text{na } (-1, 1).$$

Odtud s využitím $\log(1+0) = 0$

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C \stackrel{\log(1+0)=0}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad \text{na } (-1, 1).$$

Na zkoumání vztahu součtu řady a funkce $\log(1+x)$ na konvergenční kružnici (v kapitole o Taylorových rozvojech jsme rovněž uvažovali $x=1$) nám zatím teorie mocninných řad nedává žádné nástroje.

(ii) Platí

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k \quad \text{na } (-1, 1).$$

Odtud s využitím $\arctan 0 = 0$

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + C = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad \text{na } (-1, 1).$$

(iii) Najdeme ještě rozvoj funkce $\log(1+x)$ v bodě $x_0 > 0$. Máme

$$\begin{aligned} (\log(1+x))' &= \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x_0+x-x_0} = \frac{1}{1+x_0} \frac{1}{1+\frac{x-x_0}{1+x_0}} \\ &= \frac{1}{1+x_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{x-x_0}{1+x_0}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1+x_0)^{k+1}} (x-x_0)^k \end{aligned}$$

a pro poloměr konvergence platí $R = 1+x_0$. Odtud

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1+x_0)^{k+1}} \frac{1}{k+1} (x-x_0)^{k+1} + \log(1+x_0) \quad \text{pro } |x-x_0| < 1+x_0.$$

Taylorovy řady se také dají získat z již známých Taylorových řad pomocí aritmetických operací a skládání.

Věta 10.2.5 (Aritmetika Taylorových řad). *Nechť posloupnosti $\{a_k\}, \{b_k\} \subset \mathbb{R}$ a mocninné řady $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ a $g(x) := \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$ konvergují na jistém okolí počátku. Pak existuje okolí počátku, kde platí*

(i) $(f+g)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k$

(ii) $(fg)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^k a_m b_{k-m}\right) x^k$

(iii) *jestliže $a_0 = 0$, pak $g(f(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} d_k x^k$, kde*

$$d_k = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{N}_0 \\ k_1 + k_2 + \dots + k_n = k}} a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n}.$$

Důkaz. První část plyne z aritmetiky řad. Druhá část plyne z Cauchyovy věty o součinu řad (Věta 9.4.12), neboť každá z našich řad je absolutně konvergentní uvnitř svého kruhu konvergence. Dokažme část (iii). Funkce f má nulovou hodnotu v počátku a je tam spojitá. Proto pro dostatečně malá $|x|$ platí (používáme vícenásobně Cauchyovu větu o součinu řad)

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{k_1=0}^{\infty} \sum_{k_2=0}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=0}^{\infty} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_n} x^{k_1+k_2+\cdots+k_n} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_n=m}} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_n} x^m \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{N}_0 \\ k_1+k_2+\cdots+k_n=m}} a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_n} \right) x^m. \end{aligned}$$

□

Výše jsme si dokázali, že mocninné řady na svém kruhu konvergence definují C^∞ -funkce. Výše jsme si také uvedli C^∞ -funkce, které se mocninnou řadou vyjádřit nedají. To nás vede k definici následující podmnožiny množiny všech C^∞ -funkcí.

Definice 10.2.6 (Reálně analytické funkce). Nechť $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že f je *reálně analytická* na I , jestliže se dá na okolí každého bodu I vyjádřit Taylorovou řadou se středem v tomto bodě.

Poznámka 10.2.7. Podle předchozí věty jsou součty a součiny reálně analytických funkcí opět reálně analytické.

Na závěr si ještě uvedme důležitou větu o konvergenci na konvergenční kružnici, kterou si dokážeme později (v kapitole o stejnoměrné konvergenci).

Věta 10.2.8 (Abelova věta). Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$ a příslušná mocninná řada $f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ má poloměr konvergence $R \in (0, \infty)$. Je-li $\varphi \in [0, 2\pi)$ takové, že pro $z = Re^{i\varphi}$ konverguje řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$, pak $t \mapsto f(te^{i\varphi})$ je spojitá na $[0, R]$.

Poznámka 10.2.9. Abelova věta se používá tak, že (je-li to možné) sečteme mocninnou řadu uvnitř konvergenčního kruhu a s výsledkem dokonvergujeme do bodu na konvergenční kružnici, v němž mocninná řada konverguje.

Příklad 10.2.10. (i) Sečteme řadu $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$. Podle Leibnizova kritéria (Věta 9.1.21) se jedná o konvergentní řadu. Zároveň $S = f(1)$, kde

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} \quad \text{na } (-1, 1] \quad \text{a} \quad f(x) = \log(1+x) \quad \text{na } (-1, 1)$$

(k aplikaci Abelovy věty v našem případě stačí umět mocninnou řadu sečíst jen pro reálné argumenty v nějakém levém prstencovém okolí bodu 1). Podle Abelovy věty dostáváme

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \log(1+x) = \log 2.$$

(ii) Sečtěme řadu $S := \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1}$. Podle Dirichletova kritéria se jedná o konvergentní řadu. Zároveň $S = f(1)$, kde

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad \text{na } (-1, 1] \quad \text{a} \quad f(x) = \arctan x \quad \text{na } (-1, 1).$$

Podle Abelovy věty dostáváme

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

10.3 Řešení diferenciálních rovnic pomocí řad

Mocninné řady se dají někdy použít při řešení diferenciálních rovnic. Používáme metodu neurčitých koeficientů.

Příklad 10.3.1. Řešme pro jednoduchost počáteční úlohu $y' = y$, $y(0) = 1$. Hledejme řešení ve tvaru $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. Dosazením dostáváme (pokud lze hledanou funkci vyjádřit pomocí mocninné řady s jistým kruhem konvergence, lze ji tam i derivovat člen po členu)

$$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Zároveň máme

$$1 = y(0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k 0^k = a_0,$$

a proto porovnáváním koeficientů u jednotlivých mocnin (podle Věty o vztahu mocninných a Taylorových řad, tedy Věty 10.2.3, musí být stejné) postupně dostáváme $a_k = \frac{1}{k!}$ pro všechna $k \in \mathbb{N}_0$. Odtud

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \text{na } \mathbb{R},$$

neboť poloměr konvergence u naší řady splňuje $R = \infty$. Tedy jak již víme, $y(x) = e^x$.

Příklad 10.3.2 (Besselova rovnice). Nechť $n \in \mathbb{N}_0$. Řešme úlohu $x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2) y = 0$. Hledejme řešení ve tvaru $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. Dosazením dostáváme

$$a_0(-n^2) + a_1(1 - n^2)x + \sum_{k=2}^{\infty} (a_k k(k-1) + a_k k - n^2 a_k + a_{k-2}) x^k = 0.$$

Odtud porovnáním koeficientů u jednotlivých mocnin

$$n^2 a_0 = 0, \quad (1 - n^2) a_1 = 0 \quad \text{a} \quad (k^2 - n^2) a_k + a_{k-2} = 0 \quad \text{pro všechna } k \geq 2.$$

V případě $n = 0$, volíme jako počáteční podmínku $a_0 = y(0)$. Dále vyjde $a_{2m-1} = 0$ a $a_{2m} = -\frac{a_{2m-2}}{(2m)^2}$, kdykoliv $m \in \mathbb{N}$. Odtud

$$y(x) = a_0 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}.$$

Pokud $n = 1$, dostáváme $a_0 = 0$ a a_1 volíme jako počáteční podmínku. Dále vyjde $a_{2m} = 0$ a $a_{2m+1} = -\frac{a_{2m-1}}{(2m+1)^2 - 1}$ pro všechna $m \in \mathbb{N}$. Proto z rovnosti

$$(2m+1)^2 - 1 = 4m^2 + 4m = 4m(m+1)$$

dostáváme

$$y(x) = 2a_1 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{1+2m}.$$

Pro $n \geq 2$ vyjde $a_0 = a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$ a a_n volíme jako počáteční podmínku. Dále vyjde $a_{n+2m-1} = 0$ a $a_{n+2m} = -\frac{a_{n+2m-2}}{(2m+n)^2 - n^2}$. Proto z rovnosti

$$(2m+n)^2 - n^2 = 4m^2 + 4mn = 4m(m+n)$$

dostáváme

$$y(x) = n! 2^n a_n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}.$$

Pokud volíme pro $n \in \mathbb{N}_0$ hodnotu $a_n = \frac{1}{n! 2^n}$, dostáváme kanonický tvar Besselových funkcí 1. druhu.

10.4 Zavedení funkcí sin, cos a exp

V kapitole o elementárních funkcích jsme zůstali dlužni důkazy následujících dvou vět.

Věta 10.4.1 (O funkcích sin a cos). *Existují právě dvě funkce $\sin, \cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a jediné iracionální číslo π tak, že platí*

- (i) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- (ii) $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- (iii) $\sin(-x) = -\sin x$ a $\cos(-x) = \cos x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- (iv) \sin je rostoucí na $[0, \frac{\pi}{2}]$
- (v) $\sin 0 = 0$ a $\sin \frac{\pi}{2} = 1$
- (vi) $\sin'(0) = 1$.

Věta 10.4.2 (O exponenciále). *Existuje právě jedna funkce $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ taková, že*

- (i) $\exp(z_1 + z_2) = \exp z_1 \exp z_2 \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$
- (ii) $\exp(x + iy) = \exp x (\cos y + i \sin y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- (iii) $\exp 0 = 1$
- (iv) *restrikce funkce \exp na \mathbb{R} (reálná funkce) je rostoucí a jejím oborem hodnot je $(0, \infty)$*
- (v) *restrikce funkce \exp na \mathbb{R} splňuje $\exp' x = \exp x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.*

Společný důkaz pro obě věty. Krok 1: definice funkcí

Definujeme funkce z \mathbb{C} do \mathbb{C} předpisy

$$\exp z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \text{a} \quad \cos z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}.$$

Všechny tři řady mají poloměr konvergence roven nekonečnu, proto jsou všechny tři funkce definované na celém \mathbb{C} .

Krok 2: vztahy mezi funkcemi

Z definice funkce \exp máme pro každé $z \in \mathbb{C}$

$$\exp(iz) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{z^{2m}}{(2m)!} + i \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{z^{2m+1}}{(2m+1)!} = \cos z + i \sin z$$

a

$$\exp(-iz) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iz)^k}{k!} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{z^{2m}}{(2m)!} - i \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{z^{2m+1}}{(2m+1)!} = \cos z - i \sin z.$$

Odtud

$$\cos z = \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2} \quad \text{a} \quad \sin z = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i}.$$

Krok 3: součtové vzorce

Podle Cauchyovy věty o součinu řad (rozmyslete si, že platí i v komplexním případě) máme pro libovolná $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} \exp(z_1) \exp(z_2) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_1^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z_2^j}{j!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n \frac{z_1^j z_2^{n-j}}{j!(n-j)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} z_1^j z_2^{n-j} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z_1 + z_2)^n = \exp(z_1 + z_2). \end{aligned}$$

Odtud pro $x, y \in \mathbb{R}$

$$\exp(x + iy) = \exp x \exp(iy) = \exp x (\cos y + i \sin y).$$

Dále

$$\begin{aligned} \cos(x + y) + i \sin(x + y) &= \exp(i(x + y)) = \exp(ix) \exp(iy) \\ &= (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y). \end{aligned}$$

Roznásobením pravé strany poslední rovnosti a porovnáním reálné a imaginární složky dostáváme součtové vzorce pro sinus a kosinus.

Krok 4: zbylé vlastnosti sinu a kosinu

Přímo z předpisu dostáváme sudost kosinu, lichost sinu, $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$. Derivací řady pro sinus člen po členu dostáváme $\sin' = \cos$ (speciálně $\sin' 0 = 1$). Dále

$$\begin{aligned} \cos 2 &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} - \frac{2^6}{6!} + \dots \\ &\leq 1 - \frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} \left(1 + \frac{2^2}{5 \cdot 6} + \frac{2^4}{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} + \dots \right) \\ &\leq 1 - \frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} \left(1 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^4 + \dots \right) = 1 - 2 + \frac{16}{24} \frac{1}{1 - \frac{4}{25}} \\ &= -1 + \frac{16}{24} \frac{25}{21} < 0. \end{aligned}$$

Podle Darbouxovy věty o nabývání mezihodnot (Věta 6.2.1) proto interval obsahuje alespoň jeden nulový bod funkce kosinus. Nejmenší z nich (minimum existuje díky spojitosti) označme $\frac{\pi}{2}$. Hned také dostáváme, že sinus je rostoucí na $[0, \frac{\pi}{2}]$. Konečně, volba $x = -y$ v součtovém vzorci pro kosinus dává

$$1 = \cos 0 = \cos^2 x + \sin^2 x.$$

Odtud a z vlastnosti $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ dostáváme $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Krok 5: jednoznačnost sinu a kosinu (na \mathbb{R})

Z šesti vlastností sinu a kosinu uvedených ve větě jsme v kapitole o elementárních funkcích odvodili další vlastnosti, které nám později daly Taylorovy rozvoje

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \text{a} \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

Tyto řady mají jednoznačně určené součty.

Krok 6: zbylé vlastnosti exponenciály

Vlastnost $\exp 0 = 1$ se získá dosazením. Zjevně také pro $x \in \mathbb{R}$ je $\exp x \in \mathbb{R}$. Vztah pro derivaci dostaneme derivováním mocninné řady člen po členu. Dále

$$\exp x = \exp \frac{x}{2} \exp \frac{x}{2} \geq 0,$$

proto je exponenciála nezáporná a proto také neklesající. Ze zápisu pomocí řady zřejmá plyne $\lim_{x \rightarrow \infty} \exp x = \infty$, a protože

$$\exp 0 = \exp(x - x) = \exp x \exp(-x),$$

exponenciála se nule nerovná nikdy a máme $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0$. Pomocí Darbouxovy věty o nabývání mezihodnot (Věta 6.2.1) již snadno získáme dokazovaný obor hodnot.

Krok 7: jednoznačnost exponenciály

Jednoznačnost na \mathbb{C} plyne z vlastnosti (ii). Jednoznačnost na \mathbb{R} plyne díky stejnému argumentu jako pro funkce sinus a kosinus.

Krok 8: iracionalita čísla π

Pro spor předpokládejme, že $\pi = \frac{p}{q}$, kde $p, q \in \mathbb{N}$ (už víme, že $\pi > 0$). Pro každé $n \in \mathbb{N}$ definujeme funkci

$$f_n(x) = \frac{q^n}{n!} x^n (\pi - x)^n.$$

Máme

$$\begin{aligned} 0 < I_n &:= (\mathcal{R}) \int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx \leq (\mathcal{R}) \int_0^\pi f_n(x) \, dx = \frac{q^n}{n!} (\mathcal{R}) \int_0^\pi x^n (\pi - x)^n \, dx \\ &= \frac{q^n}{n!} (\mathcal{R}) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (t + \frac{\pi}{2})^n (\frac{\pi}{2} - t)^n \, dt = \frac{q^n}{n!} (\mathcal{R}) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{\pi^2}{4} - t^2)^n \, dt \\ &= 2 \frac{q^n}{n!} (\mathcal{R}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{\pi^2}{4} - t^2)^n \, dt \leq \pi \frac{q^n}{n!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Speciálně existuje $n \in \mathbb{N}$ tak, že $0 < I_n < 1$.

Na druhou stranu, f_n je polynom stupně $2n$. Integrál I_n lze počítat $(2n+1)$ -násobnou aplikací per partes a s využitím $\sin 0 = \sin \pi = 0$, $1 = \cos 0 = -\cos \pi$ a $f_n(x) = f_n(\pi - x)$ (odtud $f_n^{(k)}(\pi) = (-1)^k f_n^{(k)}(0)$) dostáváme

$$\begin{aligned} I_n &= [-f_n(x) \cos x]_0^\pi + (\mathcal{R}) \int_0^\pi f_n' \cos x \, dx \\ &= [-f_n(x) \cos x]_0^\pi + [f_n'(x) \sin x]_0^\pi - (\mathcal{R}) \int_0^\pi f_n'' \sin x \, dx \\ &= \dots = [-f_n(x) \cos x]_0^\pi - [-f_n''(x) \cos x]_0^\pi + \dots + (-1)^n [-f_n^{(2n)}(x) \cos x]_0^\pi \\ &= 2f_n(0) - 2f_n''(0) + 2f_n^{IV}(0) + \dots + 2(-1)^n f_n^{(2n)}(0). \end{aligned}$$

Spor získáme tak, že ukážeme, že všechna čísla na posledním řádku jsou celá (odtud $I_n \in \mathbb{Z}$ a nemůže platit výše dokázané $0 < I_n < 1$). Podle Leibnizova pravidla máme

$$f^{(k)}(x) = \frac{q^n}{n!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (x^n)^{(j)} ((\pi - x)^n)^{(k-j)}.$$

Protože navíc

$$(x^n)^{(j)} \equiv 0 \quad \text{pro } j > n, \quad (x^n)^{(n)} \equiv n! \quad \text{a} \quad (x^n)^{(j)} = Cx^{n-j} \quad \text{pro } j < n$$

(v posledním případě po dosazení nuly dostaneme nulu), jediný nenulový člen v $f^{(k)}(0)$ je tedy (vyskytuje se jen pro $n \leq k \leq 2n$)

$$\frac{q^n}{n!} \binom{n}{n} n! \pi^n = q^n \left(\frac{p}{q}\right)^n \in \mathbb{N} \quad \text{pro } k = n,$$

respektive pro $n < k \leq 2n$

$$\begin{aligned} \frac{q^n}{n!} \binom{k}{n} n! n(n-1) \dots (n - (k-n) + 1) \pi^{n-(k-n)} \\ = q^n \binom{k}{n} n(n-1) \dots (2n-k+1) \left(\frac{p}{q}\right)^{2n-k} \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

(mocnina čísla q je kladná, neboť $n < k \leq 2n$ implikuje $2n - k < n$). Tím jsme získali požadovaný spor a důkaz je dokončen. \square

10.5 Dodatek: derivace mocninné řady podle komplexní proměnné

Pokud rozšíříme pojem derivace na funkce komplexní proměnné, můžeme zesílit výsledky obdržené v předchozí sekci.

Definice 10.5.1. [Derivace funkce podle komplexní proměnné] Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ a $z \in \mathbb{C}$. Řekneme, že funkce f má v bodě z derivaci $A \in \mathbb{C}$, jestliže

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = A.$$

Pak píšeme $f'(z) = A$.

Poznámka 10.5.2. (i) Limita v komplexním oboru je opět definována za pomocí okolí (tedy $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad z \in \mathcal{P}_\delta(z_0) \Rightarrow f(z) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$) a ještě připomeňme, že pro $z_0 \in \mathbb{C}$ jsme definovali $\mathcal{P}_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < \delta\}$ a $\mathcal{U}_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \delta\}$.

(ii) V komplexním oboru nezavádíme nevlastní derivaci (podobně jako jsme nezaváděli nevlastní parciální derivace).

(iii) Pro komplexní derivaci se dají dokazovat podobné výsledky jako pro derivaci reálnou, například aritmetika derivace. Ovšem pozor na absenci uspořádání na \mathbb{C} .

(iv) Rozmyslete si, že má-li komplexní funkce reálnou derivaci v bodě s nulovou imaginární složkou, má i restrikce naší funkce na reálnou osu v odpovídajícím bodě stejnou derivaci.

Příklad 10.5.3. (i) Pokud $f(z) = z$, máme

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z+h-z}{h} = 1.$$

(ii) Pokud $f(z) = z^2$, máme

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z^2 + 2hz + h^2 - z^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2z + \lim_{h \rightarrow 0} h = 2z.$$

(iii) Pokud $f(z) = z^n$, kde $n \in \mathbb{N}$, analogicky jako výše dostáváme $f'(z) = nz^{n-1}$.

(iv) Rovnost $(x^2)' = 2x$ plyne z rovnosti $(z^2)' = 2z$.

Připomeňme, že Lemma 10.1.7 platí i pro komplexní případ, proto také Větu 10.1.9 lze formulovat i pro komplexní případ.

Věta 10.5.4 (Derivace mocninné řady). *Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$. Pak uvnitř konvergenčního kruhu platí*

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}.$$

Důkaz lze provést analogicky reálnému případu.

Cvičení 10.5.5. Provedte důkaz Věty 10.5.4 podrobně.

Cvičení 10.5.6. Ukažte, že ve smyslu Definice 10.5.1 platí $(\exp z)' = \exp z$, $(\sin z)' = \cos z$ a $(\cos z)' = -\sin z$.

Kapitola 11

Metrické prostory

V předchozích kapitolách jsme se (poměrně úspěšně) zabývali budováním teorie reálných funkcí jedné reálné proměnné. Podobnou teorii bychom měli rádi k dispozici i ve složitějších případech, jako jsou funkce více proměnných, či pro zobrazení, která přiřazují reálné číslo prvkům z vhodné množiny funkcí. Posledně jmenovaný případ má uplatnění například v teorii deformací či v některých pokročilých postupech řešení parciálních diferenciálních rovnic. Vzpomeňme si také na starověkou úlohu o brachystochroně, která vyžaduje takto obecný přístup. Základním pojmem v diferenciálním počtu je limita, která se neobejde bez pojmu okolí a ten zase používá pojem vzdálenosti (v \mathbb{R} nám takto sloužila absolutní hodnota). Připomeňme si eukleidovskou vzdálenost na \mathbb{R}^N , se kterou jsme již několikrát pracovali. Ta se pro $x, y \in \mathbb{R}^N$ definuje předpisem

$$\varrho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_N - y_N)^2}.$$

Pro všechna $x, y, z \in \mathbb{R}^N$ platí

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \varrho(x, y) \geq 0 \quad \text{a} \quad \varrho(x, y) = 0 \iff x = y \\ \text{(ii)} \quad & \varrho(x, y) = \varrho(y, x) \\ \text{(iii)} \quad & \varrho(x, z) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z). \end{aligned} \tag{11.0.1}$$

Platnost prvních dvou vlastností je zřejmá. Třetí vlastnost se nazývá *trojúhelníková nerovnost* a dokáže se snadno pomocí První Cauchy–Schwarzovy nerovnosti (Tvzení 2.2.46).

Později zjistíme, že uvedené tři vlastnosti jsou klíčové k vybudování pojmu limity a odvození jejích standardních vlastností, na které jsme zvyklí z předchozích kapitol.

11.1 Základní pojmy

Předchozí úvahy nás vedou k následující definici.

Definice 11.1.1 (Metrika a metrický prostor). Nechť P je množina. Zobrazení $\varrho: P \times P \rightarrow [0, \infty)$ se nazývá *metrika*, jestliže pro všechna $x, y, z \in P$ splňuje (i), (ii) a (iii) ze vztahu (11.0.1). V takovém případě se dvojice (P, ϱ) nazývá *metrický prostor*.

Příklad 11.1.2. (i) Na \mathbb{R} je možné uvažovat například metriky

$$\varrho(x, y) = |x - y|, \quad \varrho(x, y) = \frac{1}{3}|x - y| \quad \text{a} \quad \varrho(x, y) = \arctan |x - y|;$$

při důkazu trojúhelníkové nerovnosti pro poslední metricku se využije nerovnost $\arctan(\alpha + \beta) \leq \arctan \alpha + \arctan \beta$ platná pro $\alpha, \beta \geq 0$, která se získá z Lagrangeovy věty o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) díky konkávnosti funkce \arctan . Platí totiž (bez újmy na obecnosti bereme $\alpha \geq \beta \geq 0$)

$$\begin{aligned} \arctan(\alpha + \beta) &\leq \arctan \alpha + \beta \arctan' \alpha \\ \arctan \beta &= \beta \arctan' \xi, \quad \xi \in (\alpha, \alpha + \beta). \end{aligned}$$

Odečtením dostáváme

$$\arctan(\alpha + \beta) \leq \arctan \alpha + \arctan \beta + \beta(\arctan' \alpha - \arctan' \xi) \leq \arctan \alpha + \arctan \beta.$$

(ii) Na \mathbb{R}^N se často pracuje s metrikami:

$$\begin{aligned} \varrho_1(x, y) &= \sum_{i=1}^N |x_i - y_i| \\ \varrho_2(x, y) &= \sqrt{\sum_{i=1}^N |x_i - y_i|^2} \\ \varrho_\infty(x, y) &= \max_{i \in \{1, \dots, N\}} |x_i - y_i|. \end{aligned}$$

Metrikami dokonce jsou pro $p \in [1, \infty)$

$$\varrho_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^N |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

(důkaz trojúhelníkové nerovnosti využívající obecnou Youngovu nerovnost $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^{p-1}}{p-1}$ platnou pro $\alpha, \beta \geq 0$ a $p \in (1, \infty)$ je uveden ve Cvičení 11.1.3. Vrátime se k ní také v kapitole o Lebesgueově integrálu, kde ji využijeme pro důkaz obecnějšího výsledku zvaného Minkowského nerovnost).

(iii) Je-li $[a, b] \subset \mathbb{R}$, na prostoru spojitých funkcí $C([a, b])$ lze zavést třeba metriky

$$\varrho_\infty(f, g) = \max_{[a, b]} |f - g| \quad \text{a} \quad \varrho_p(f, g) = \left(\int_a^b |f - g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{pro } p \in [1, \infty)$$

(pro $p \in (1, \infty)$ je u metrik ϱ_p je opět poměrně obtížné dokázat trojúhelníkovou nerovnost, která se nazývá *Minkowského nerovnost*).

(iv) Představme si ještě některé prostory posloupností a jejich metriky

$$\ell_\infty = \{\{x_i\} \subset \mathbb{R} : \exists C > 0 \quad |x_i| \leq C \forall i \in \mathbb{N}\}, \quad \varrho_\infty(\{x_i\}, \{y_i\}) = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i - y_i|,$$

$$\ell_p = \left\{ \{x_i\} \subset \mathbb{R} : \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty \right\}, \quad \varrho_p(\{x_i\}, \{y_i\}) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Opět zde uvažujeme $p \in [1, \infty)$ a pro $p \neq 1, 2$ je důkaz trojúhelníkové nerovnosti obtížný (a plyne z Minkowského nerovnosti).

(v) Na jakékoliv množině splňuje vlastnosti metriky *diskrétní metrika*

$$\varrho(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \neq y \\ 0 & \text{pro } x = y. \end{cases}$$

(vi) Vlastnosti metriky má také třeba vzdušná vzdálenost dvou míst na mapě, doba chůze mezi dvěma body, atd. Ale například doba jízdy autem mezi dvěma body nemusí být metrika (kvůli existenci jednosměrných ulic nemusí být symetrická), stejně tak i cena jízdného na železnici (kvůli speciálním cenám do některých měst nespĺňuje trojúhelníkovou nerovnost).

Cvičení 11.1.3. Dokažte trojúhelníkovou nerovnost pro metriky $\varrho_p(x, y)$ z bodu (ii).

Návod: Nejprve dokažte Youngovu nerovnost. Uvažte funkci $g_\beta(\alpha) := \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^{\frac{p}{p-1}}}{\frac{p}{p-1}} - \alpha\beta$ a ukažte, že tato funkce nabývá svého ostrého minima v bodě $\alpha = \beta^{\frac{1}{p-1}}$. Hodnota tohoto minima je nula. Poté použijte Youngovu nerovnost a ukažte, že

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N |a_i + b_i|^p &= \sum_{i=1}^N |a_i + b_i| |a_i + b_i|^{p-1} \\ &\leq \left[\left(\sum_{i=1}^N |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^N |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\sum_{i=1}^N |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \end{aligned}$$

a výslednou nerovnost použijte k důkazu trojúhelníkové nerovnosti pro libovolné $p \in (1, \infty)$.

Poznámka 11.1.4. Je přirozené se ptát, zda má nějaký smysl zavádět více než jednu metriku na dané množině, jak jsme to udělali třeba na \mathbb{R}^N . Zde je vhodné poznamenat, že obecně různé metriky dávají různé pojmy konvergence, a proto každá metrika na daném prostoru nemusí odpovídat studovanému problému. Na druhou stranu si později ukážeme, že třeba na \mathbb{R}^N dávají metriky ϱ_2 a ϱ_∞ stejný pojem limity. Metrika ϱ_2 se používá nejčastěji, ale díky odmocnině v její definici se s ní nepracuje příliš pohodlně. Proto ji bývá někdy výhodné nahradit metrikou ϱ_∞ .

Naším cílem není jen pojem limity, ale i hlubší výsledky pracující s (vícedimenzionální) analogií pojmu derivace (či přesněji diferenciál). Takové výsledky již potřebují, aby množina P měla lineární strukturu a abychom pracovali s metrikou, která je s touto lineární strukturou kompatibilní. Proto zavádíme ještě další pojem.

Definice 11.1.5 (Norma a normovaný lineární prostor). Nechť V je vektorovým prostorem nad \mathbb{R} (či \mathbb{C}). Zobrazení $\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty)$ se nazývá *norma*, jestliže pro všechna $u, v \in V$ a $\lambda \in \mathbb{R}$ (\mathbb{C}) splňuje

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \|u\| \geq 0 \quad \text{a} \quad \|u\| = 0 \iff u = 0 \\ \text{(ii)} \quad & \|\lambda u\| = |\lambda| \|u\| \\ \text{(iii)} \quad & \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|. \end{aligned} \tag{11.1.1}$$

Dvojice $(V, \|\cdot\|)$ se pak nazývá *normovaný lineární prostor*.

Poznámka 11.1.6. Domluvme se, že počátek (nulový prvek) ve vektorových prostorech budeme zapisovat zkráceně jako 0.

Snadno se dokáže následující výsledek.

Tvrzení 11.1.7. *Nechť $(V, \|\cdot\|)$ je normovaný lineární prostor. Pak zobrazení $\varrho: V \times V \rightarrow [0, \infty)$ definované předpisem*

$$\varrho(x, y) = \|x - y\|$$

je metrika na V .

Příklad 11.1.8. (i) Na \mathbb{R}^N máme třeba normy

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{pro } p \in [1, \infty) \quad \text{a} \quad \|x\|_\infty = \max_{i \in \{1, \dots, N\}} |x_i|.$$

(ii) Na $C([a, b])$ mají vlastnosti normy

$$\|f\|_\infty = \max_{[a, b]} |f| \quad \text{a} \quad \|f\|_p = \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{pro } p \in [1, \infty).$$

(iii) Na ℓ_∞ je normou $\|x\|_\infty = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i|$ (zkráceně píšeme $x := \{x_i\}$) a pro $p \in [1, \infty)$ je na ℓ_p normou

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

(iv) Neexistuje norma, ze které by vznikla diskrétní metrika (s výjimkou triviálních případů $V = \emptyset$ a $V = \{0\}$).

Poznámka 11.1.9. (i) Snadno se dá nahlédnout, že na \mathbb{R}^N platí

$$\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1 \leq N\|\cdot\|_\infty.$$

Dobrou představu pro porovnání velikostí norem nám dávají *jednotkové sféry* v jednotlivých normách, tedy množiny $\{x \in \mathbb{R}^N : \|x\| = 1\}$. Pro případ $N = 2$ jsou zobrazeny na Obrázku 11.1.


(ii) Není těžké ukázat, že

$$1 \leq p < q \leq \infty \quad \implies \quad \|\cdot\|_p \geq \|\cdot\|_q.$$

(Návod: díky vlastnosti (ii) v definici normy stačí uvažovat jen body tvaru $(1, t)$ a $(t, 1)$, kde $t > 0$. Dále funkce $p \mapsto (1 + t^p)^{\frac{1}{p}}$ je klesající, což zjistíme zderivováním.)

(iii) V nekonečné dimenzi jsou vztahy mezi normami často složitější. Kupříkladu pro funkce $f_n = n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}$ a $g_n = \frac{1}{n}\chi_{[0, n]}$, kde χ_I je charakteristická funkce intervalu I ($\chi(x) = 1$ je-li $x \in I$, jinak je $\chi(x) = 0$), platí (pro normu definovanou v Příkladu 11.1.8 (ii), která má smysl i pro některé nespojitě funkce)

$$\|f_n\|_1 = 1 \quad \text{ale} \quad \|f_n\|_\infty = n \rightarrow \infty \quad \text{a} \quad \|g_n\|_1 = 1 \quad \text{ale} \quad \|g_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$



Obrázek 11.1: Tvar jednotkové sféry v závislosti na volbě normy na \mathbb{R}^2 .

Mezi normovanými lineárními prostory budeme pracovat nejraději s těmi, které umožňují zavedení *skalárního součinu*, což nám umožní používat Pythagorovu větu, její zobecnění a důsledky.

Definice 11.1.10 (Skalární součin). Nechť V je vektorový prostor. Potom zobrazení $(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$ nazveme *skalárním součinem*, jestliže pro všechna $x, y, z \in V$ a $\lambda \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$ platí

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & (x, x) \geq 0 \quad \text{a} \quad (x, x) = 0 \iff x = 0 \\ \text{(ii)} \quad & (x, y) = \overline{(y, x)} \\ \text{(iii)} \quad & (\lambda x, y) = \lambda(x, y) \quad \text{a} \quad (x + y, z) = (x, z) + (y, z). \end{aligned} \tag{11.1.2}$$

Vektorové prostory se skalárním součinem se označují jako *unitární prostory*.

Poznámka 11.1.11. (i) Obecně platí

$$(x, \lambda y) = \overline{(\lambda y, x)} = \overline{\lambda(y, x)} = \bar{\lambda} \overline{(y, x)} = \bar{\lambda}(x, y)$$

a

$$(u, v + w) = \overline{(v + w, u)} = \overline{(v, u) + (w, u)} = \overline{(v, u)} + \overline{(w, u)} = (u, v) + (u, w).$$

(ii) Nad reálným vektorovým prostorem máme samozřejmě jednodušší vztahy

$$(x, y) = (y, x) \quad \text{a} \quad (x, \lambda y) = \lambda(x, y).$$

Věta 11.1.12 (Cauchy–Schwarzova nerovnost). *Nechť P je prostor se skalárním součinem. Pak pro všechna $x, y \in P$ platí*

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)}.$$

Důkaz. Pokud $y = 0$, tvrzení zřejmě platí. Nechť je v dalším $y \neq 0$ (tedy $(y, y) > 0$). Pro všechna $\lambda \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$ máme

$$0 \leq (x - \lambda y, x - \lambda y) = (x, x) - \lambda \overline{(x, y)} - \bar{\lambda}(x, y) + \lambda \bar{\lambda}(y, y).$$

Speciálně volba $\lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}$ dává

$$\begin{aligned} 0 &\leq (x, x) - \frac{(x, y)\overline{(x, y)}}{(y, y)} - \frac{\overline{(x, y)}(x, y)}{(y, y)} + \frac{(x, y)\overline{(x, y)}}{(y, y)} = (x, x) - \frac{(x, y)\overline{(x, y)}}{(y, y)} \\ &= (x, x) - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}, \end{aligned}$$

odkud plyne dokazovaná nerovnost. □

Věta 11.1.13 (Skalární součin generuje normu). *Nechť P je prostor se skalárním součinem. Pak zobrazení $\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty)$ definované předpisem*

$$\|x\| := \sqrt{(x, x)}$$

je normou na P .

Důkaz. Ověření prvních dvou vlastností normy je snadné cvičení. Ověřme ještě trojúhelníkovou nerovnost použitím Cauchy–Schwarzovy nerovnosti (Věta 11.1.12)

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + \overline{(x, y)} \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x, y) \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|(x, y)| \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

□

Poznámka 11.1.14. Pro právě zavedenou normu má Cauchy–Schwarzova nerovnost tvar $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$.

Poznámka 11.1.15. Je-li P prostor se skalárním součinem, snadno se ověří, že platí *rovnoběžníkové pravidlo*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad \forall x, y \in P.$$

Naopak, je-li P reálný normovaný lineární prostor, jehož norma splňuje rovnoběžníkové pravidlo, lze na něm definovat skalární součin předpisem

$$(x, y) := \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

V komplexním případě je situace složitější, skalární součin lze definovat předpisem

$$(x, y) := \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{i}{4}(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2).$$

Příklad 11.1.16. (i) Na \mathbb{R}^N či \mathbb{C}^N má vlastnost skalárního součinu $(x, y) = \sum_{i=1}^N x_i \bar{y}_i$ (díky tomu je První Cauchy–Schwarzova nerovnost z úvodní kapitoly, tedy (Tvzení 2.2.46) jen speciálním případem výše dokázané Cauchy–Schwarzovy nerovnosti). Podobně ℓ_2 je prostor se skalárním součinem $(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \bar{y}_i$.
(ii) Na $C([a, b])$ má vlastnosti skalárního součinu zobrazení

$$(f, g) = \int_a^b f \bar{g} \, dx.$$

Poznámka 11.1.17. Trojúhelníková nerovnost normy a metriky mají za následek nerovnosti

$$\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x - y\|$$

a

$$|\varrho(x, y) - \varrho(x, z)| \leq \varrho(y, z).$$

První nerovnost plyne z odhadů

$$\|x\| - \|y\| = \|x - y + y\| - \|y\| \leq \|x - y\| + \|y\| - \|y\| = \|x - y\|$$

a

$$\|y\| - \|x\| = \|y - x + x\| - \|x\| \leq \|y - x\| + \|x\| - \|x\| = \|x - y\|.$$

Druhá zase z nerovností

$$\varrho(x, y) - \varrho(x, z) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y) - \varrho(x, z) = \varrho(y, z)$$

a

$$\varrho(x, z) - \varrho(x, y) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z) - \varrho(x, y) = \varrho(y, z).$$

11.2 Konvergence posloupnosti v metrickém prostoru

Definice 11.2.1 (Konvergence v metrickém prostoru). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $\{x_n\} \subset P$ je posloupnost. Řekneme, že x_n *konverguje* k $x \in P$ pro $n \rightarrow \infty$, jestliže $\varrho(x_n, x) \rightarrow 0$. V takovém případě píšeme $x_n \rightarrow x$.

Cvičení 11.2.2. Dokažte si, že posloupnost v metrickém prostoru může mít nejvýše jednu limitu.

Příklad 11.2.3. (i) Na \mathbb{R} s metrikou generovanou absolutní hodnotou dostáváme obvyklou definici konvergence posloupnosti reálných čísel.

(ii) Pokud však na \mathbb{R} uvážíme diskrétní metriku, ke konvergenci dochází právě tehdy, když se členy posloupnosti od jistého indexu rovnají limitní hodnotě.

Poznámka 11.2.4. (i) V případě normovaného lineárního prostoru (a metriky odpovídající normě) konvergence posloupnosti prvků znamená

$$\|x_n - x\| = \varrho(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Bývá tedy zvykem rovněž říkat, že x_n konvergují k x v *normě*.

(ii) V případě normovaného lineárního prostoru je totéž $x_n \rightarrow x$ a $x_n - x \rightarrow 0$. Umíme tedy jakoukoliv konvergenci převést na konvergenci k nulovému prvku.

(iii) Bude-li se na metrickém prostoru nabízet více metrik, k údajím $x_n \rightarrow x$ budeme ještě doplňovat, ve které metrice tuto konvergenci uvažujeme.

Příklad 11.2.5. (i) Není těžké ověřit, že konvergence na \mathbb{R}^N v kterémkoliv z norem $\|\cdot\|_p$, kde $p \in [1, \infty]$, znamená, že jednotlivé složky bodů x_n konvergují k odpovídající složce bodu x v \mathbb{R} , tedy

$$x_n \rightarrow x \iff (x_n)_i \rightarrow (x)_i \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

(ii) Konvergence na $C([a, b])$ v normě $\|\cdot\|_\infty$ se nazývá *stejněměrná konvergence*. Této konvergenci se budeme časem věnovat podrobně, neboť má řadu pěkných vlastností (například se dozvíme, že stejněměrná limita posloupnosti spojitých funkcí je rovněž spojitá funkce), a proto se s ní příjemně pracuje.

První část předchozího příkladu ukázala, že v některých situacích mohou dát různé normy stejný typ konvergence. Tomuto jevu se nyní budeme věnovat podrobněji.

Definice 11.2.6 (Ekvivalentní normy a metriky). Nechť ϱ_1, ϱ_2 jsou metriky na P . Řekneme, že tyto metriky jsou *ekvivalentní*, jestliže existují $c_1, c_2 > 0$ takové, že na P platí

$$c_1 \varrho_1(x, y) \leq \varrho_2(x, y) \leq c_2 \varrho_1(x, y).$$

Analogicky se definují ekvivalentní normy podmínkou

$$c_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2 \|x\|_1.$$

Poznámka 11.2.7. Ekvivalence dvou norem zřejmě implikuje ekvivalenci jim odpovídajících metrik.

Příklad 11.2.8. (i) Výše jsme si ukázali, že všechny normy, které jsme si představili na \mathbb{R}^N , jsou ekvivalentní.

(ii) Na ℓ_∞ mají jednotkovou normu posloupnosti

$$\{1, 0, 0, \dots\}, \quad \{1, 1, 0, 0, \dots\}, \quad \{1, 1, 1, 0, 0, \dots\}, \quad \dots$$

Norma těchto posloupností v prostoru ℓ_1 však odpovídá počtu jedniček v dané posloupnosti. Proto ℓ_1 -norma a ℓ_∞ -norma nemohou být ekvivalentní.

Věta 11.2.9 (Ekvivalentní metriky generují stejnou konvergenci). *Nechť P je množina a ϱ_1, ϱ_2 jsou dvě ekvivalentní metriky na P . Pak pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset P$ a $x \in P$ platí*

$$x_n \rightarrow x \text{ v metrice } \varrho_1 \quad \Longleftrightarrow \quad x_n \rightarrow x \text{ v metrice } \varrho_2.$$

Důkaz. Ekvivalence metrik má za následek, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\tilde{\varepsilon} > 0$ tak, že

$$\varrho_2(x_n, x) < \tilde{\varepsilon} \quad \Longrightarrow \quad \varrho_1(x_n, x) < \varepsilon.$$

Odtud konvergence v metrice ϱ_2 implikuje konvergenci v metrice ϱ_1 . Obrácená implikace se dokáže analogicky. \square

Vztah mezi konvergencí v normě a po složkách, kterou jsme pozorovali v příkladu výše, platí obecně ve všech konečnědimenzionálních lineárních prostorech.

Věta 11.2.10 (O vztahu konvergence v normě ke konvergenci po složkách). *Nechť P je normovaný lineární prostor, $\{e_1, \dots, e_N\}$ je jeho báze, $x_n = \sum_{i=1}^N \alpha_i^n e_i$ a $x = \sum_{i=1}^N \alpha_i e_i$, kde $\alpha_i^n, \alpha_i \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$ pro $i \in \{1, \dots, N\}$ a pro $n \in \mathbb{N}$. Pak*

$$x_n \rightarrow x \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_i^n \rightarrow \alpha_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Důkaz. „ \Leftarrow “ Tato implikace plyne z odhadu (využijeme trojúhelníkovou nerovnost)

$$\|x_n - x\| = \left\| \sum_{i=1}^N (\alpha_i^n - \alpha_i) e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^N |\alpha_i^n - \alpha_i| \|e_i\| \leq \max_{i \in \{1, \dots, N\}} \|e_i\| \sum_{i=1}^N |\alpha_i^n - \alpha_i|.$$

„ \Rightarrow “ Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $x = 0$. Pro spor předpokládejme, že $x_n = \sum_{i=1}^N \alpha_i^n e_i \rightarrow 0$, ale alespoň pro jedno $i \in \{1, \dots, N\}$ máme $\alpha_i^n \not\rightarrow 0$. Odtud dostáváme existenci $\delta > 0$ takového, že pro nekonečně mnoho indexů n platí

$$\max\{|\alpha_1^n|, |\alpha_2^n|, \dots, |\alpha_N^n|\} \geq \delta.$$

Přechodem k podposloupnosti dosáhneme toho, že pro jisté $j \in \{1, \dots, N\}$ a všechna $n \in \mathbb{N}$ máme

$$|\alpha_j^n| = \max\{|\alpha_1^n|, |\alpha_2^n|, \dots, |\alpha_N^n|\} \geq \delta.$$

Definujme nyní

$$y_n = \sum_{i=1}^N \beta_i^n e_i := \sum_{i=1}^N \frac{\alpha_i^n}{|\alpha_j^n|} e_i = \frac{1}{|\alpha_j^n|} x_n.$$

Odtud $\beta_j^n = 1$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $\beta_i^n \in [-1, 1]$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $i \neq j$. Aplikujeme-li $(N-1)$ -násobně Weierstrassovu větu (Věta 5.5.4), po přechodu k podposloupnosti β_i^n konvergují k $\beta_i \in [-1, 1]$ pro všechna $i \in \{1, \dots, N\}$, speciálně $\beta_j = 1$. Odtud podle již dokázané implikace „ \Leftarrow “ máme

$$y_n \rightarrow y \neq 0.$$

Na druhou stranu, z definice bodů y_n a vlastnosti $x_n \rightarrow 0$ plyne

$$\|y_n\| = \left\| \frac{x_n}{|\alpha_j^n|} \right\| \leq \left\| \frac{x_n}{\delta} \right\| \rightarrow 0$$

a máme spor. □

Věta 11.2.11 (O ekvivalenci norem v konečné dimenzi). *Na konečnědimenzionálním lineárním prostoru jsou libovolné dvě normy ekvivalentní.*

Důkaz. Pokud by tomu tak nebylo, našli bychom posloupnost netriviálních prvků $\{x_n\}$ a dvojici norem $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ tak, že $\|x_n\|_1 \geq n\|x_n\|_2$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\|x_n\|_1 = 1$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ (jinak přejdeme k prvkům $\frac{x_n}{\|x_n\|_1}$). Odtud

$$\|x_n\|_2 \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Podle předchozí věty dostáváme konvergenci k nulovému prvku po složkách a další aplikací předchozí věty obdržíme $\|x_n\|_1 \rightarrow 0$, což je ve sporu s $\|x_n\|_1 \equiv 1$. □

Věta 11.2.12 (O spojitosti metriky, normy a skalárního součinu). (i) *Jestliže $x_n \rightarrow x$ a $y_n \rightarrow y$ v metrickém prostoru (P, ϱ) , pak $\varrho(x_n, y_n) \rightarrow \varrho(x, y)$.*
(ii) *Jestliže $x_n \rightarrow x$ v normovaném lineárním prostoru $(V, \|\cdot\|)$, pak $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.*
(iii) *Jestliže $x_n \rightarrow x$ a $y_n \rightarrow y$ v prostoru se skalárním součinem, pak $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$.*

Důkaz. Druhé tvrzení plyne z poznámky o důsledcích trojúhelníkové nerovnosti pro normu (Poznámka 11.1.17). První část se dokazuje podobně, neboť máme (poznámku o důsledcích trojúhelníkové nerovnosti pro metriku použijeme v druhém kroku odhadu)

$$\begin{aligned} |\varrho(x_n, y_n) - \varrho(x, y)| &= |\varrho(x_n, y_n) - \varrho(x_n, y) + \varrho(x_n, y) - \varrho(x, y)| \\ &\leq |\varrho(x_n, y_n) - \varrho(x_n, y)| + |\varrho(x_n, y) - \varrho(x, y)| \\ &\leq \varrho(y_n, y) + \varrho(x_n, x) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Důkaz třetího tvrzení využívá Cauchy-Schwarzovu nerovnost (Věta 11.1.12) a omezenost $\|x_n\|$ (plyne z (ii))

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &= |(x_n, y_n) - (x_n, y) + (x_n, y) - (x, y)| \\ &\leq |(x_n, y_n) - (x_n, y) + (x_n, y) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

Důsledek 11.2.13. *Konvergentní posloupnost v normovaném lineárním prostoru má omezené normy.*

11.3 Základní vlastnosti podmnožin metrického prostoru

Definice 11.3.1 (Okolí v metrickém prostoru). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor, $x_0 \in P$ a $\varepsilon > 0$. Množina

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) := \{x \in P : \varrho(x, x_0) < \varepsilon\}$$

se nazývá ε -ovým okolím bodu x_0 . Prstencové ε -ové okolí bodu x_0 definujeme jako

$$\mathcal{P}_\varepsilon(x_0) := \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}.$$

Příklad 11.3.2. (i) Bereme-li na \mathbb{R} metriku generovanou absolutní hodnotou, předchozí definice dává nám známý pojem okolí.

(ii) Podobně na \mathbb{C} s obvyklou eukleidovskou vzdáleností.

(iii) Při diskrétní metrice máme pro $\varepsilon \leq 1$

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) = \{x_0\} \quad \text{a} \quad \mathcal{P}_\varepsilon(x_0) = \emptyset.$$

Pokud je však $\varepsilon > 1$, dostáváme

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) = P \quad \text{a} \quad \mathcal{P}_\varepsilon(x_0) = P \setminus \{x_0\}.$$

(iv) Na \mathbb{R}^N s normou $\|\cdot\|_2$ mají okolí tvar koulí, s normou $\|\cdot\|_\infty$ mají tvar krychlí.

Definice 11.3.3 (Otevřené a uzavřené množiny). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor. Množina $G \subset P$ se nazývá *otevřená*, jestliže ke každému jejímu bodu existuje okolí, které leží v G . Množina $F \subset P$ se nazývá *uzavřená*, jestliže je doplňkem otevřené množiny.

Poznámka 11.3.4. Díky tomu, že norma indukuje metriku, výše uvedené definice okolí a otevřené a uzavřené množiny se přirozeně přenesou do normovaných lineárních prostorů.

Příklad 11.3.5. (i) Na \mathbb{R} s obvyklou metrikou je každý otevřený interval otevřená množina. Skutečně, je-li $x \in (a, b)$, kde $a, b \in \mathbb{R}$, máme $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset (a, b)$, kdykoliv $\varepsilon \leq \min\{x - a, b - x\}$. Pokud je některá z mezí nevlastní, je důkaz ještě jednodušší.

(ii) Každý omezený uzavřený interval v \mathbb{R} je uzavřená množina. Uzavřené množiny jsou dále intervaly typu $[a, \infty)$ a $(-\infty, b]$.

Cvičení 11.3.6. (i) Rozmyslete si, které množiny jsou otevřené a které uzavřené na \mathbb{R} s diskrétní metrikou.

(ii) Rozmyslete si, které množiny jsou otevřené a které uzavřené na $(-1, 1)$ s obvyklou metrikou.

(iii) Rozmyslete si, že $(0, 1)^N \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená jak v normě $\|\cdot\|_2$, tak v normě $\|\cdot\|_\infty$ (ke každému bodu $z \in (0, 1)^N$ umíme sestrojít jak kouli tak krychličku, že jsou v tomto bodě centrovány a leží v $(0, 1)^N$).

Poznámka 11.3.7. (i) V každém metrickém prostoru (P, ρ) jsou \emptyset a P otevřené množiny. Následně jsou \emptyset a P také uzavřené. Takovými množinám se říká *objetné*. Obecně mohou existovat i jiné objetné množiny než \emptyset a P (uvažte třeba $P = (0, 1) \cup (2, 3)$ s obvyklou metrikou).

(ii) Okolí je vždy otevřená množina, což snadno plyne z trojúhelníkové nerovnosti.

(iii) Existují množiny (a v obvykle používaných metrických prostorech je jich dokonce většina), které nejsou ani otevřené ani uzavřené (na \mathbb{R} s obvyklou metrikou uvažte třeba $[0, 1)$).

(iv) Podle definice je množina uzavřená právě tehdy, když je doplňkem otevřené. Podobně množina je otevřená právě tehdy, když je doplňkem uzavřené (neboť $P \setminus (P \setminus G) = G$).

Poznámka 11.3.8. Otevřené množiny jsou důležité například při budování diferenciálního počtu (vzpomeňte si, že při definici derivace jsme potřebovali mít funkci definovanou na okolí všech bodů, kde jsme derivaci počítali). Uzavřené množiny jsou zase důležité při studiu extrémů (vzpomeňte si na Větu o existenci extrémů, tedy Větu 6.1.7, která říká, že spojitá funkce nabývá na omezeném uzavřeném intervalu svého maxima i minima). Oba typy množin jsou „hezké“ v teorii Lebesgueova integrálu a jim odpovídající charakteristické funkce bude možné integrovat (analogie k tomu, jak si teorie Riemannova integrálu dobře rozuměla s omezenými spojitými funkcemi).

Určování otevřenosti či uzavřenosti množin se často neprovádí z definice, ale pomocí vhodných nástrojů. Ty si zde budeme postupně uvádět.

Věta 11.3.9 (O sjednocení a průniku otevřených a uzavřených množin). *Sjednocení libovolného systému otevřených množin je otevřené, průnik konečného systému otevřených množin je otevřený. Průnik libovolného systému uzavřených množin je uzavřený, sjednocení konečného systému uzavřených množin je uzavřené.*

Důkaz. Nechť I je indexová množina a G_α je otevřená pro každé $\alpha \in I$. Nechť $x_0 \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$. Pak existuje $\alpha_0 \in I$ tak, že $x_0 \in G_{\alpha_0}$. Protože G_{α_0} je otevřená, dostáváme $\varepsilon > 0$ takové, že

$$U_\varepsilon(x_0) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha.$$

Odtud $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ je otevřená.

Pokud je I konečná a $x_0 \in \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha$, pak pro každé $\alpha \in I$ existuje $\varepsilon_\alpha > 0$ tak, že

$$U_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset G_\alpha.$$

Navíc, protože I je konečná, existuje kladné

$$\varepsilon := \min_{\alpha \in I} \varepsilon_\alpha.$$

Odtud

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset \mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset G_\alpha \quad \forall \alpha \in I \quad \implies \quad \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha.$$

Proto $\bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha$ je otevřená.

Nechť F_α je uzavřená pro každé $\alpha \in I$ a $x_0 \notin \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$. Pak existuje $\alpha_0 \in I$ tak, že $x_0 \notin F_{\alpha_0}$. Protože $P \setminus F_{\alpha_0}$ je otevřená, dostáváme $\varepsilon > 0$ takové, že

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset P \setminus F_{\alpha_0} \subset P \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha.$$

Odtud $P \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ je otevřená a $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ je uzavřená.

Pokud je I konečná a $x_0 \in P \setminus \bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha$, pak pro každé $\alpha \in I$ existuje $\varepsilon_\alpha > 0$ tak, že

$$\mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset P \setminus F_\alpha.$$

Navíc, protože I je konečná, existuje kladné

$$\varepsilon := \min_{\alpha \in I} \varepsilon_\alpha.$$

Odtud

$$\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset \mathcal{U}_{\varepsilon_\alpha}(x_0) \subset P \setminus F_\alpha \quad \forall \alpha \in I \quad \implies \quad \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset P \setminus \bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha.$$

Proto je $\bigcup_{\alpha \in I} F_\alpha$ uzavřená. □

Poznámka 11.3.10. Tvrzení o uzavřených množinách šla také dokázat za pomoci tvrzení o otevřených množinách a de Morganových vzorců.

Příklad 11.3.11. Spočetný systém otevřených množin $G_i = (-\frac{1}{i}, \frac{1}{i})$, $i \in \mathbb{N}$, má jednobodový průnik $\{0\}$, což není otevřená množina. Spočetný systém uzavřených množin $F_i = [\frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i}]$, $i \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, má sjednocení $(0, 1)$, což není uzavřená množina.

Cvičení 11.3.12. Nechť F je uzavřená a G je otevřená. Ukažte, že $F \setminus G$ je uzavřená a $G \setminus F$ je otevřená.

Představme si ještě další základní pojmy.

Definice 11.3.13 (Vnitřní, vnější a hraniční body). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Řekneme, že bod $x_0 \in A$ je *vnitřním bodem* množiny A , jestliže existuje jeho okolí ležící v A . Bod $x_0 \in P$ se nazývá *vnějším bodem* množiny A , jestliže je vnitřním bodem jejího doplňku. Bod $x_0 \in P$ se nazývá *hraničním bodem* množiny A , jestliže není vnitřním ani vnějším bodem množiny A .

Množina všech vnitřních bodů se nazývá *vnitřek* množiny A a značí se A° . Množina všech vnějších bodů se nazývá *vnějšek* množiny A , množina všech hraničních bodů se nazývá *hranice* množiny A a značí se ∂A . Množinu $\bar{A} := A \cup \partial A$ nazýváme *uzávěr* množiny A .

Příklad 11.3.14. (i) Necht $A = (0, 1] \subset \mathbb{R}$ s obvyklou metrikou. Pak

$$A^\circ = (0, 1), \quad \bar{A} = [0, 1] \quad \text{a} \quad \partial A = \{0, 1\}.$$

(ii) Necht $A = (0, 1) \cap \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ s obvyklou metrikou. Pak

$$A^\circ = \emptyset, \quad \bar{A} = [0, 1] \quad \text{a} \quad \partial A = [0, 1].$$

Věta 11.3.15 (Charakterizace vnitřku a uzávěru pomocí inkluze). *Necht (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak A° je největší otevřená podmnožina A a \bar{A} je nejmenší uzavřená podmnožina A .*

Důkaz. Nejprve ukažme, že A° je otevřená. Zvolme $x_0 \in A^\circ$. Podle definice existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset A$. Zvolme libovolné $x \in \mathcal{U}_\varepsilon(x_0)$. Pak pro $\delta := \varepsilon - \rho(x, x_0)$ platí

$$y \in \mathcal{U}_\delta(x) \implies \rho(y, x_0) \leq \rho(y, x) + \rho(x, x_0) < \varepsilon \implies y \in \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset A.$$

Odtud $\mathcal{U}_\delta(x) \subset A$, a proto $x \in A^\circ$. Protože $x \in \mathcal{U}_\varepsilon(x_0)$ bylo libovolné, máme $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \subset A^\circ$. Protože $x_0 \in A^\circ$ bylo libovolné, A° je otevřená.

Dále zřejmě platí $A^\circ \subset A$. Konečně, pokud je $G \subset A$ otevřená, každý její bod má okolí ležící v $G \subset A$, tedy tento bod je vnitřním bodem A , a musí proto ležet v A° . Tedy $G \subset A^\circ$.

Podle definice je $\bar{A} = A \cup \partial A = P \setminus (P \setminus A)^\circ$. Je to tedy doplněk největší otevřené podmnožiny $P \setminus A$, z čehož plynou dokazované vlastnosti (uzavřenost a $A \subset \bar{A}$ jsou jasné; pokud by existovala uzavřená $F \supset A$ splňující $\bar{A} \setminus F \neq \emptyset$, pak by $P \setminus (\bar{A} \cap F)$ byla otevřená množina ležící v $P \setminus A$, ale dle našeho předpokladu by obsahovala jako podmnožinu $(P \setminus A)^\circ = P \setminus \bar{A}$, což vede ke sporu. \square

Poznámka 11.3.16. Podobně jako je vnitřek otevřená množina, je i vnějšek (vnitřek doplňku) otevřená množina. Hranice je proto uzavřená (doplněk sjednocení dvou otevřených množin).

Věta 11.3.17 (Charakterizace hranice pomocí okolí). *Necht (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak $x \in \partial A$ právě tehdy, když v každém jeho okolí leží alespoň jeden bod z A a alespoň jeden bod z $P \setminus A$.*

Důkaz. „ \implies “ Pokud by existovalo okolí x , kde by chyběl bod z doplňku, platilo by $x \in A^\circ$, tedy $x \notin \partial A$. Analogicky pro případ s okolím neprotínajícím A .

„ \impliedby “ Pokud platí výrok napravo, nemohou platit výroky $x \in A^\circ$ a $x \in (P \setminus A)^\circ$. Odtud

$$x \in P \setminus (A^\circ \cup (P \setminus A)^\circ) = \partial A.$$

\square

Cvičení 11.3.18. Sami si dokažte následující výsledky

$$\begin{aligned} A \subset B &\implies \bar{A} \subset \bar{B}, & A \subset B &\implies A^\circ \subset B^\circ, & \overline{A \cup B} &= \bar{A} \cup \bar{B}, & \overline{\bar{A}} &= \bar{A}, \\ \overline{\{x\}} &= \{x\}, & \partial A &= \bar{A} \cap \overline{P \setminus A}, & A^\circ &= A \setminus \overline{P \setminus A}, & (A \cap B)^\circ &= A^\circ \cap B^\circ. \end{aligned}$$

Definice 11.3.19 (Izolovaný a hromadný bod množiny). Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Bod $x_0 \in A$ se nazývá *izolovaný bod* množiny A , jestliže má prstencové okolí neprotínající A . Bod $x_0 \in P$ se nazývá *hromadný bod* množiny A , jestliže každé jeho prstencové okolí protíná A . Množina všech hromadných bodů množiny A se nazývá *derivace* množiny A a značí se A' .

Příklad 11.3.20. (i) Nechť $A = (0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$ s obvyklou metrikou. Pak jediným izolovaným bodem je číslo 2. Dále $A' = [0, 1]$.

(ii) Jestliže $A = \mathbb{Q}$, pak $A' = \mathbb{R}$ a žádný bod A není izolovaný.

(iii) V diskrétní metrice jsou všechny body dané množiny izolované.

Poznámka 11.3.21. (i) Izolovaný bod je automaticky hraničním bodem podle Věty o charakterizaci hranice množiny pomocí okolí (Věta 11.3.17).

(ii) Každý bod množiny A je buď jejím hromadným bodem, nebo je izolovaný. Navíc ještě některé body z jejího doplňku mohou být jejími hromadnými body.

Věta 11.3.22 (O vztahu hromadných a hraničních bodů). *Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak*

$$\partial A \setminus A = A' \setminus A \quad \text{a} \quad \partial A \cup A = A' \cup A = \bar{A}.$$

Důkaz. Dokažme inkluzi „ \subset “ v první rovnosti. Nechť $x_0 \in \partial A \setminus A$. Pak podle Věty o charakterizaci hranice pomocí okolí (Věta 11.3.17) musí být $x_0 \in A'$ (připomeňme, že $x_0 \notin A$).

Dokažme inkluzi „ \supset “ v první rovnosti. Nechť $x_0 \in A' \setminus A$. Opět stačí na x_0 aplikovat Větu o charakterizaci hranice pomocí okolí (Věta 11.3.17).

Druhá rovnost plyne z první, neboť

$$\partial A \cup A = (\partial A \setminus A) \cup A = (A' \setminus A) \cup A = A' \cup A$$

a podle definice uzávěru je $\partial A \cup A = \bar{A}$. □

Věta 11.3.23 (Charakterizace uzavřené množiny). *Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak*

$$A \text{ je uzavřená} \iff A = \bar{A} \iff \partial A \subset A \iff A' \subset A.$$

Důkaz. Je-li $A = \bar{A}$, musí být A uzavřená, neboť uzávěr je vždy uzavřený. Je-li A uzavřená, musí platit $A = \bar{A}$, neboť \bar{A} je nejmenší uzavřená množina obsahující A . Tím je dokázána první ekvivalence. Druhá ekvivalence plyne z definice uzávěru a třetí z Věty o vztahu hromadných a hraničních bodů (Věta 11.3.22). □

V dalším se budeme zabývat vztahem nově zavedených pojmů a konvergence posloupností.

Věta 11.3.24 (Charakterizace hromadných bodů pomocí posloupností). *Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak*

$$x_0 \in A' \iff \exists \{x_n\} \subset A \setminus \{x_0\} \quad x_n \rightarrow x_0.$$

Důkaz. „ \Rightarrow “ Posloupnost zkonstruujeme tak, že bereme $x_n \in A \cap \mathcal{P}_{\frac{1}{n}}(x_0)$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

„ \Leftarrow “ Tato implikace je zřejmá. \square

Věta 11.3.25 (Charakterizace uzávěru pomocí posloupností). *Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak*

$$x_0 \in \bar{A} \iff \exists \{x_n\} \subset A \quad x_n \rightarrow x_0.$$

Důkaz. „ \Rightarrow “ Pokud $x_0 \in A$, stačí uvážit konstantní posloupnost $x_n \equiv x_0$. Pokud $x_0 \in \partial A$, bereme $x_n \in A \cap \mathcal{U}_{\frac{1}{n}}(x_0)$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

„ \Leftarrow “ Platí-li výrok na pravé straně, x_0 nemůže být vnějším bodem množiny A . \square

Věta 11.3.26 (Charakterizace hranice pomocí posloupností). *Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak*

$$x_0 \in \partial A \iff \exists \{x_n\} \subset A, \{y_n\} \subset P \setminus A \quad x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow x_0.$$

Důkaz. „ \Rightarrow “ Posloupnosti zkonstruujeme tak, že bereme $x_n \in A \cap \mathcal{U}_{\frac{1}{n}}(x_0)$ a $y_n \in \mathcal{U}_{\frac{1}{n}}(x_0) \setminus A$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

„ \Leftarrow “ Platí-li výrok na pravé straně, x_0 nemůže být ani vnitřním ani vnějším bodem množiny A . \square

Věta 11.3.27 (Charakterizace uzavřenosti pomocí posloupností). *Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Pak A je uzavřená právě tehdy, když každá konvergentní (v P) posloupnost prvků z A má limitu v A .*

Důkaz. „ \Rightarrow “ Je-li A je uzavřená, je $P \setminus A$ otevřená. Každý její bod má proto okolí neprotínající A a není tedy možné k němu dokonvergovat posloupností prvků A .

„ \Leftarrow “ V tomto případě má každá posloupnost z Věty o charakterizaci uzávěru pomocí posloupností (Věta 11.3.25) limitu z A . Odtud $\bar{A} \subset A$, proto $\bar{A} = A$ a A je uzavřená. \square

Poznámka 11.3.28. Pokud je $P = (0, 1)$ s obvyklou metrikou pro reálná čísla, je $(0, 1)$ uzavřená množina (celý prostor je obojetná množina). Posloupnost $\{\frac{1}{n}\}$ v předchozí větě žádné problémy nezpůsobí, neboť není konvergentní v P . Pokud bychom uvážili případ $P = \mathbb{R}$ a $A = (0, 1)$, množina A není uzavřená, což se dá zdůvodnit právě pomocí posloupnosti $\{\frac{1}{n}\}$.

Poznámka 11.3.29. Řadu nových pojmů a jevů jsme si ilustrovali pomocí příkladů, kde jsme používali například diskrétní metriku či třeba prostor $P = (0, 1)$. Pro takovéto metriky a prostory nebudeme mít v dalším výkladu využití. Naším hlavním cílem však budou prostory funkcí, kde bývá situace mnohdy značně složitá. Proto jsme raději pro rychlou ilustraci volili zmíněné jednoduché prostory, ačkoliv nemají v matematice a fyzice takový význam.

11.4 Hustota a separabilita

V matematické analýze se velice často přistupuje k tomu, že obecný výsledek dokazujeme jen v méně obecné situaci, která je však pro platnost obecného výroku rozhodující. Kupříkladu k důkazu omezenosti funkčních hodnot shora postačuje znalost hodnoty jejich maxima, při aplikaci Lagrangeovy věty o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) často uvažujeme „nejhorší“ bod $\xi \in (a, b)$ a aplikace teorie Taylorova polynomu těží z toho, že s polynomy se dobře pracuje a zároveň je to dostatečně bohatá třída funkcí, aby nám poskytla libovolně přesnou aproximaci vyšetřované (typicky reálně analytické) funkce. Právě aproximační schopnosti „hezkyých“ prvků studovaného metrického prostoru se kupříkladu v teorii Lebesgueova integrálu či parciálních diferenciálních rovnic používají velice často. To nás vede k následující definici.

Definice 11.4.1 (Hustá podmnožina). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$. Říkáme, že množina A je *hustá* v P , jestliže v každém okolí každého prvku z P leží prvek z A .

Poznámka 11.4.2. Hustota se dá také charakterizovat tak, že pro každé $x \in P$ existuje posloupnost $\{a_n\} \subset A$ splňující $a_n \rightarrow x$. Ekvivalentní je též $\overline{A} = P$.

Příklad 11.4.3. Vezmeme-li \mathbb{R} s obvyklou metrikou, pak jsou zde hustá racionální čísla. Podobně pro iracionální čísla.

Definice 11.4.4 (Separabilní prostor). Řekneme, že metrický prostor je *separabilní*, jestliže v něm existuje spočetná hustá množina.

Poznámka 11.4.5. (i) Separabilita v podstatě znamená, že prostor není příliš velký. Separabilita nevylučuje nekonečnou dimenzi, proto obecně nezaručuje kupříkladu ekvivalenci norem. Přesto si později ukážeme, že separabilní prostory si stále ještě zachovávají řadu příjemných vlastností (oproti prostorům neseparabilním).

(ii) S ohledem na předchozí část poznámky se jeví přirozené v definici používat raději termín „nejvýše spočetná“. Existuje-li však v metrickém prostoru konečná hustá množina, zřejmě musí být celý prostor roven této množině a obsahuje jen konečný počet prvků. To je ale vlastnost, kterou žádný z běžně užívaných metrických prostorů nemá.

Poznámka 11.4.6. Občas budeme hovořit o separabilních množinách. Budeme tím opět myslet, že mají (nejvýše) spočetnou hustou podmnožinu. Příklad konečných množin je opět nezajímavý.

Příklad 11.4.7. Množina \mathbb{R} s obvyklou metrikou je separabilní díky hustotě racionálních čísel.

Cvičení 11.4.8. Nechť $n \in \mathbb{N}$ a $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Dokažte, že v prostoru polynomů stupně nejvýše n na $[a, b]$ je hustá množina polynomů s racionálními koeficienty a stupněm nejvýše n , a proto je původní prostor separabilní.

Lemma 11.4.9 (O separabilitě podmnožin). *V separabilním metrickém prostoru je každá množina separabilní. Obecněji, podmnožina separabilní množiny je separabilní.*

Důkaz. Nechť (P, ϱ) je separabilní metrický prostor a $\{x_n\}$ je jeho spočetná hustá podmnožina a $A \subset P$. Pro každou dvojici $m, n \in \mathbb{N}$ zvolme

$$y_{m,n} \in A \cap \mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n),$$

je-li průnik napravo neprázdný, jinak prvek $y_{m,n}$ nedefinujeme. Zřejmě jsme tím definovali nejvýše spočetnou množinu. Hustota systému $\{y_{m,n}\}$ v A plyne nyní z toho, že ke zvolenému $x \in A$ umíme najít libovolně blízký prvek $x_n \in P$ a jemu se zase umíme přinejmenším srovnatelně přesně přiblížit prvkem $y_{m,n}$ (číslo $\frac{1}{m}$ musí být dost malé, ale zase ne tak malé, aby $\mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n) \cap A = \emptyset$, čemuž ovšem zabráníme, pokud $\frac{1}{m} > \varrho(x, x_n)$). \square

Příklad 11.4.10. Prostor ℓ_∞ není separabilní. Abychom si toto uvědomili, uvažme množinu $\{x_G\}_{G \subset \mathbb{N}} \subset \ell_\infty$, kde i -tý člen posloupnosti x_G definujeme jako 1 pokud $i \in G$ a 0 jinak. Množina $\{x_G\}_{G \subset \mathbb{N}}$ je nespočetná (má mohutnost kontinua, neboť má tolik prvků, kolik je podmnožin přirozených čísel) a každá dvojice jejích různých prvků má vzdálenost rovnu 1.

11.5 Úplné metrické prostory

Nyní se budeme zabývat jemnějším přístupem ke konvergenci posloupnosti. Vzpomeňme si na příklad posloupnosti $\{\frac{1}{n}\}$, která konverguje na \mathbb{R} v obvyklé metrice, ale na prostoru $P = (0, 1)$ s toutéž metrikou konvergentní není. Konvergence posloupnosti je tedy závislá na dvou jevech. Jednak se musí členy posloupnosti někde „hromadit“ (připomeňme, že tuto vlastnost nám na \mathbb{R} charakterizuje B–C podmínka), jednak musí prostor P obsahovat limitní bod. To nás vede k následujícím definicím.

Definice 11.5.1 (Cauchyovská posloupnost). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor. Řekneme, že posloupnost $\{x_n\} \subset P$ je *cauchyovská* v (P, ϱ) , jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad m, n > n_0 \implies \varrho(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Definice 11.5.2 (Úplný metrický prostor). Řekneme, že metrický prostor (P, ϱ) je *úplný*, jestliže každá cauchyovská posloupnost jeho prvků v něm konverguje.

Příklad 11.5.3. (i) Prostor \mathbb{R} s obvyklou metrikou je úplný, podobně $[0, 1]$. Naopak $(0, 1)$, $(0, 1]$ či \mathbb{Q} úplné nejsou.

(ii) Prostor \mathbb{R}^N opatřený kteroukoliv normou, které jsme si na něm představili, je úplný. Skutečně, cauchyovskost posloupnosti v kterékoliv z uvažovaných norem implikuje cauchyovskost jednotlivých složek (vůči metrice generované absolutní hodnotou). Jednotlivé složky tedy konvergují v \mathbb{R} a Věta o vztahu konvergence v normě ke konvergenci po složkách (Věta 11.2.10) dává konvergenci v normě.

(iii) Podle Věty o vztahu konvergence v normě ke konvergenci po složkách je každý konečnědimenzionální normovaný lineární prostor úplný.

(iv) Uvažme prostor $C([-1, 1])$ s metrikou $\varrho(f, g) = (\mathcal{R}) \int_{-1}^1 |f - g| dx$ a posloupnost $\{f_n\} \subset C([-1, 1])$, kde

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in [-1, 0] \\ nx & \text{pro } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 1 & \text{pro } x \in [\frac{1}{n}, 1]. \end{cases}$$

Pro $m > n$ platí

$$\begin{aligned} \varrho(f_n, f_m) &= (\mathcal{R}) \int_{-1}^1 |f_n - f_m| dx = (\mathcal{R}) \int_0^{\frac{1}{n}} |f_n - f_m| dx \\ &\leq (\mathcal{R}) \int_0^{\frac{1}{n}} \left(\max_{[0, \frac{1}{n}]} |f_n| + \max_{[0, \frac{1}{n}]} |f_m| \right) dx = (\mathcal{R}) \int_0^{\frac{1}{n}} (1 + 1) dx = \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

Proto je posloupnost $\{f_n\}$ cauchyovská. Pokud by $\{f_n\}$ měla v našem prostoru limitu f , muselo by pro ni platit $f = 0$ na $(-1, 0)$. Skutečně, pokud by například existovalo $x_0 \in (-1, 0)$ tak, že $f(x_0) > 0$, ze spojitosti by platilo $f > \frac{1}{2}f(x_0)$ na $\mathcal{U}_\delta(x_0)$ pro jisté $\delta \in (0, \min\{|x_0|, |x_0 + 1|\})$ a odtud

$$\begin{aligned} \varrho(f_n, f) &= (\mathcal{R}) \int_{-1}^1 |f_n - f| dx \geq (\mathcal{R}) \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} |f_n - f| dx = (\mathcal{R}) \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} |f| dx \\ &\geq (\mathcal{R}) \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} \frac{1}{2} f(x_0) dx = \delta f(x_0). \end{aligned}$$

Proto by nemohlo platit $f_n \rightarrow f$. Analogicky se dostane, že $f \equiv 1$ na $(0, 1)$. Celkově limitní funkce není spojitá v počátku, což je spor. Proto $\{f_n\}$ není konvergentní a náš metrický prostor není úplný.

(v) Lehkou modifikací předchozích výpočtů se dá ukázat, že prostor $C([-1, 1])$ není úplný s žádnou z integrálních norem, které jsme si na něm představili.

(vi) Ukažme, že prostor $C([a, b])$ opatřený maximovou normou úplný je. Nechť $\{f_n\} \subset C([a, b])$ je cauchyovská posloupnost. Díky definici maximové normy okamžitě dostáváme, že pro každé zafixované $x \in [a, b]$ je posloupnost $\{f_n(x)\} \subset \mathbb{R}$ cauchyovská v \mathbb{R} (s obvyklou metrikou, tedy v úplném prostoru). Označme limitní prvek $f(x)$.

V dalším ukážeme, že zobrazení $x \mapsto f(x)$ je spojitá a $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$. Zafixujme $\varepsilon > 0$. Díky cauchyovskosti $\{f_n\}$ pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\max_{[a, b]} |f_n - f_{n+p}| < \varepsilon \quad \text{pro všechna } n > n_0 \text{ a } p \in \mathbb{N}.$$

Pro každé $x \in [a, b]$ pevné a $n > n_0$ pevné nám limitní přechod $p \rightarrow \infty$ dává (vzpomeňte si na větu o zachování neostré nerovnosti při limitním přechodu)

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

To má pro nás dva důsledky. Jednak okamžitě dostáváme

$$\|f_n - f\| \leq \varepsilon \quad \text{pro všechna } n > n_0,$$

čímž jsme dokázali $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$. Dále pro zafixovaná $n > n_0$ a $x_0 \in [a, b]$ je f_n spojitá v x_0 a existuje tedy $\delta > 0$ tak, že

$$x \in [a, b] \cap \mathcal{U}_\delta(x_0) \quad \implies \quad |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon.$$

Celkově pro $x \in [a, b] \cap \mathcal{U}_\delta(x_0)$ dostáváme

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < 3\varepsilon,$$

čímž jsme dokázali, že funkce f je spojitá v x_0 . Úplnost $C([a, b])$ s maximovou normou je dokázána.

Věta 11.5.4 (O vztahu konvergence a cauchyovskosti). *Nechť (P, ϱ) je metrický prostor. Je-li posloupnost $\{x_n\} \subset P$ konvergentní, pak je cauchyovská.*

Důkaz. Důkaz plyne okamžitě z trojúhelníkové nerovnosti. \square

Definice 11.5.5 (Banachův a Hilbertův prostor). Úplnému normovanému prostoru říkáme *Banachův prostor*. Úplnému prostoru se skalárním součinem říkáme *Hilbertův prostor*. (Úplnost samozřejmě bereme vůči metrice vzniklé z uvedené normy respektive skalárního součinu.)

Poznámka 11.5.6. Zřejmě každý Hilbertův prostor je i Banachův.

Příklad 11.5.7. (i) Prostor $C([a, b])$ opatřený maximovou normou je Banachův prostor.

(ii) Prostor \mathbb{R} s klasickou metrikou je Hilbertův (úplnost nám dává Věta o B–C podmínce, tedy Věta 5.6.1, skalární součin zavádíme jako $(x, y) := xy$).

(iii) Prostor \mathbb{R}^N s eukleidovskou metrikou je Hilbertův. Skalární součin je zde

$$(x, y) = \sum_{i=1}^N x_i y_i,$$

ten generuje právě eukleidovskou normu a metriku. Úplnost už jsme měli (plyne z konvergence po složkách).

(iv) Připomeňme si prostor

$$\ell_2 = \left\{ \{x_i\} \subset \mathbb{R} : \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty \right\}, \quad \varrho(\{x_i\}, \{y_i\}) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Uvedená metrika vznikla ze skalárního součinu (sami si ověřte splnění vlastností skalárního součinu z definice)

$$(\{x_i\}, \{y_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i.$$

Dokažme si ještě úplnost. Necht' $\{x^j\} = \{x_1^j, x_2^j, \dots\} \subset \ell_2$ je cauchyovská posloupnost. To znamená, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^m - x_i^n|^2 < \varepsilon^2 \quad \text{kdykoliv } m, n > n_0. \quad (11.5.1)$$

Proto je každá složka cauchyovská v \mathbb{R} , tedy konvergentní a dostáváme $x = \{x_1, x_2, \dots\}$ takové, že $\{x^j\}$ konverguje k x po složkách.

Ukažme, že $\varrho(x_n, x) \rightarrow 0$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že platí (11.5.1) a odtud pro zafixované $N \in \mathbb{N}$ máme

$$\sum_{i=1}^N |x_i^m - x_i^n|^2 < \varepsilon^2 \quad \text{kdykoliv } m, n > n_0.$$

Při zafixovaném $n > n_0$ provedme limitní přechod $m \rightarrow \infty$ (využíváme konvergenci po složkách, kterých je již jen konečný počet)

$$\sum_{i=1}^N |x_i^n - x_i|^2 \leq \varepsilon^2.$$

Protože N bylo libovolné a součet nekonečné řady je limitou jejích částečných součtů, dostáváme

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^n - x_i|^2 \leq \varepsilon^2,$$

což je $\varrho(x_n, x) \leq \varepsilon$. Ukázali jsme tedy, že $\varrho(x_n, x) \rightarrow 0$.

Zbývá dokázat, že $x \in \ell_2$. Vezměme $n \in \mathbb{N}$ tak, aby $\varrho(x_n, x) \leq 1$. Pak pro libovolné $N \in \mathbb{N}$ platí díky trojúhelníkové nerovnosti

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left(\sum_{i=1}^N |x_i^n - x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^N |x_i^n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 1 + \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 1 + \|x^n\|_2. \end{aligned}$$

Protože tento odhad platí pro každé $N \in \mathbb{N}$, máme

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq 1 + \|x^n\|_2 \quad \implies \quad x \in \ell_2.$$

Celkově je ℓ_2 Hilbertův prostor.

Věta 11.5.8 (Charakterizace úplných podprostorů úplného prostoru). *Necht' je (P, ϱ) úplný metrický prostor a $A \subset P$. Pak*

$$(A, \varrho) \text{ je úplný metrický prostor} \quad \iff \quad A \text{ je uzavřená (v } P).$$

Důkaz. Věta snadno plyne z Věty o charakterizaci uzavřenosti pomocí posloupností (Věta 11.3.27). \square

Příklad 11.5.9. (i) V \mathbb{R} s obvyklou metrikou je $[0, \infty)$ uzavřená množina, a proto je jí odpovídající prostor úplný.

(ii) V $(0, \infty)$ s obvyklou metrikou je $(0, 1]$ uzavřená množina, ale jí odpovídající prostor není úplný. To není ve sporu s větou, neboť původní prostor $(0, \infty)$ není úplný.

(iii) Protože je každý konečnědimenzionální normovaný lineární prostor úplný, je uzavřenou podmnožinou v každém větším úplném prostoru se stejnou normou.

11.6 Omezené a kompaktní množiny

Jedním z hlavních výsledků diferenciálního počtu v jedné dimenzi byla existence globálních extrémů na omezeném uzavřeném intervalu. Podobný výsledek budeme chtít získat i pro obecnější zobrazení z metrického prostoru do \mathbb{R} . Jako první krok budeme hledat správný typ množin, které by nahradily omezený uzavřený interval, na němž se dá aplikovat Weierstrassova věta (Věta 5.5.4). To nás vede k následující definici.

Definice 11.6.1 (Kompaktní množina). Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Řekneme, že A je *kompaktní*, jestliže z každé posloupnosti jejích prvků lze vybrat podposloupnost konvergentní v A .

Poznámka 11.6.2. V \mathbb{R} má tuto vlastnost omezený uzavřený interval, neboť díky omezenosti lze aplikovat Weierstrassovu větu a uzavřenost zaručí, že i limitní hodnota leží v našem intervalu. Zřejmě má stejnou vlastnost jakákoliv omezená uzavřená množina v \mathbb{R} .

Cvičení 11.6.3. Dokažte si, že reálná funkce, která je spojitá na kompaktní podmnožině \mathbb{R} , zde nabývá svých globálních extrémů.

Není těžké ověřit, že množina v \mathbb{R} je kompaktní právě tehdy, když je omezená a uzavřená. Tato informace je pro nás výhodná, neboť kompaktnost je přímo z definice neověřitelná (museli bychom otestovat všechny možné posloupnosti), naproti tomu máme nástroje na ověření omezenosti a uzavřenosti (uzavřená množina je doplněk otevřené, průnik uzavřených je uzavřený, atd.). Nás bude v dalším zajímat, zda lze zjistit kompaktnost pomocí jiných (snáze ověřitelných) vlastností i v obecnějších metrických prostorech.

Definice 11.6.4 (Omezená množina). Nechť (P, ρ) je metrický prostor a $A \subset P$. Řekneme, že A je *omezená*, jestliže existují $x_0 \in P$ a $R > 0$ tak, že $A \subset \mathcal{U}_R(x_0)$.

Poznámka 11.6.5. Díky trojúhelníkové nerovnosti lze v normovaném lineárním prostoru omezenost také charakterizovat existencí $K > 0$ takového, že $\|x\| \leq K$ pro každé $x \in A$.

Poznámka 11.6.6. (i) Budeme také používat pojem *omezená posloupnost*. Jako obvykle tím myslíme, že je omezená množina jejích členů.

(ii) Každá cauchyovská posloupnost je omezená (zvolte $\varepsilon = 1$ v definici cauchyovskosti, pak už je důkaz snadný).

Věta 11.6.7 (Kompaktnost implikuje omezenost a uzavřenost). *Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$ je kompaktní. Pak A je omezená a uzavřená.*

Důkaz. Nejprve pro spor předpokládejme, že A není omezená. Zvolme $x_0 \in A$ pak díky neomezenosti musí existovat $\{x_n\} \subset A$ tak, že $\varrho(x_n, x_0) > n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Díky kompaktnosti A můžeme po přechodu k podposloupnosti předpokládat, že $x_n \rightarrow y$. Díky spojitosti metriky celkově máme

$$\infty \leftarrow \varrho(x_n, x_0) \rightarrow \varrho(y, x_0) < \infty$$

a máme spor.

Nyní dokažme uzavřenost pomocí Věty o charakterizaci uzavřenosti pomocí posloupností (Věta 11.3.26). Nechť $\{x_n\} \subset A$ a $x_n \rightarrow x \in P$. Díky kompaktnosti existuje podposloupnost $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ taková, že $x_{n_k} \rightarrow y \in A$. Nutně potom $x = y$, a proto $x \in A$. \square

Obecně se implikace v předchozí větě nedá otočit.

Příklad 11.6.8. V prostoru ℓ_2 vezměme množinu

$$A = \{x_1, x_2, \dots\} := \{1, 0, 0, \dots\}, \{0, 1, 0, \dots\}, \{0, 0, 1, 0, \dots\}, \dots\}.$$

Pak $\|x_n\|_2 = 1$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, tedy A je omezená. Dále pro $m \neq n$ platí $\|x_m - x_n\|_2 = \sqrt{2}$. To má dva důsledky. Jednak posloupnosti prvků A jsou konvergentní právě tehdy, když jsou od určitého členu konstantní. Konvergentní posloupnosti prvků A mají tedy vždy limitu v A a A je uzavřená. Druhým důsledkem je, že uvážíme-li přímo posloupnost $\{x_n\}$, žádná její podposloupnost není cauchyovská, natož aby konvergovala. Množina A proto není kompaktní.

V konečné dimenzi se ovšem implikace otočit dá.

Věta 11.6.9 (Omezenost a uzavřenost implikují kompaktnost v konečné dimenzi). *V konečnědimenzionálním normovaném lineárním prostoru je každá omezená a uzavřená množina kompaktní.*

Důkaz. Nechť A je omezená uzavřená množina a $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ je báze našeho prostoru. Zvolme posloupnost $\{x_n\} = \{\sum_{j=1}^N \alpha_j^n e_j\} \subset A$. Pak jsou omezené i posloupnosti koeficientů jednotlivých složek $\{\alpha_1^n\}, \{\alpha_2^n\}, \dots, \{\alpha_N^n\}$ (to není zcela zřejmé, neboť nepracujeme s ortogonální bází. Stačí však navázat na postup z důkazu Věty o vztahu konvergence v normě ke konvergenci po složkách, tedy Věty 11.2.10, kde jsme dokázali, že konvergence k nule v normě implikuje konvergenci koeficientů jednotlivých složek k nule. Pokud by totiž po přechodu k podposloupnosti šly třeba koeficienty α_1^n do ∞ , pak by prvky $\frac{x_n}{\alpha_1^n}$ šly v normě k nule, ale koeficient jejich první složky by byl konstantně roven jedné.)

Posloupnosti koeficientů jsou tedy omezené. Postupným přecházením k podposloupnosti (aplikací Weierstrassovy věty, tedy Věty 5.5.4) dosáhneme toho, že tyto koeficienty konvergují k číslům $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$. Proto odpovídající vybraná posloupnost $\{x_{n_k}\}$ konverguje po složkách k $x := \sum_{j=1}^N \alpha_j e_j$. Podle Věty o vztahu konvergence v normě ke konvergenci po složkách (Věta 11.2.10) pak máme $x_{n_k} \rightarrow x$, a protože A je uzavřená, platí $x \in A$. Tím je důkaz dokončen. \square

Věta 11.6.10 (Kompaktnost implikuje separabilitu). *Každá kompaktní podmnožina metrického prostoru je separabilní.*

Důkaz. Nechť A je kompaktní podmnožina (P, ρ) . Nejprve ukažme, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje konečná množina $K_\varepsilon \subset A$ taková, že pro každé $x \in A$ existuje $y \in K_\varepsilon$ tak, že $\rho(x, y) < \varepsilon$. Pokud by tomu tak nebylo, našli bychom posloupnost $\{x_n\} \subset K$ splňující

$$\rho(x_m, x_n) \geq \varepsilon \quad \text{kdykoliv } m \neq n.$$

Totíž, k libovolně (ale pevně) zvolenému prvku $x_1 \in A$ dle předpokladu existuje $x_2 \in A$ tak, že $\rho(x_1, x_2) \geq \varepsilon$. Nyní opět k množině $\{x_1, x_2\}$ existuje prvek $x_3 \in A$ tak, že $\rho(x_3, x_1) \geq \varepsilon$ a $\rho(x_3, x_2) \geq \varepsilon$. Dále postupujeme indukcí.

Z takové posloupnosti bychom však nemohli vybrat konvergentní podposloupnost, což by byl spor s kompaktností A .

Spočetnou hustou podmnožinu K nyní získáme konstrukcí $K_1 \cup K_{\frac{1}{2}} \cup K_{\frac{1}{3}} \cup \dots$ \square

Věta 11.6.11 (Cantorova věta o průniku kompakťů). *Nechť $K_1 \supset K_2 \supset \dots$ je posloupnost neprázdných kompakťů v metrickém prostoru. Pak $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ je neprázdný kompakť.*

Důkaz. Pokud $\{x_n\} \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$, zároveň platí $\{x_n\} \subset K_1$ a po přechodu k podposloupnosti díky kompaktnosti K_1 máme $x_{n_k} \rightarrow x$ v K_1 . Nutně pak také $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$, neboť $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ je uzavřená množina jakožto průnik uzavřených množin. Celkově jsme ověřili kompaktnost $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$.

Ukažme ještě neprázdnost. Sestrojíme „diagonální“ posloupnost $\{x_n\}$ tak, že $x_n \in K_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Po přechodu k podposloupnosti pak máme $x_{n_k} \rightarrow x \in K_1$. Protože od druhého indexu všechny členy leží v K_2 , máme zároveň konvergenci na K_2 , tedy $x \in K_2$. Takto můžeme pokračovat dále a dostáváme $x \in K_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Proto $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ a množina $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ je neprázdná. \square

Cvičení 11.6.12. Dokažte, že každá uzavřená podmnožina kompaktní množiny je kompaktní (použijte Větu o charakterizaci uzavřenosti pomocí posloupností, tedy Větu 11.3.27).

11.7 Pokrývací věty

Budou nás zajímat ještě další vlastnosti kompaktních množin. K jejich odvození použijeme nové nástroje, jimž se říká *pokrývací věty*, a které mají široké uplatnění i v jiných částech matematické analýzy.

Definice 11.7.1 (Pokrytí množiny). Necht' (P, ϱ) je metrický prostor, $A \subset P$, I je indexová množina a $\{M_\alpha\}_{\alpha \in I}$ je systém podmnožin P . Řekneme, že $\{M_\alpha\}$ je *pokrytí* A , jestliže $A \subset \bigcup_{\alpha \in I} M_\alpha$. Jsou-li všechny množiny v systému $\{M_\alpha\}$ otevřené, hovoříme o *otevřeném pokrytí*.

Věta 11.7.2 (Lindelöfova pokrývací věta). *Necht' (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$ je separabilní. Pak lze z každého otevřeného pokrytí množiny A vybrat nejvýše spočetné podpokrytí (podsystem stále pokrývající A).*

Důkaz. Necht' $\{M_\alpha\}_{\alpha \in I}$ je pokrytí A . Necht' dále $\{x_n\}$ je spočetná hustá podmnožina A .

Nejprve tvrdíme, že pro každé $x \in A$ existují $\alpha \in I$ a $m, n \in \mathbb{N}$ tak, že $x \in \Omega_x := \mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset M_\alpha$. Skutečně, díky tomu, že $\{M_\alpha\}$ je otevřené pokrytí, existují α a $R > 0$ tak, že $\mathcal{U}_R(x) \subset M_\alpha$. Zafixujme dále $m > \frac{2}{R}$ (tj. $\frac{1}{m} < \frac{R}{2}$). Díky hustotě $\{x_n\}$ existuje navíc $n \in \mathbb{N}$ tak, že $\varrho(x, x_n) < \frac{1}{m} < \frac{R}{2}$, a proto z trojúhelníkové nerovnosti dostáváme

$$x \in \mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset \mathcal{U}_R(x) \subset M_\alpha.$$

Konečně, systém $\{\Omega_x\}_{x \in A}$ pokrývá A a zároveň je nejvýše spočetný (je to podsystem $\{\mathcal{U}_{\frac{1}{m}}(x_n)\}_{m, n \in \mathbb{N}}$). Ke každé množině z tohoto systému přiřadíme právě jednu množinu ze systému $\{M_\alpha\}$, aby ji obsahovala. Tímto přiřazováním jsme z $\{M_\alpha\}$ získali podsystem požadovaných vlastností. \square

Věta 11.7.3 (Borelova pokrývací věta). *Necht' (P, ϱ) je metrický prostor a $A \subset P$ je kompaktní. Pak lze z každého otevřeného pokrytí množiny A vybrat konečné podpokrytí.*

Důkaz. Protože kompaktnost implikuje separabilitu (Věta 11.3.23), pomocí Lindelöfovy pokrývací věty (Věta 11.7.2) můžeme od obecného otevřeného pokrytí přejít ke spočetnému pokrytí, které v dalším značme $\{M_n\}$. Definujme $G_n = \bigcup_{i=1}^n M_i$, $n \in \mathbb{N}$. Stačí zřejmě ukázat, že existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že $A \subset G_{n_0}$. Pro spor předpokládejme, že to není pravda. Pak jsou $F_n := A \setminus G_n$, $n \in \mathbb{N}$, neprázdné kompakty splňující $F_n \subset F_m$, kdykoliv $m < n$. Cantorova věta o průniku kompaktních (Věta 11.6.11) dává, že

$$F := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A \setminus G_n = A \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$$

je neprázdná kompaktní množina. Proto $\{M_n\}$ nepokrývá A a máme spor. \square

Příklad 11.7.4. Dokažme, že je-li funkce f lokálně lipschitzovská na $[a, b]$, pak je zde dokonce lipschitzovská. Podle předpokladu pro každé $x \in [a, b]$ existují $\delta_x > 0$ a $L_x > 0$ taková, že

$$|f(y) - f(z)| < L_x |y - z| \quad \text{pro každé } y, z \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

Systém $\{(x - \delta_x, x + \delta_x)\}_{x \in [a, b]}$ tvoří otevřené pokrytí intervalu $[a, b]$. Podle Borelovy pokrývací věty existují body $x_1, \dots, x_m \in [a, b]$ takové, že $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$. Položíme-li nyní

$$L := \max\{L_{x_1}, \dots, L_{x_m}\},$$

je již snadné nahlédnout, že L je konstanta lipschitzovskosti funkce f pro celé $[a, b]$.

Poznámka 11.7.5. (i) Funkce $f(x) = \frac{1}{x}$ na $(0, 1]$ a $g(x) = x^2$ na \mathbb{R} ukazují, že v předchozím příkladě byla podstatná jak omezenost tak uzavřenost intervalu $[a, b]$. (ii) Předchozí výsledek se nedá získat postupným plížením, tedy konstrukcí, kdy nejprve vezmeme δ_a a L_a , pak vezmeme bod $x_1 \in (a, a + \delta_a)$ a jemu odpovídající konstanty δ_{x_1} a L_{x_1} (teď už víme, že funkce f je na $[a, x_1 + \delta_{x_1}]$ lipschitzovská s konstantou $\max\{L_a, L_{x_1}\}$), pak vezmeme $x_2 \in (x_1, x_1 + \delta_{x_1})$ a jemu odpovídající konstanty δ_{x_2} a L_{x_2} , atd. Tento proces nemusí fungovat, protože čísla δ_{x_i} se mohou rychle zkracovat a nám se pak nepodaří dosáhnout bodu b v konečném počtu kroků.

Pokrývací věty patří k velmi často používaným nástrojům pokročilé matematické analýzy. Jejich účinnost si můžete vyzkoušet na následujících důkazech souvisejících s látkou předchozího semestru, kde jsme leckdy museli postupovat trikově, zatímco pokrývací věty nám nyní umožňují přímočařejší přístup.

Cvičení 11.7.6. (i) Pomocí Borelovy pokrývací věty dokažte, že je-li f omezená na okolí každého $x \in [a, b]$, pak je omezená na $[a, b]$ (speciálně, je-li f spojitá na $[a, b]$, pak je zde omezená).

(ii) Pomocí Borelovy pokrývací věty dokažte, že je-li $f' > 0$ (i nevlastní) na (a, b) , pak f je rostoucí na (a, b) .

(iii) Pomocí Borelovy pokrývací věty dokažte, že je-li f rostoucí ve všech bodech intervalu (a, b) , pak je rostoucí na (a, b) .

(iv) Pomocí Borelovy pokrývací věty dokažte Cantorovu větu o stejnoměrné spojitosti (Věta 6.2.16).

Dalším pojmem, který chceme zobecnit do vyšší dimenze, je interval.

Definice 11.7.7 (Interval). Intervalem v \mathbb{R}^N nazveme množinu tvaru $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_N$, kde I_1, \dots, I_N jsou intervaly v \mathbb{R} . Je-li množina I otevřená, hovoříme o otevřeném intervalu. Podobně se definují uzavřené, omezené a kompaktní intervaly.

Snadno se dokáže následující charakterizace právě zavedených pojmů.

Tvrzení 11.7.8. *Interval $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_N \subset \mathbb{R}^N$ je otevřený právě tehdy, když je každý z intervalů I_1, \dots, I_N otevřený. Analogická tvrzení platí pro uzavřenost, omezenost a kompaktnost.*

Věta 11.7.9 (Charakterizace otevřené množiny pomocí otevřených intervalů). *Nechť A je otevřená množina v \mathbb{R}^N . Pak existuje spočetný systém otevřených omezených intervalů $\{I_n\}$ takový, že $A = \bigcup I_n$.*

Důkaz. Nechť $A \subset \mathbb{R}^N$. Pracujme s maximovou normou (okolí v této normě jsou otevřené krychle, tedy otevřené intervaly). Podle definice otevřené množiny pro

každý bod $x \in A$ najdeme jeho okolí, které leží celé v A . Snadno nahlédneme, že tato okolí lze volit jako omezené otevřené intervaly. Systém všech těchto okolí je otevřeným pokrytím A . Pomocí Lindelöfovy pokrývací věty (Věta 11.7.2) z něj vybereme spočetný systém a jsme hotovi. \square

11.8 Banachova věta o kontrakci

V dalším si dokážeme větu, která umožňuje řešit některé poměrně obtížné problémy. Nejprve si zadefinujeme základní pojmy.

Definice 11.8.1 (Kontraktivní zobrazení). Nechť (P, ϱ) je metrický prostor a $T: P \rightarrow P$ je zobrazení definované na celém P . Řekneme, že T je *kontraktivní zobrazení* (nebo stručně *kontrakce*), jestliže existuje $q \in [0, 1)$ tak, že

$$\varrho(Tx, Ty) \leq q\varrho(x, y) \quad \text{pro všechna } x, y \in P.$$

Bod x_0 se nazývá *pevný bod* zobrazení T , jestliže $Tx_0 = x_0$.

Věta 11.8.2 (Banachova věta o kontrakci). *Nechť (P, ϱ) je úplný metrický prostor a $T: P \rightarrow P$ je kontraktivní zobrazení definované na celém P . Pak má právě jeden pevný bod.*

Dokonce pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset P$ splňující $x_{n+1} = Tx_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ ($x_1 \in P$ je libovolné) platí $x_n \rightarrow x_0$, kde x_0 je zmíněný pevný bod zobrazení T .

Důkaz. Jednoznačnost plyne z toho, že pro dvojici pevných bodů x_1, x_2 máme

$$\varrho(x_1, x_2) = \varrho(Tx_1, Tx_2) \leq q\varrho(x_1, x_2).$$

Existence plyne z druhé části věty, kterou dokážeme nyní. Nechť $\{x_n\}$ je jako ve znění věty. Díky kontraktivitě T máme pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

$$\begin{aligned} \varrho(x_{n+1}, x_n) &= \varrho(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq q\varrho(x_n, x_{n-1}) = q\varrho(Tx_{n-1}, Tx_{n-2}) \leq \dots \\ &\leq q^{n-1}\varrho(x_2, x_1). \end{aligned}$$

Odtud pro libovolná $p, n \in \mathbb{N}$ máme

$$\begin{aligned} \varrho(x_{n+p}, x_n) &\leq \varrho(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \varrho(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \dots + \varrho(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq q^{n+p-2}\varrho(x_2, x_1) + \dots + q^{n-1}\varrho(x_2, x_1) = \frac{q^{n-1}(1 - q^p)}{1 - q}\varrho(x_2, x_1) \\ &\leq \frac{q^{n-1}}{1 - q}\varrho(x_2, x_1). \end{aligned}$$

Posloupnost $\{x_n\}$ je proto cauchyovská, úplnost (P, ϱ) zaručuje, že $x_n \rightarrow x_0$ pro jisté $x_0 \in P$. Bod x_0 je pevný bod, neboť díky spojitosti metriky máme

$$\varrho(x_0, Tx_0) \leftarrow \varrho(x_{n+1}, Tx_0) = \varrho(Tx_n, Tx_0) \leq q\varrho(x_n, x_0) \rightarrow 0.$$

\square

Příklad 11.8.3. Necht $c_0 \in \mathbb{R}$. Ukažme, že existuje právě jedno řešení úlohy

$$x = \frac{1}{2} \sin x + c_0.$$

Pracujeme na \mathbb{R} s obvyklou metrikou, což je úplný metrický (dokonce normovaný lineární) prostor a zobrazení T definujeme jako

$$Tx = \frac{1}{2} \sin x + c_0.$$

Zobrazení T je kontrakce, neboť pro $x < y$ díky Lagrangeově větě o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) máme (níže $\xi \in (x, y)$)

$$|Ty - Tx| = \frac{1}{2} |\sin y - \sin x| = \frac{1}{2} \cos \xi |y - x| \leq \frac{1}{2} |y - x|.$$

Podle Banachovy věty o kontrakci (Věta 11.8.2) tedy existuje jednoznačně určené řešení zadaného problému, které lze zkonstruovat metodou postupných aproximací.

Příklad 11.8.4. Díky Banachově větě o kontrakci se dá snadno ukázat, že pro $a \in [0, 1]$ iterační metoda zadaná předpisem

$$x_0 = 0, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2}(x_n^2 - a)$$

definuje posloupnost konvergující k \sqrt{a} . Skutečně (v dalším se zabýváme jen případem $a \in (0, 1]$, pro $a = 0$ je vše zřejmé), zdefinujeme-li funkci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$f(t) = t - \frac{1}{2}(t^2 - a),$$

pak číslo \sqrt{a} je jejím pevným bodem. Dále

$$f'(t) = 1 - t.$$

Odtud pro libovolné $x \in [0, \sqrt{a})$ máme podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce (Věta 6.3.3)

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) = (1 - \xi)(x - a).$$

Pro libovolné zafixované $\delta > 0$ je proto f kontrakcí na $[\delta, \sqrt{a}]$ a podle Banachovy věty o kontrakci (Věta 11.8.2) má jediný pevný bod \sqrt{a} . Na naši posloupnost tento výsledek aplikujeme následovně. Podle výpočtu uvedeného výše platí $x_1 \in (0, \sqrt{a})$. Nyní zafixujeme $\delta \in (0, x_1)$ a Banachovu větu o kontrakci použijeme na posloupnost $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, úplný metrický prostor $C([\delta, \sqrt{a}])$ a kontrakci f .

Poznámka 11.8.5. (i) Předpoklad o úplnosti není možné vypustit. Kupříkladu $f(x) = \frac{x}{2}$ je kontrakce na $(0, 1)$, ale nemá zde pevný bod.

(ii) Funkce $f(x) = \frac{x}{2}$ nemá pevný bod na úplném prostoru $[1, 2]$. Není to totiž kontrakce na tomto prostoru (špatný obor hodnot).

(iii) Kontraktivitu není možné nahradit neexpanzivitou (ta připouští $q \leq 1$), jak ukazuje volba $f(x) = x + 1$ na \mathbb{R} .

11.9 Limita a spojitost zobrazení na metrických prostorech

Definice 11.9.1 (Limita zobrazení). Necht (P_1, ρ_1) a (P_2, ρ_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$, $x_0 \in P_1$ je hromadným bodem D_φ a $y_0 \in P_2$. Řekneme, že zobrazení φ má v bodě x_0 *limitu* y_0 , jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \cap D_\varphi \implies \varphi(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(y_0).$$

V takovém případě píšeme $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = y_0$, nebo $\varphi(x) \rightarrow y_0$ pro $x \rightarrow x_0$.

Poznámka 11.9.2. (i) V případě \mathbb{R} s obvyklou metrikou se nová definice shoduje s naší starou definicí vlastní limity ve vlastních bodech.

(ii) Nevlastními limitami se zde nezabýváme, neboť \mathbb{R}^* není metrický prostor (prvky $\pm\infty$ nemají definovanou konečnou vzdálenost od ostatních prvků).

Definice 11.9.3 (Spojitost zobrazení). Necht (P_1, ρ_1) a (P_2, ρ_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ a $x_0 \in D_\varphi$. Řekneme, že zobrazení φ je v bodě x_0 *spojité*, jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad x \in \mathcal{U}_\delta(x_0) \cap D_\varphi \implies \varphi(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x_0)).$$

Poznámka 11.9.4. Limita a spojitost jsou invariantní vůči přechodu k ekvivalentní metrice jak ve vzoru, tak v obraze.

Poznámka 11.9.5. Je-li x_0 izolovaný bod D_φ , je v něm φ automaticky spojitě. V opačném případě je spojitost ekvivalentní podmínce $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Příklad 11.9.6. (i) Uvažme \mathbb{R}^2 s eukleidovskou metrikou, \mathbb{R} s obvyklou metrikou a definujme $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{pro } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{pro } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pomocí Youngovy nerovnosti dostáváme pro $(x, y) \neq (0, 0)$

$$0 \leq |\varphi(x, y)| = \left| \frac{xy^2}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{1}{2}|y| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

Odtud vidíme, že $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varphi(x, y) = 0$ a φ je spojitě v počátku.

(ii) Uvažme stejné prostory a zobrazení

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{pro } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{pro } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pro libovolné $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ máme

$$\varphi(x, 0) = 0 \quad \text{a} \quad \varphi(x, x) = \frac{1}{2}.$$

Protože se v každém prstencovém okolí bodu $(0, 0)$ vyskytují body výše uvedených typů, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varphi(x, y)$ neexistuje a φ není spojitě v počátku.

(iii) Uvažme prostor $C^1([0, 1])$ s normou

$$\|f\|_{C^1} = \max_{[0,1]} |f'| + \max_{[0,1]} |f|$$

a prostor $C([0, 1])$ s maximovou normou, tedy $\|f\|_\infty = \max_{[0,1]} f$. Definujme zobrazení $\varphi: C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ předpisem $\varphi(f) = f'$. Pak φ je spojitě v každém $f \in C^1([0, 1])$, neboť pro každé $g \in C^1([0, 1])$ máme při volbě $\delta := \varepsilon$

$$\|g - f\|_{C^1} < \delta \implies \max_{[0,1]} |g' - f'| < \delta \iff \|g' - f'\|_\infty < \varepsilon \iff \|\varphi(g) - \varphi(f)\|_\infty < \varepsilon.$$

Poznámka 11.9.7. Pro zobrazení $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$, kde (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, a množinu $A \subset P_1$ se někdy používají pojmy limita vzhledem k A a spojitost vzhledem k A . Ty se zavádějí tak, že nejprve zúžíme definiční obor na $D_\varphi \cap A$ a na výsledné zobrazení teprve pak použijeme definici limity či spojitosti.

Povšimněte si, že spojitost vzhledem k A není totéž co spojitost na A . Například Dirichletova funkce je spojitá vzhledem k \mathbb{Q} ve kterémkoliv bodě z \mathbb{Q} (z definičního oboru jsme vyloučili všechna iracionální čísla, zbyly jen body s funkční hodnotou 1). Dirichletova funkce však není (klasicky) spojitá v žádném bodě.

Těmto novým pojmům nemusíme věnovat v budování teorie větší pozornost, vše se dá vyřešit zúžením definičního oboru. Na to jsme v naší teorii připraveni, neboť připouštíme zobrazení, jejichž definiční obor není celá množina P_1 .

V dalším si uvedeme několik vět, jejichž důkazy se získají jen minimální modifikací důkazů odpovídajících tvrzení z teorie funkcí jedné reálné proměnné.

Věta 11.9.8 (Heineho věta). *Nechť (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$, $x_0 \in P_1$ je hromadným bodem D_φ a $y_0 \in P_2$. Pak*

(i) $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = y_0$ právě tehdy, když pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_\varphi \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \rightarrow x_0$ platí $\varphi(x_n) \rightarrow y_0$.

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ existuje právě tehdy, když pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_\varphi \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \rightarrow x_0$ existuje limita posloupnosti $\{\varphi(x_n)\}$.

Věta 11.9.9 (O B–C podmínce). *Nechť (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, (P_2, ϱ_2) je úplný, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ a $x_0 \in P_1$ je hromadným bodem D_φ . Pak $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ existuje právě tehdy, když zobrazení φ splňuje B–C podmínku ($\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad x, y \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \cap D_\varphi \implies \varrho_2(\varphi(x), \varphi(y)) < \varepsilon$).*

Věta 11.9.10 (O spojitosti složeného zobrazení). *Nechť (P_1, ϱ_1) , (P_2, ϱ_2) a (P_3, ϱ_3) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ a $\psi: P_2 \rightarrow P_3$. Je-li φ spojitě v $x_0 \in P_1$ a ψ spojitě v $\varphi(x_0)$, pak $\psi \circ \varphi$ je spojitě v x_0 .*

Věta 11.9.11 (O limitě složeného zobrazení). *Nechť (P_1, ϱ_1) , (P_2, ϱ_2) a (P_3, ϱ_3) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ a $\psi: P_2 \rightarrow P_3$ a necht $x_0 \in P_1$. Necht $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = y_0 \in P_2$, $\lim_{y \rightarrow y_0} \psi(y) = z_0 \in P_3$, x_0 je hromadným bodem $D_{\psi \circ \varphi}$ a je splněna alespoň jedna z podmínek*

(i) existuje prstencové okolí bodu x_0 , kde vnitřní zobrazení φ nenabývá své limitní hodnoty y_0

(ii) vnější zobrazení ψ je spojité v bodě y_0 .

Pak $\lim_{x \rightarrow x_0} (\psi \circ \varphi)(x) = z_0$.

Věta 11.9.12 (Cantorova věta o stejnoměrné spojitosti). *Nechť (P_1, ϱ_1) , (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ je spojité na $A \subset P_1$ a A je kompaktní. Pak φ je stejnoměrně spojité na A ($\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad x, y \in A \wedge \varrho_1(x, y) < \delta \Rightarrow \varrho_2(\varphi(x), \varphi(y)) < \varepsilon$).*

Ve speciálním případě zobrazení z \mathbb{R}^N do \mathbb{R} (na \mathbb{R} uvažujeme obvyklou metriku, na \mathbb{R}^N metriku odvozenou od libovolné normy) máme ještě další výsledky, jejichž důkaz se opět získá jen drobnou modifikací důkazu z jednodimenzionálního případu.

Věta 11.9.13 (Aritmetika limit). *Nechť $\varphi, \psi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, kde oba prostory bereme s obvyklými metrikami, a necht $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadný bod $D_\varphi \cap D_\psi$. Necht $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A \in \mathbb{R}$ a $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = B \in \mathbb{R}$. Pak*

(i) $\lim_{x \rightarrow x_0} (\varphi(x) + \psi(x)) = A + B$

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)\psi(x) = AB$

(iii) pokud $B \neq 0$, platí $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{A}{B}$.

Poznámka 11.9.14. Automaticky také platí aritmetika spojitosti.

Věta 11.9.15 (O dvou strážnicích). *Nechť $\varphi, \psi, \eta: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, kde oba prostory bereme s obvyklými metrikami, $D_\varphi = D_\psi = D_\eta$, a $x_0 \in \mathbb{R}^N$ je hromadný bod D_φ . Necht $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \eta(x) = A \in \mathbb{R}$ a $\varphi \leq \psi \leq \eta$ na $\mathcal{P}_\delta(x_0) \cap D_\varphi$ pro jisté $\delta > 0$. Pak $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = A$.*

Věta 11.9.16 (O nabývání extrémů spojitou funkcí). *Nechť $\varphi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, kde oba prostory bereme s obvyklými metrikami, je spojité na kompaktní množině $A \subset \mathbb{R}^N$. Pak zde nabývá svého maxima a minima (existují $x_1, x_2 \in A$ tak, že $\max_A f = f(x_1)$ a $\min_A f = f(x_2)$).*

Poznámka 11.9.17. Je-li $\varphi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ spojité v bodě $a = [a_1, a_2, \dots, a_N] \in \mathbb{R}^N$, snadno se dá ověřit (použijte maximovou normu), že funkce φ je spojitá v jednotlivých proměnných v odpovídajících bodech, přesněji $t \mapsto \varphi(t, a_2, a_3, \dots, a_N)$ je spojitá v bodě a_1 , $t \mapsto \varphi(t, a_2, a_3, \dots, a_N)$ je spojitá v bodě a_2 a tak dále pro všech N složek funkce φ . Implikace se obrátit nedá. Definujeme-li totiž

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{pro } xy \neq 0 \\ 1 & \text{pro } xy = 0 \end{cases}$$

(funkce má hodnotu 1 na osovém kříži, všude jinde je nulová), pak naše funkce není spojitá v bodě $[0, 0]$. Naproti tomu podle proměnné x i y zvlášť funkce spojitá v počátku (teď už jednodimenzionálním) je, neboť tyto funkce pracují pouze s hodnotami na osovém kříži.

Podobně jako u funkcí jedné proměnné, i ve vyšší dimenzi se spojitost nejčastěji ověřuje pomocí aritmetiky spojitosti (počítání limit přichází na řadu pouze v problematických bodech).

Příklad 11.9.18. Ukažme, že funkce $\varphi(x, y) = x^2 + xy + \sin(xy)$ je spojitá na \mathbb{R}^2 . Předně si dokážeme, že funkce $\eta: (x, y) \mapsto x$ je spojitá na \mathbb{R}^2 . Zvolme $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Jednodimenzionální funkce $\psi: x \mapsto x$ je spojitá na celém \mathbb{R} . Speciálně k zadanému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$x \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \quad \implies \quad \psi(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(\psi(x_0)).$$

Odtud díky tomu, že $\eta(x, y) = \psi(x)$ na \mathbb{R}^2 , máme

$$(x, y) \in \mathcal{P}_\delta(x_0) \times \mathbb{R} \quad \implies \quad \eta(x, y) \in \mathcal{U}_\varepsilon(\psi(x_0)).$$

Bez ohledu na normu zvolenou na \mathbb{R}^2 dostáváme

$$\mathcal{P}_\delta((x_0, y_0)) \subset \mathcal{P}_\delta(x_0) \times \mathbb{R}$$

(nalevo \mathcal{P} značí dvoudimenzionální prstencová okolí, napravo jednodimenzionální). Předchozí úvahy se zřejmě dají zobecnit: pokud funkce více proměnných nezávisí na některých proměnných, její spojitost je ekvivalentní spojitosti funkce získané její restrikcí do prostoru nižší dimenze odpovídajícímu proměnným, na kterých funkce závisí.

Nyní již stačí použít aritmetiku spojitosti na první dva členy v zadání funkce φ , spojitost třetího členu plyne z Věty o spojitosti složeného zobrazení (Věta 11.9.10). Celkově díky aritmetice spojitosti je φ spojitá na \mathbb{R}^2 .

Představme si ještě jednu charakterizaci spojitosti.

Věta 11.9.19 (O vzoru otevřených množin při spojitém zobrazení). *Mějme metrické prostory (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) , $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ a $D_\varphi = P_1$. Pak φ je spojitý na P_1 právě tehdy, když pro každou otevřenou množinu $A \subset P_2$ je její vzor $\varphi^{-1}(A)$ otevřený.*

Důkaz. „ \implies “ Zvolme $A \subset P_2$ otevřenou. Pokud $\varphi^{-1}(A) = \emptyset$, jsme hotovi. V opačném případě zafixujme $x \in \varphi^{-1}(A)$. Odtud $\varphi(x) \in A$ a otevřenost A dává $\varepsilon > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x)) \subset A$. Ze spojitosti existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\varphi(\mathcal{U}_\delta(x)) \subset \mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x)) \subset A.$$

Ukázali jsme tedy, že $\mathcal{U}_\delta(x) \subset \varphi^{-1}(A)$. Protože $x \in \varphi^{-1}(A)$ bylo libovolné, dokázali jsme otevřenost $\varphi^{-1}(A)$.

„ \impliedby “ Pro každé $x \in P_1$ a $\varepsilon > 0$ je $\varphi^{-1}(\mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x)))$ otevřená množina. Existuje proto $\delta > 0$ takové, že

$$\mathcal{U}_\delta(x) \subset \varphi^{-1}(\mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x))) \quad \implies \quad \varphi(\mathcal{U}_\delta(x)) \subset \mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x)).$$

Dokázali jsme implikaci $y \in \mathcal{U}_\delta(x) \implies \varphi(y) \in \mathcal{U}_\varepsilon(\varphi(x))$ a tím jsme ověřili spojitost φ v x . \square

Poznámka 11.9.20. Připomeňme, že vzor množiny $A \subset P_2$ je definován jako

$$\varphi^{-1}(A) = \{x \in P_1 : \varphi(x) \in A\}.$$

Množina A nemusí být podmnožinou oboru hodnot.

Poznámka 11.9.21. (i) Předchozí věta se často používá k důkazu otevřenosti množin. Stačí najít vhodné spojitě zobrazení a vhodnou otevřenou množinu tak, aby naše množina byla vzorem nalezené množiny při nalezeném zobrazení.

(ii) Je-li φ definováno na celém P_1 , pak pro libovolnou množinu $A \subset P_2$ je doplněk jejího vzoru zároveň vzorem jejího doplňku ($\varphi^{-1}(P_2 \setminus A) = P_1 \setminus \varphi^{-1}(A)$). Odtud dostáváme ještě třetí ekvivalentní výrok a sice, že vzor každé uzavřené množiny je uzavřený.

Příklad 11.9.22. Ukažme, že množina $M := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 < \sin(xy)\}$ je otevřená. Definujme $\varphi : (x, y) \mapsto x^2 - \sin(xy)$. Pomocí aritmetiky spojitosti snadno ověříme, že se jedná o spojitou funkci na celém \mathbb{R}^2 . Pak $M = \varphi^{-1}((-\infty, 0))$, a proto je otevřená ($(-\infty, 0)$ je otevřená).

Poznámka 11.9.23. Ve větě je důležitý předpoklad $D_\varphi = P_1$. Bez tohoto předpokladu věta neplatí. Stačí uvážit zobrazení $f : M \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, kde

$$M = (0, 1) \cup \{2\},$$

$$f(x) = x \text{ pro } x \in (0, 1) \text{ a } f(2) = \frac{1}{2}.$$

Poznámka 11.9.24. Analogie předchozí věty neplatí pro obraz. Například interval $(-\pi, \pi)$ je otevřená množina, ale $\sin((-\pi, \pi)) = [-1, 1]$ je uzavřená množina.

V případě kompaktních množin, však analogie pro obraz při spojitěm zobrazení platí.

Věta 11.9.25 (O obrazu kompaktní množiny při spojitěm zobrazení). *Nechť (P_1, ϱ_1) a (P_2, ϱ_2) jsou metrické prostory, $\varphi : P_1 \rightarrow P_2$, $D_\varphi = P_1$, $A \subset P_1$ je kompaktní a φ je spojitě na A . Pak $\varphi(A)$ je kompaktní.*

Důkaz. Nechť $\{y_n\} \subset \varphi(A)$, pak existují body $x_n \in A$ takové, že $y_n = \varphi(x_n)$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Díky kompaktnosti A dostáváme $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ takovou, že x_{n_k} konverguje k jistému $x \in A$. Díky spojitosti φ dostáváme $y_{n_k} = \varphi(x_{n_k}) \rightarrow \varphi(x)$. Posloupnost $\{y_n\}$ má tedy podposloupnost konvergentní v A a jsme hotovi. \square

Poznámka 11.9.26. Vzor kompaktní množiny při spojitěm zobrazení být kompaktní nemusí. Uvažme například

$$\mathbb{R} = \sin^{-1}([-1, 1]).$$

Poznámka 11.9.27. Pokud je v předchozí větě zobrazení φ navíc prosté na A , je $\varphi^{-1} : \varphi(A) \rightarrow A$ spojitá na A . Skutečně, pokud by tomu tak nebylo, měli bychom posloupnost $\{y_n\} \subset \varphi(A)$ a $y_0 \in \varphi(A)$ takové, že $y_n \rightarrow y_0$ v P_2 , ale pro $x_n := \varphi^{-1}(y_n)$ s $x_0 := \varphi^{-1}(y_0)$ by platilo

$$\varrho_1(x_n, x_0) \geq \varepsilon$$

pro jisté $\varepsilon > 0$. Na druhou stranu, díky kompaktnosti A umíme najít $x \in A$ a $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ tak, aby $x_{n_k} \rightarrow x$. Spojitost metriky pak dává $\varrho(x_0, x) \geq \varepsilon$ (tedy $x \neq x_0$) a spojitost φ dává $y_{n_k} = \varphi(x_{n_k}) \rightarrow \varphi(x)$. Proto $\varphi(x) = y_0 = \varphi(x_0)$ a máme spor s prostotou φ na A .

Poznámka 11.9.28. Předchozí věta se dá také používat k elegantním důkazům spojitosti zobrazení získaných pomocí zobrazení, jejichž spojitost už máme dokázanou. Nechtě například $(P_1, \varphi_1), (P_2, \varphi_2), (P_3, \varphi_3)$ jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$ je spojitě na P_1 a $\psi: P_2 \rightarrow P_3$ je spojitě na P_2 . Je-li $A \subset P_3$ libovolná otevřená množina, pak díky spojitosti ψ je $\psi^{-1}(A)$ také otevřená. Proto díky spojitosti φ je otevřená také množina $(\psi \circ \varphi)^{-1}(A) = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(A))$. Dokázali jsme, že $\psi \circ \varphi$ je spojitě na P_1 .

Poznámka 11.9.29. (i) Podobor matematické analýzy, který se zabývá podrobněji metrickými prostory a jim příbuznými tématy, se nazývá funkcionální analýza. Funkcionální analýza navíc navazuje na lineární algebru a topologii.

(ii) Topologie se zabývá vztahem mezi vlastnostmi prostoru a vlastnostmi sady jeho otevřených množin (připomeňme, že pro metrické prostory umíme konvergenci zavést dvěma způsoby: jednak přes metriku pomocí podmínky $\varrho(x_n, x) \rightarrow 0$, ale také pomocí okolí, což jsou otevřené koule v uvažovaném metrickém prostoru). Oproti našim zvyklostem, v topologii bývá zvykem okolím bodu nazývat jakoukoliv množinu obsahující nějakou otevřenou kouli centrovanou v uvedeném bodě.

11.10 Dodatek: Hustota polynomů v $C([a, b])$ a separabilita $C([a, b])$

Nyní si ukážeme, že v maximové metrice je spojitou funkci na omezeném uzavřeném intervalu možné libovolně přesně aproximovat polynomem (na \mathbb{R} to nejde, uvažte exponenciálu a to, že pro libovolný polynom P platí $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - P(x)) = \infty$). Přípravu začneme aproximací charakteristické funkce intervalu.

Lemma 11.10.1. *Nechť $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $\eta \in (0, 1)$ a $\delta \in (0, c - a)$. Pak existuje polynom T tak, že*

$$T(x) \in \begin{cases} (1 - \eta, 1] & \text{na } [a, c - \delta] \\ [0, 1] & \text{na } [c - \delta, c] \\ [0, \eta] & \text{na } [c, b]. \end{cases}$$

Důkaz. Krok 1.: hrubá aproximace funkce $\chi_{[c - \frac{1}{2}\delta, b]}$.

Položme

$$Q(x) = \frac{1}{2} + \frac{x - (c - \frac{1}{2}\delta)}{2(b - a)}.$$

Pak Q je polynom splňující $Q \in [0, \frac{1}{2}]$ na $[a, c - \frac{1}{2}\delta]$ a $Q \in [\frac{1}{2}, 1]$ na $[c - \frac{1}{2}\delta, b]$.

Krok 2.: zpřesnění aproximace umocněním.

Pro zafixované $n \in \mathbb{N}$ položme

$$T(x) = (1 - Q^n(x))^{2^n}.$$

Ve zbytku důkazu ukážeme, že je-li n dostatečně velké, pak T má požadované vlastnosti. Předně zřejmě máme $T \in [0, 1]$ na $[a, b]$. Dále Bernoulliho nerovnost na $[a, c - \delta]$ dává spolu s $\max_{[a, c - \delta]} Q = Q(c - \delta) < Q(c - \frac{1}{2}\delta) = \frac{1}{2}$

$$\min_{[a, c - \delta]} T \geq 1 - 2^n \max_{[a, c - \delta]} Q^n = 1 - (2 \max_{[a, c - \delta]} Q)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Konečně, díky $\min_{[c, b]} Q = Q(c) > \frac{1}{2}$, na $[c, b]$ platí

$$\begin{aligned} \max_{[c, b]} T &= (1 - Q^n(c))^{2^n} = \frac{1}{(1 + Q^n(c))^{2^n}} (1 - Q^{2^n}(c))^{2^n} \leq \frac{1}{(1 + Q^n(c))^{2^n}} \\ &\leq \frac{1}{1 + 2^n Q^n(c)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Proto pro n dostatečně velké máme polynom s požadovanými vlastnostmi. \square

Věta 11.10.2 (Weierstrassova aproximační věta). *Nechť $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f \in C([a, b])$ a $\varepsilon > 0$. Pak existuje polynom P takový, že*

$$\max_{[a, b]} |f - P| < \varepsilon.$$

Důkaz. K zadanému $\varepsilon > 0$ a f definujeme množinu

$$S = \left\{ t \in [a, b] : \text{existuje polynom } Q \text{ splňující } \max_{[a, t]} |f - Q| < \varepsilon \right\}.$$

Označme $s = \sup S$. Protože f je zprava spojitá v a , je $|f - f(a)| < \varepsilon$ na jistém pravém okolí bodu a . Odtud $S \neq \emptyset$ a $s > a$ (aproximovali jsme konstantním polynomem). Pokud by platilo $s \geq b$, byli bychom hotovi. V dalším se tedy zabýváme případem $s \in (a, b)$ a odvodíme spor.

Ze spojitosti f v bodě s dostáváme $\delta \in (0, \frac{1}{2} \min\{s - a, b - s\})$ tak, že

$$|f - f(s)| < \frac{1}{2}\varepsilon \quad \text{na } [s - 2\delta, s + 2\delta].$$

Definujeme $c := s - \delta$. Pak $c \in S$ a existuje polynom Q tak, že

$$m := \max_{[a, c]} |f - Q| < \varepsilon.$$

Definujeme dále $M := \sup_{[a, b]} |f - Q| + \sup_{[a, b]} |f - f(s)|$. Konečně zafixujeme $\eta > 0$ tak malé, že

$$m + M\eta < \varepsilon \quad \text{a} \quad M\eta < \frac{1}{2}\varepsilon.$$

Použijme nyní předchozí lemma k získání polynomu T pro parametry a, b, c, δ, η a definujeme

$$P(x) := f(s) + (Q(x) - f(s))T(x).$$

Funkce P je polynom. Na intervalu $[a, c - \delta]$ platí

$$|f(x) - P(x)| \leq |f(x) - Q(x)|T(x) + |f(x) - f(s)|(1 - T(x)) \leq m + M\eta < \varepsilon.$$

Na intervalu $[c - \delta, c]$ platí

$$\begin{aligned} |f(x) - P(x)| &\leq |f(x) - Q(x)|T(x) + |f(x) - f(s)|(1 - T(x)) \\ &\leq mT(x) + \frac{1}{2}\varepsilon(1 - T(x)) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Konečně, na $[c, s + 2\delta)$ dostáváme

$$|f(x) - P(x)| \leq |f(x) - Q(x)|T(x) + |f(x) - f(s)|(1 - T(x)) \leq M\eta + \frac{1}{2}\varepsilon < \varepsilon.$$

Celkově máme $|f - P| < \varepsilon$ na $[a, s + 2\delta)$, z čehož plyne

$$\max_{[a, s+2\delta]} |f - P| < \varepsilon$$

($f - P$ je spojitá funkce na $[a, s + 2\delta]$, a proto zde nabývá maxima) a to dává spor s $s = \sup S$. \square

Důsledek 11.10.3. *Prostor $C([a, b])$ s maximovou metrikou je separabilní.*

Důkaz. Každou spojitou funkci umíme aproximovat polynomem a ten zase polynomem s racionálními koeficienty (promyslete si podrobnosti). Množina polynomů pevného stupně s racionálními koeficienty je spočetná, neboť konečný kartézský součin spočetných množin je spočetný (v kapitole o mohutnosti jsme si ukázali konstrukci odpovídající posloupnosti). Množinu všech polynomů s racionálními koeficienty získáme sjednocením předchozích množin přes všechny stupně. Je tedy spočetná, neboť sjednocení spočetného systému spočetných množin je spočetné. \square

Příklad 11.10.4. Dokažme, že pro $f \in C([0, 2\pi])$ platí

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) \, dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Pro funkce z $C^1([0, 2\pi])$ výsledek platí, neboť můžeme použít integraci per partes a ta dává

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) \, dx \right| &= \left| \left[f(x) \frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(x) \frac{\sin(nx)}{n} \, dx \right| \\ &= \left| \int_0^{2\pi} f'(x) \frac{\sin(nx)}{n} \, dx \right| \leq \int_0^{2\pi} \max_{[0, 2\pi]} |f'| \frac{1}{n} \, dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

V obecném případě k $f \in C([a, b])$ a $\varepsilon > 0$ vezmeme polynom P z Weierstrassovy aproximační věty (Věta 11.10.2), pro který platí

$$\max_{[0, 2\pi]} |f - P| < \varepsilon.$$

Díky této vlastnosti a tomu, že $P \in C^1([0, 2\pi])$, pro $n \in \mathbb{N}$ dostatečně velké dostáváme rozhodující odhad

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx \right| &\leq \left| \int_0^{2\pi} (f(x) - P(x)) \cos(nx) dx \right| + \left| \int_0^{2\pi} P(x) \cos(nx) dx \right| \\ &\leq 2\pi\varepsilon + \varepsilon. \end{aligned}$$

Cvičení 11.10.5. Nechť $f \in C([a, b])$ a

$$\int_a^b f(x)x^k dx = 0 \quad \text{pro každé } k \in \mathbb{N}_0.$$

Ukažte, že pak $f \equiv 0$ na $[a, b]$. (Návod: nejprve ukažte, že $\int_a^b f(x)P(x) dx = 0$ pro každý polynom P , pak použijte Weierstrassovu aproximační větu (Věta 11.10.2) podobně jako v minulém příkladu k důkazu $\int_a^b f^2(x) dx = 0$. Nakonec ukažte, že je-li f nenulová v nějakém bodě, má díky spojitosti srovnatelnou hodnotu na nějakém jeho okolí, a proto integrál z její druhé mocniny nemůže být nulový.)

Poznámka 11.10.6. (i) Zde bychom čtenáře rádi upozornili na závažnost právě představeného postupu. Doposud jsme si práci na důkazech usnadňovali jen používáním různých symetrií (kupříkladu všechny výsledky pro konkávnost se dají získat drobnou modifikací důkazů analogických tvrzení pro konvexitu či jen přechodem k funkci $-f$) a vyšetřováním nejhorsích případů (při důkazu aritmetiky nevlastních limit je nejtěžším případem dvojice vlastních limit, protože s výrazy typu „ $\infty - \infty$ “ věta odmítá pracovat, v případě „ $\infty + \infty$ “ je důkaz velice jednoduchý, atd.). Naše nová technika funguje přesně obráceně. Umožňuje nám pracovat ve velice příznivém případě, třebaže tyto případy jsou oproti všem ostatním velice vzácné (funkce z $C^1([a, b])$ jsou mezi funkcemi z $C([a, b])$ skutečně velmi vzácné, vlastnost mít derivaci znamená mít obě jednostranné derivace a tyto derivace se musejí rovnat, což u dvojice reálných čísel nastává velice zřídka). Cenou, kterou za tento luxus musíme zaplatit je ověření, že dokazovaná vlastnost se zachovává při konvergenci ve studovaném metrickém prostoru a že používaná množina „hezkých“ prvků je skutečně hustá (ale to u běžně používaných metrických prostorů bývají dobře známé výsledky, které se dokazují mezi prvními, když se takový prostor zavede).

(ii) Na obvykle používaných metrických prostorech tvořených funkcemi nad otevřenou množinou $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ se k výše popsaným účelům nejčastěji používá množina $C_0^\infty(\Omega)$, což je množina nekonečněkrát diferencovatelných funkcí s kompaktním nosičem, přičemž nosič funkce je definován jako uzávěr podmnožiny definičního oboru, kde je funkce nenulová. Do $C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$ patří třeba funkce

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\|x\|_2^2 - 1}\right) & \text{pro } \|x\|_2 < 1 \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

(zde symbol $\|x\|_2$ značí eukleidovskou normu bodu $x \in \mathbb{R}^N$).

11.11 Dodatek: Existenční věty pro ODR 1.řádu

Významnou aplikací Banachovy věty o kontrakci (Věta 11.8.2) je důkaz Picard–Lindelöfovy existenční věty (existence a jednoznačnost řešení systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu, Věta 8.3.5). Tento důležitý výsledek z teorie obyčejných diferenciálních rovnic si nyní dokážeme. Nejprve si připomeňme znění věty.

Věta 11.11.1 (Picard–Lindelöfova existenční věta). *Nechť $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ a \mathbf{F} je na Ω lokálně Lipschitzovská vzhledem k poslední n -tici proměnných. Pak existuje $\delta > 0$ tak, že na intervalu $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje právě jedno řešení Cauchyovy úlohy pro systém rovnic $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y})$ s počáteční podmínkou $\mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0$.*

Důkaz. Abychom měli co nejjednodušší značení, podrobný důkaz uvedeme jen pro případ jedné obyčejné diferenciální rovnice. Na jeho konci uvedeme seznam změn, které vyžaduje důkaz v případě soustavy rovnic.

V dalším tedy uvažujeme úlohu

$$y' = f(x, y) \quad y(x_0) = y_0, \quad (11.11.1)$$

kde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, f je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \in \Omega$ a existují $\delta, L > 0$ tak, že $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta] \subset \Omega$ a

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad (11.11.2)$$

kdykoliv $(x, y_1), (x, y_2) \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$.

Krok 1: integrální formulace úlohy.

Zkoumejme vztah

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt. \quad (11.11.3)$$

Tvrdíme, že je-li $\tau > 0$, pak spojitá funkce y řeší úlohu (11.11.1) na $(x_0 - \tau, x_0 + \tau)$ právě tehdy, když splňuje (11.11.3) na $(x_0 - \tau, x_0 + \tau)$. Skutečně, pokud y řeší úlohu (11.11.1) na $(x_0 - \tau, x_0 + \tau)$, snadno nahlédneme, že $y \in C^1((x_0 - \tau, x_0 + \tau))$ a po integraci máme

$$y(x) - y_0 = y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^x y'(t) dt = \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt.$$

Obrácenou implikaci získáme zderivováním (11.11.3) (můžeme zderivovat pravou stranu, protože $t \mapsto f(t, y(t))$ je spojitá funkce).

Krok 2: volba metrického prostoru (P, ϱ) .

Díky spojitosti f na Ω existuje $K > 0$ splňující

$$|f(x, y)| \leq K \quad \text{na } [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta].$$

Nyní zafixujme $\tau \in (0, \delta)$ tak malé, aby platilo

$$L\tau < 1 \quad \text{a} \quad [y_0 - K\tau, y_0 + K\tau] \subset [y_0 - \delta, y_0 + \delta].$$

Konečně, definujme prostor (P, ρ) tak, že

$$P := \{\varphi \in C([x_0 - \tau, x_0 + \tau]): \varphi(x) \in [y_0 - K\tau, y_0 + K\tau] \text{ na } [x_0 - \tau, x_0 + \tau]\}$$

a ρ je maximová metrika.

Krok 3: úplnost metrického prostoru (P, ρ) .

Předpokládejme, že $\{\varphi_n\}$ je cauchyovská posloupnost v (P, ρ) . V důkazu úplnosti prostoru $C([a, b])$ opatřeného maximovou normou (Příklad 11.5.3 (vi)) jsme ukázali, že posloupnost, která je cauchyovská v maximové normě, vždy v této normě konverguje ke spojitě funkci φ a platí pro ni

$$\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) \quad \text{pro všechna } x \in [a, b].$$

Z toho již plyne úplnost našeho prostoru.

Krok 4: volba kontraktivního zobrazení.

Na prostoru (P, ρ) definujme

$$\Phi: y \mapsto y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt.$$

Pak platí $\Phi: P \rightarrow P$ (skutečně, díky vlastnostem integrálu s proměnnou horní mezí napravo vždy získáváme spojitou funkci, navíc má díky odhadu $|f(x, y)| \leq K$ požadovaný obor hodnot). Dále pro libovolná $y, z \in P$ dostáváme s využitím (11.11.2)

$$\begin{aligned} \rho(\Phi(y), \Phi(z)) &= \max_{[x_0 - \tau, x_0 + \tau]} \left| \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt - \int_{x_0}^x f(t, z(t)) dt \right| \\ &\leq \max_{[x_0 - \tau, x_0 + \tau]} \left| \int_{x_0}^x |f(t, y(t)) - f(t, z(t))| dt \right| \\ &\leq |x_0 - x| L \max_{[x_0 - \tau, x_0 + \tau]} |y - z| \leq \tau L \rho(y, z). \end{aligned}$$

Protože $\tau L < 1$, dostali jsme, že Φ je kontrakce.

Krok 5: existence a jednoznačnost řešení.

Podle třetího a čtvrtého kroku můžeme na prostor (P, ρ) a zobrazení Φ aplikovat Banachovu větu o kontrakci (Věta 11.8.2) a dostáváme jednoznačné $y \in P$ splňující (11.11.3). Díky prvnímu kroku a skutečnosti, že jsme celý postup mohli provádět na libovolném podintervalu intervalu $[x_0 - \tau, x_0 + \tau]$ obsahujícím bod x_0 , máme jednoznačné řešení úlohy (11.11.1).

Zbývá vysvětlit, jak bychom postupovali v případě soustavy rovnic

$$\mathbf{y}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{y}) \quad \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0,$$

kde $x_0 \in \mathbb{R}$, $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Na vektorových funkcích bychom zavedli metriku

$$\rho(\mathbf{y}, \mathbf{z}) = \max_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ x \in [x_0 - \tau, x_0 + \tau]}} |y_i(x) - z_i(x)|$$

a integrál bychom chápali vektorově, tedy

$$\int_{x_0}^x \mathbf{F}(t, \mathbf{y}(t)) dt = \left(\int_{x_0}^x F_1(t, \mathbf{y}(t)) dt, \dots, \int_{x_0}^x F_n(t, \mathbf{y}(t)) dt \right).$$

Ostatní modifikace důkazu jsou zřejmé. \square

Poznámka 11.11.2. V důkazu Banachovy věty o kontrakci (Věta 11.8.2) jsme pevný bod získali postupnými aproximacemi. Pro naši diferenciální rovnici máme například následující posloupnost přibližných řešení. Napřed zvolíme konstantní funkci

$$\varphi_0 \equiv y_0.$$

Pak postupně zavádíme pro každé $n \in \mathbb{N}$

$$\varphi_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_n(t)) dt.$$

Příklad 11.11.3. Připomeňme si Příklad 8.3.10, část (ii). V případě rovnice $y' = y$ s počáteční podmínkou $y(0) = 1$ máme

$$\varphi_0 \equiv 1 \quad \text{a} \quad \varphi_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x \varphi_n(t) dt$$

na $(-\tau, \tau)$, kdykoliv $\tau < 1$ (v našem případě je $L = 1$). Proto

$$\varphi_1(x) = 1 + \int_0^x 1 dt = 1 + x$$

$$\varphi_2(x) = 1 + \int_0^x (1 + t) dt = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

$$\varphi_3(x) = 1 + \int_0^x \left(1 + t + \frac{1}{2}t^2\right) dt = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3,$$

atd. Postupně dostáváme Taylorův rozvoj exponenciály. Pokud nás zajímá, jak moc dobře funkce φ_n aproximuje skutečné řešení, stačí použít odhad z odvození Cauchyovskosti v důkazu Banachovy věty o kontrakci (Věta 11.8.2), který v našem případě dává (v důkazu Picard–Lindelöfovy věty, tedy Věty 11.11.1, jsme viděli, že pro konstantu z definice kontrakce zde platí $q = L\tau$)

$$\varrho(\varphi_{n+p}, \varphi_n) \leq \frac{q^n}{1-q} \varrho(\varphi_1, \varphi_0) = \frac{\tau^n}{1-\tau} \max_{[-\tau, \tau]} |(1+x) - 1| = \frac{\tau^{n+1}}{1-\tau}.$$

Limitním přechodem $p \rightarrow \infty$ odtud dostáváme

$$\max_{[-\tau, \tau]} |\varphi - \varphi_n| \leq \frac{\tau^{n+1}}{1-\tau}.$$

Poznámka 11.11.4. Získaný odhad poněkud pokulhává za odhadem, který nám dává Lagrangeův tvar zbytku Taylorova polynomu funkce e^x

$$\max_{[-\tau, \tau]} |\varphi - \varphi_n| = \max_{[-\tau, \tau]} |R_{n+1}| = \max_{x \in [-\tau, \tau]} \frac{1}{(n+1)!} e^{\xi_x} |x|^{n+1} \leq \frac{e^\tau}{(n+1)!} \tau^{n+1}.$$

Je však nutné podotknout, že přístup přes odhad zbytku Taylorova polynomu požaduje znalost explicitního zápisu řešení, což je ale situace, kdy toto řešení nepotřebujeme aproximovat funkcemi φ_n .

Nyní si dokážeme Peanovu větu (Větu 8.3.4), tedy existenci řešení pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu pro spojitou pravou stranu. Budeme potřebovat několik pomocných výsledků. Začneme další vlastností prostoru $C([a, b])$ opatřeného maximovou metrikou.

Definice 11.11.5 (Funkce stejně omezené a stejně stejnoměrně spojité). Nechť $M \subset C([a, b])$ je množina. Řekneme, že M je *stejně omezená* (neboli funkce z M jsou *stejně omezené*) na $[a, b]$, jestliže existuje $K > 0$ takové, že

$$|f(x)| \leq K \quad \text{kdykoliv } x \in [a, b] \text{ a } f \in M.$$

Řekneme, že M je *stejně stejnoměrně spojitá* (neboli funkce z M jsou *stejně stejnoměrně spojité*) na $[a, b]$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon \quad \text{kdykoliv } x_1, x_2 \in [a, b], |x_1 - x_2| < \delta \text{ a } f \in M.$$

Není těžké si uvědomit, že posloupnost funkcí z $C([a, b])$ konvergující v maximové metrice je stejně omezená a stejně stejnoměrně spojitá (připomeňte si důkaz úplnosti prostoru $C([a, b])$). Do určité míry platí i opačná implikace, kterou později použijeme.

Věta 11.11.6 (Arzelà–Ascoliho věta). *Nechť $\{f_n\} \subset C([a, b])$ jsou stejně omezené a stejně stejnoměrně spojité funkce. Pak existuje podposloupnost $\{f_{n_k}\} \subset \{f_n\}$ konvergentní v maximové metrice.*

Důkaz. Seřadme všechna racionální čísla z intervalu $[a, b]$ do posloupnosti $\{x_k\}$. Díky stejnoměrné omezenosti $\{f_n\}$ je posloupnost $\{f_n(x_1)\}$ omezená a proto lze podle Weierstrassovy věty (Věta 5.5.4) vybrat podposloupnost $\{f_{1,n}\} \subset \{f_n\}$ tak, že $f_{1,n}(x_1)$ konverguje. Pokračujeme s bodem x_2 a podposloupností $\{f_{2,n}\} \subset \{f_{1,n}\}$ takovou, že $f_{2,n}(x_2)$ konverguje a tak dále. Zřejmě pak diagonální posloupnost $\{f_{n,n}\}$ splňuje

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{n,n}(x_k) \quad \text{existuje vlastní pro každé } k \in \mathbb{N}.$$

Ukažme, že tento výsledek implikuje cauchyovskost posloupnosti $\{f_{n,n}\}$ v maximové metrice. Zvolme $\varepsilon > 0$. Nechť $\delta > 0$ odpovídá číslu ε v definici stejné stejnoměrné spojitosti. Dále zřejmě existují racionální čísla y_1, \dots, y_l tak, že $\{(y_i - \delta, y_i + \delta)\}_{i=1}^l$ tvoří pokrytí $[a, b]$. Navíc podle předchozího pro každé $i \in \{1, \dots, l\}$ existuje $n_i \in \mathbb{N}$ takové, že

$$|f_{n,n}(y_i) - f_{m,m}(y_i)| < \varepsilon \quad \text{pro } n, m > n_i.$$

Položme $n_0 = \max\{n_1, \dots, n_l\}$. Zafixujeme-li nyní libovolné $x \in [a, b]$ a vezmeme-li k němu y_{i_0} tak, že $|x - y_{i_0}| < \delta$, díky předchozím výsledkům a stejné stejnoměrné spojitosti dostáváme pro $m, n > n_0$

$$\begin{aligned} |f_{n,n}(x) - f_{m,m}(x)| &\leq |f_{n,n}(x) - f_{n,n}(y_{i_0})| \\ &\quad + |f_{n,n}(y_{i_0}) - f_{m,m}(y_{i_0})| + |f_{m,m}(y_{i_0}) - f_{m,m}(x)| < 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Proto $\max_{[a,b]} |f_{n,n} - f_{m,m}| < 3\varepsilon$, tedy $\{f_{n,n}\}$ je Cauchyovská v maximové metrice a úplnost $C([a, b])$ implikuje dokazovaný výsledek. \square

Lemma 11.11.7. *Nechť $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ a $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $[a, b]$ a afinní na $[t_{i-1}, t_i]$ pro všechna $i \in \{1, \dots, n\}$. Označme*

$$k_i = \frac{f(t_i) - f(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} \quad \text{pro } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Pak pro všechna $x, y \in [a, b]$, $x \neq y$, platí

$$\min\{k_1, \dots, k_n\} \leq \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \max\{k_1, \dots, k_n\}.$$

Důkaz. Pokud $x \leq t_j < t_{j+1} < \dots < t_{l-1} < t_l \leq y$, máme

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= f(y) - f(t_l) + f(t_l) - f(t_{l-1}) + \dots + f(t_{j+1}) - f(t_j) \\ &\quad + f(t_j) - f(x) \\ &= k_{l+1}(y - t_l) + k_l(t_l - t_{l-1}) + \dots + k_{j+1}(t_{j+1} - t_j) + k_j(t_j - x) \\ &\leq \max\{k_j, \dots, k_{l+1}\}(y - x) \leq \max\{k_1, \dots, k_n\}(y - x) \end{aligned}$$

a tak dále. \square

Nyní přistoupíme k důkazu Peanovy existenční věty (Věta 8.3.4). Uvedeme lehce odlišné (výstižnější) znění, ve kterém je uvedeno, na jakém okolí bodu reprezentujícího počáteční podmínku řešení existuje. Znění a důkaz uvedeme jen pro $n = 1$, modifikace pro vícerozměrný případ je jasná (interval $[y_0 - b, y_0 + b]$ se ve znění nahradí krychlí a v důkazu se každé složce vektorové funkce y věnujeme zvlášť).

Věta 11.11.8 (Peanova existenční věta). *Nechť $a, b > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $y_0 \in \mathbb{R}$ a $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $[x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$. Nechť $M > 0$ splňuje*

$$M \geq \max_{[x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]} |F(x, y)|.$$

Položme $h := \min\{a, \frac{b}{M}\}$. Pak na intervalu $(x_0 - h, x_0 + h)$ existuje řešení Cauchyovy úlohy pro rovnici $y' = F(x, y)$ s počáteční podmínkou $y(x_0) = y_0$.

Důkaz. Krok 1: Konstrukce aproximativních řešení φ_n .

Na chvíli zafixujme $n \in \mathbb{N}$. Interval $[x_0 - h, x_0 + h]$ rozdělíme na $2n$ stejných dílků zavedením dělicích bodů

$$t_j := x_0 + j \frac{h}{n} \quad \text{pro } j = -n, -n + 1, \dots, -1, 0, 1, \dots, n - 1, n.$$

Aproximativní řešení φ_n konstruujeme jako spojitou po částech afinní funkci definovanou následovně. Na $[t_0, t_1]$ definujeme

$$\varphi_n(x) := y_0 + F(t_0, y_0)(x - t_0)$$

(připomeňme, že $t_0 = x_0$). Položme ještě $y_1 := \varphi_n(t_1)$. Na $[t_1, t_2]$ definujeme

$$\varphi_n(x) := y_1 + F(t_1, y_1)(x - t_1) \quad \text{a} \quad y_2 := \varphi_n(t_2).$$

Postupujeme indukci a pro $j \in \{3, \dots, n\}$ definujeme na $[t_{j-1}, t_j]$

$$\varphi_n(x) := y_{j-1} + F(t_{j-1}, y_{j-1})(x - t_{j-1}) \quad \text{a} \quad y_j := \varphi_n(t_j).$$

Na intervalu $[x_0 - h, x_0]$ pracujeme podobně, jen se v každém kroku posouváme o jeden dílek doleva.

Krok 2: Konvergence aproximativních řešení.

Z konstrukce je vidět, že každá z funkcí φ_n splňuje $\varphi_n(x_0) = y_0$ a navíc je lipschitzovská s konstantou lipschitzovskosti rovnou M . Proto jsou splněny předpoklady Arzelà–Ascoliho věty (Věta 11.11.6) a po přechodu k podposloupnosti máme $\varphi \in C([x_0 - h, x_0 + h])$ takovou, že

$$\max_{[x_0 - h, x_0 + h]} |\varphi_{n_k} - \varphi| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \quad (11.11.4)$$

Krok 3: Funkce φ řeší diferenciální rovnici.

Protože $\varphi_{n_k}(x_0) = y_0$ pro všechna $k \in \mathbb{N}$, (11.11.4) implikuje $\varphi(x_0) = y_0$. Zbývá ukázat, že

$$\varphi'(x) = F(x, \varphi(x)) \quad \text{na } (x_0 - h, x_0 + h).$$

Zafixujeme $\varepsilon > 0$ a $x \in (x_0, x_0 + h)$ (případ $x \in (x_0 - h, x_0)$ je analogický, případ $x = x_0$ dokonce o trochu jednodušší). Ze spojitosti F existuje $\delta > 0$ tak, že

$$|t - x| \leq \delta \wedge |y - \varphi(x)| \leq \delta \quad \implies \quad |F(t, y) - F(x, \varphi(x))| < \varepsilon. \quad (11.11.5)$$

Označme $h_1 := \min\{\frac{\delta}{2}, \frac{\delta}{6M}\}$. Dále zafixujeme libovolné $s \in (-h_1, h_1) \setminus \{0\}$. Nyní ještě zafixujeme $k \in \mathbb{N}$ tak velké, aby

$$\max_{[x_0 - h, x_0 + h]} |\varphi_{n_k} - \varphi| < \min\left\{|s|\varepsilon, \frac{\delta}{2}\right\} \quad (11.11.6)$$

(použili jsme (11.11.4)) a aby pro vzdálenost dělicích bodů funkce φ_{n_k} platilo $\frac{h}{n_k} < h_1$. Díky druhé vlatnosti existuje index j tak, že odpovídající dělicí bod splňuje

$$x - 2h_1 < t_j \leq x - h_1.$$

Odtud

$$|t_j - x| < 2h_1 \quad \text{a} \quad |t_j - (x + s)| < 3h_1.$$

Dále díky M -lipschitzovskosti funkce φ_{n_k} a nerovnosti (11.11.6) plyne pro každé $t \in [t_j, \max\{x, x + s\}]$

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_{n_k}(t)| &\leq |\varphi(x) - \varphi_{n_k}(x)| + |\varphi_{n_k}(x) - \varphi_{n_k}(t)| \\ &\leq \frac{\delta}{2} + M|t - x| \leq \frac{\delta}{2} + 3Mh_1 \leq \frac{\delta}{2} + 3M \frac{\delta}{6M} = \delta. \end{aligned}$$

Díky tomuto odhadu, Lemmatu 11.11.7 před větou (používáme jej na intervalu $[t_j, \max\{x, x + s\}]$) a metodě konstrukce funkce φ_{n_k} máme

$$\begin{aligned} \min_{[x-\delta, x+\delta] \times [\varphi(x)-\delta, \varphi(x)+\delta]} F(t, y) &\leq \frac{\varphi_{n_k}(x+s) - \varphi_{n_k}(x)}{s} \\ &\leq \max_{[x-\delta, x+\delta] \times [\varphi(x)-\delta, \varphi(x)+\delta]} F(t, y). \end{aligned} \quad (11.11.7)$$

Celkově dostáváme z (11.11.6) a z (11.11.7) kombinovaného s (11.11.5)

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(x+s) - \varphi(x)}{s} - F(x, \varphi(x)) \right| &\leq \left| \frac{\varphi(x+s) - \varphi(x)}{s} - \frac{\varphi_{n_k}(x+s) - \varphi_{n_k}(x)}{s} \right| \\ &\quad + \left| \frac{\varphi_{n_k}(x+s) - \varphi_{n_k}(x)}{s} - F(x, \varphi(x)) \right| \\ &< 2\varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud plyne $\varphi'(x) = F(x, \varphi(x))$. □

Kapitola 12

Diferenciální počet funkcí více proměnných

V kapitole o metrických prostorech jsme se již zabývali limitou a spojitostí funkcí více proměnných. Nyní se budeme zabývat problémy souvisejícími s derivováním. V této kapitole budeme používat následující značení. Bod $x \in \mathbb{R}^N$ budeme značit standardním fontem, vektor v \mathbb{R}^N tučně. Když k bodu přičteme vektor, získáme opět bod, tedy $x + \mathbf{h} = y$. Vektory v \mathbb{R}^m , kde typicky $m \neq N$, budeme značit pomocí šipky, tedy například $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$, kde $\vec{f} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. Konečně matice typu $N \times N$ budeme značit speciálním fontem, např. tedy $\mathbb{A} = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^N$.

12.1 Parciální derivace, derivace ve směru, totální diferenciál

Nejprve si připomeneme definici parciální derivace, kterou jsme si již představili. Pak přistoupíme k novým pojmům.

Definice 12.1.1 (Parciální derivace). Nechť $a \in \mathbb{R}^N$, $i \in \{1, \dots, N\}$ a $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na množině $\{a_1\} \times \dots \times \{a_{i-1}\} \times (a_i - \delta, a_i + \delta) \times \{a_{i+1}\} \times \dots \times \{a_N\}$ pro jisté $\delta > 0$. Jestliže existuje vlastní limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \dots, a_N) - f(a)}{h},$$

pak se nazývá *parciální derivace* funkce f podle i -té proměnné v bodě a a značí se $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ nebo $f_{x_i}(a)$. *Druhá parciální derivace* podle proměnných x_i a x_j je definována vztahem $\frac{\partial}{\partial x_j}(\frac{\partial f}{\partial x_i})(a)$ (pokud má výraz smysl) a značí se $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$ nebo $f_{x_j x_i}(a)$. Pokud $i = j$, první verze zápisu se zkracuje na $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a)$. Pokud $i \neq j$, hovoříme o *smíšené parciální derivaci*. Analogicky pro vyšší parciální derivace.

Pro $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ otevřenou a $k \in \mathbb{N}_0$ značí $C^k(\Omega)$ množinu funkcí, které mají spojité všechny parciální derivace až do řádu k na Ω . Opět zavádíme

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}_0} C^k(\Omega).$$

Poznámka 12.1.2. Je-li $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ kanonická báze v \mathbb{R}^N , definiční vztah pro parciální derivaci lze psát jako

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\mathbf{e}_i) - f(a)}{h}.$$

Poznámka 12.1.3. Protože pojem parciální derivace byl zaveden za pomoci funkce jedné reálné proměnné a její derivace, okamžitě máme k dispozici aritmetiku (vlastní derivace) a v některých jednoduchých (jednodimenzionálních z hlediska vnitřní funkce) případech máme také k dispozici Větu o derivaci složené funkce (Věta 3.3.14.) Pro obecný případ derivace složené funkce si později odvodíme takzvané *řetězkové pravidlo*.

Příklad 12.1.4. (i) Nechť $f(x, y) = x^2 + y^2$ na \mathbb{R}^2 . Pak zde platí

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

a rovněž libovolná parciální derivace řádu 3 a více je identicky nulová. Vidíme také, že $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$.

(ii) Nechť $f(x, y) = x \sin(xy)$ na \mathbb{R}^2 . Pak zde platí

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sin(xy) + xy \cos(xy) \quad a \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cos(xy).$$

Opět se dá nahlédnout, že $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$.

(iii) Nechť $f(x, y) = (xy)^{\frac{1}{3}}$ na \mathbb{R}^2 . Pak přímý výpočet (pomocí aritmetiky derivace) dává

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} y^{\frac{1}{3}} \quad \text{kdykoliv } x \neq 0.$$

Označíme-li nyní pro zafixované $y \in \mathbb{R}$ funkci $g: x \mapsto f(x, y)$, pak g je spojitá na \mathbb{R} a Věta o limitě derivací (Věta 6.3.9) dává

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} y^{\frac{1}{3}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } y = 0 \\ \text{sign } y \cdot \infty & \text{pro } y \neq 0. \end{cases}$$

Protože pojem parciální derivace připouští jen konečná čísla, máme $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ a $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y)$ neexistuje pro $y \neq 0$. Uvedené parciální derivace jsme také mohli počítat přímo z definice a dostat

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

a pro $y \neq 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(yh)^{\frac{1}{3}} - 0}{h} = y^{\frac{1}{3}} \cdot \infty,$$

tedy tato parciální derivace neexistuje. Pro druhou parciální derivaci podle x máme

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{3}} \quad \text{kdykoliv } x \neq 0.$$

Snadno opět získáme $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 0$. V bodech tvaru $(0, y)$, $y \neq 0$, neexistuje $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ už jenom proto, že tam neexistuje $\frac{\partial f}{\partial x}$. Analogické výsledky platí pro parciální derivaci podle y . Snadno se nahlédne, že $f \in C(\mathbb{R}^2)$ a pro každou otevřenou množinu $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ platí

$$f \in C^1(\Omega) \iff f \in C^\infty(\Omega) \iff \Omega \text{ neprotíná osový kříž.}$$

Zobecněním parciální derivace je následující pojem.

Definice 12.1.5 (Derivace ve směru). Nechť vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$, bod $a \in \mathbb{R}^N$ a funkce $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definovaná na množině $\{a + h\mathbf{v} : h \in (-\delta, \delta)\}$ pro jisté $\delta > 0$. Pak definujeme *derivaci* funkce f ve směru \mathbf{v} v bodě a předpisem

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\mathbf{v}) - f(a)}{h},$$

pokud limita na pravé straně existuje a je vlastní.

Příklad 12.1.6. (i) Nechť $f(x, y) = x^2 + 2y^2$, $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 0)$ a $a = (1, 1)$. Pak

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2x|_{\{(x,y)=(1,1)\}} = 2 \quad \text{a} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 4y|_{\{(x,y)=(1,1)\}} = 4.$$

Dále

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_1}(1, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 + 2(1+h)^2 - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + 3h^2}{h} = 6$$

a

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_2}(1, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+2h)^2 + 2(1+0)^2 - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h + 4h^2}{h} = 4.$$

(ii) Nechť

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{pro } xy = 0 \\ 1 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Díky tomu, že funkce je konstantně rovná nule na osovém kříži, okamžitě vidíme, že v počátku jsou obě parciální derivace nulové. Stejně zde vyjdou nulové směrové derivace pro směry rovnoběžné se souřadnými osami. Pokud však počítáme směrovou derivaci pro ostatní směry, nespojitost naší funkce v počátku se projeví tím,

že přímo z definice odpovídající směrová derivace neexistuje (vyjdou rozdílné nevlastní jednostranné limity).

(iii) Nechť $f(x, y) = \sqrt{|xy|} \operatorname{sign} x$. Díky nulovosti na osovém kříži opět dostáváme

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pro $\mathbf{v} = (1, 1)$ dále máme

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2} \operatorname{sign} h - 0}{h} = 1.$$

Poznámka 12.1.7. (i) V první části předchozího příkladu jsme viděli, že pojem směrová derivace je poněkud zavádějící, neboť hodnota této veličiny závisí nejen na směru vektoru, vůči kterému se počítá, ale také na jeho délce (porovnejte $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)$ a $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}_2}(1, 1)$).

(ii) Funkce z první části předchozího příkladu naznačuje, že by mohl platit vztah

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} v_i, \quad (12.1.1)$$


nicméně zbylé části příkladu ukazují, že tento vztah platit nemusí či dokonce odpovídající směrová derivace nemusí existovat (třebaže existují obě parciální derivace). (iii) Existence $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(a)$ zřejmě zaručuje, že restrikce funkce f na množinu $\{a + t\mathbf{v} : t \in (-\delta, \delta)\}$ je spojitá v bodě a . Druhá část předchozího příkladu ukazuje, že ve spojitost v dalších směrech obecně doufat nemůžeme.

Než přistoupíme k teorii, která se bude zabývat platností vzorce (12.1.1), ukažme si ještě, že ani vztah existence derivace (zde parciální, či dokonce ve všech směrech) a spojitosti není tak jednoduchý, jako tomu bylo v jednodimenzionálním případě.

Příklad 12.1.8. Nechť $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je definována následovně (používáme zkrácené značení $\{x \leq 0\} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0\}$ atd., srovnejte též s Obrázkem 12.1)

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{na } \{x \leq 0\} \cup \{y \leq x^2\} \cup \{y \geq 4x^2\} \\ 1 & \text{na } \{x > 0 \wedge 2x^2 \leq y \leq 3x^2\} \\ \text{afinní v } y & \text{na } \{x > 0 \wedge x^2 \leq y \leq 2x^2\} \\ \text{afinní v } y & \text{na } \{x > 0 \wedge 3x^2 \leq y \leq 4x^2\}. \end{cases}$$

Výsledná funkce je spojitá všude kromě počátku. Zřejmě má v počátku nulové parciální derivace (díky nulové hodnotě na osovém kříži). Dokonce jsou v počátku nulové derivace ve všech směrech. Skutečně, každý paprsek vycházející z počátku začíná částí kladné délky, která leží v množině, kde $f \equiv 0$ (a nespojitost v počátku souvisí s tím, že tyto části jsou na jednotlivých paprscích nestejně dlouhé). Příklad by šel předělat tak, aby i v ostatních bodech existovaly derivace ve všech směrech (pokud bychom „obrousili hrany“).



Obrázek 12.1: Ilustrace k definici funkce, která má v počátku všechny směrové derivace, ale není tam spojitá.

Definice 12.1.9 (Gradient). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^N$ a existují všechny parciální derivace funkce f v bodě a . Pak *gradient* funkce f v bodě a je definován předpisem

$$\nabla f(a) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N}(a) \right).$$

Analogicky pro $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ zavádíme gradient

$$\nabla \vec{f}(a) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix},$$

existují-li jednotlivé parciální derivace. Funkce $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ je třídy $C^k(\Omega; \mathbb{R}^m)$ pro $k \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$, jsou-li všechny její složky třídy $C^k(\Omega)$. Vždy se zkracuje $C^k(\Omega; \mathbb{R}^1)$ na $C^k(\Omega)$, $C^0(\Omega; \mathbb{R}^m)$ na $C(\Omega; \mathbb{R}^m)$.

Definice 12.1.10 (Totální diferenciál). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definovaná na nějakém okolí bodu $a \in \mathbb{R}^N$. Řekneme, že funkce f má v bodě a *totální diferenciál*, jestliže existuje taková lineární funkce $L: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, že

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(x + \mathbf{h}) - f(x) - L\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

Uvedenou lineární funkci L nazýváme totálním diferenciálem funkce f v bodě a a značíme ji $df(a)$.

Poznámka 12.1.11. (i) Protože na \mathbb{R}^N jsou všechny normy ekvivalentní, je jedno, kterou z nich v definici totálního diferenciálu používáme.

(ii) Pro $N = 1$ jsme si již totální diferenciál představili. Existuje právě tehdy, když existuje vlastní $f'(a)$, a totálním diferenciálem je zobrazení $h \mapsto f'(a)h$. Všechny tyto poznatky plynou ze vztahu

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} = 0.$$

(iii) V definici totálního diferenciálu je nutné trvat na slově „lineární“ v pravém slova smyslu (nulová hodnota v počátku), nikoliv „afinní“.

(iv) Protože lineární funkce na \mathbb{R}^N se dají charakterizovat jako skalární součin argumentu s jistým $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^N$ (tedy $L\mathbf{h} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{h}$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$), existence totálního diferenciálu je ekvivalentní existenci $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^N$ splňujícího

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(x + \mathbf{h}) - f(x) - \mathbf{A} \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

V tomto případě je totální diferenciál $df(a)$ dán předpisem $df(a)(\mathbf{h}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{h}$.

(v) Podobně jako se dá existence vlastní derivace v jednodimenzionálním případě geometricky interpretovat existencí tečny ke grafu, totální diferenciál souvisí s existencí tečné nadroviny ke grafu.

(vi) Totální diferenciál se dá zavést i pro $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$. Výše uvedenou definici použijeme na jednotlivé složky. Totální diferenciál je v takovém případě lineární zobrazení z \mathbb{R}^N do \mathbb{R}^m .

V dalším se nemusíme případem $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ příliš zabývat, následující teorie se vybuduje pro případ $m = 1$ a v případě potřeby se použije na jednotlivé složky vektorových polí.

Věta 12.1.12 (O vlastnostech plynoucích z existence totálního diferenciálu). *Necht $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ má totální diferenciál v bodě $a \in \mathbb{R}^N$. Pak*

(i) *v bodě a existují všechny parciální derivace a platí $df(a) = \nabla f(a)$ (přesněji $df(a)(\mathbf{h}) = \nabla f(a) \cdot \mathbf{h}$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$)*

(ii) *existují derivace ve všech směrech a platí pro ně $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(a) = \nabla f(a) \cdot \mathbf{v}$*

(iii) *funkce f je spojitá v bodě a .*

Důkaz. Nejprve dokažme části (i) a (ii). Zafixujme vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$. Pak z definice totálního diferenciálu a jeho linearit máme

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\mathbf{v}) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h\mathbf{v}) - f(a) - df(a)(h\mathbf{v})}{\|h\mathbf{v}\|} \frac{\|h\mathbf{v}\|}{h} + \frac{df(a)(h\mathbf{v})}{h} \\ &= 0 + df(a)(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

Proto existuje $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(a)$. Volba $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$ dává v předchozím výpočtu $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = df(a)(\mathbf{e}_i)$ a z linearit $df(a)$ pak dostáváme

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(a) &= df(a)(\mathbf{v}) = df(a)\left(\sum_{i=1}^N v_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=1}^N v_i df(a)(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^N v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \\ &= \nabla f(a) \cdot \mathbf{v}. \end{aligned}$$

Třetí část plyne z výpočtu

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} (f(a + \mathbf{h}) - f(a)) = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \left(\frac{f(a + \mathbf{h}) - f(a) - df(a)(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \|\mathbf{h}\| + df(a)(\mathbf{h}) \right) = 0 + 0,$$

kde jsme využili následující odhad založený na Cauchy–Schwarzově nerovnosti (Věta 11.1.12)

$$|df(a)(\mathbf{h})| = |\nabla f(a) \cdot \mathbf{h}| \leq \|\nabla f(a)\| \|\mathbf{h}\| = C \|\mathbf{h}\|.$$

□

Příklad 12.1.13. (i) Zkoumejme existenci totálního diferenciálu v počátku pro funkci $f(x, y) = x^2 + y^2$. Pokud totální diferenciál existuje, podle předchozí věty úzce souvisí s gradientem. Spočítejme proto

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{a} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Jediným kandidátem na totální diferenciál je proto zobrazení $L: (h_1, h_2) \mapsto 0 \cdot h_1 + 0 \cdot h_2 = 0$. Máme pro něj

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(0 + h_1, 0 + h_2) - f(0, 0) - L\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} &= \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{h_1^2 + h_2^2 - 0 - 0}{\|\mathbf{h}\|} \\ &= \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{h_1^2 + h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0. \end{aligned}$$

Tím jsme ověřili, že se skutečně jedná o totální diferenciál. Tedy $df(0, 0) \equiv 0$ (nulové zobrazení).

(ii) Zkoumejme existenci totálního diferenciálu v počátku pro funkci $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. Přímo z definice spočítáme

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{a} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pro jediného kandidáta $L \equiv 0$ (nulové zobrazení) na totální diferenciál pak máme

$$\frac{f(0 + h_1, 0 + h_2) - f(0, 0) - L\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{\sqrt[3]{h_1 h_2}}{\|\mathbf{h}\|}.$$

Limita posledního výrazu pro $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ však nemůže být nulová, což snadno nahlédneme v situaci $h_1 = h_2$. Totální diferenciál proto neexistuje.

Druhá část předchozího příkladu nám právě ukázala, že v poslední větě se implikace nedají obrátit. Postačující podmínka pro existenci totálního diferenciálu proto vyžaduje více než jen existenci parciálních derivací a spojitost.

Věta 12.1.14 (O postačující podmínce pro existenci totálního diferenciálu). *Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ a $a \in \mathbb{R}^N$.*

- (i) *Má-li f na jistém okolí bodu a omezené parciální derivace, pak je v něm spojitá.*
- (ii) *Má-li f na jistém okolí bodu a parciální derivace a ty jsou spojitě v bodě a , pak v něm má totální diferenciál.*

Důkaz. Z důvodu zjednodušení zápisu důkaz provedeme jen pro $N = 2$. Ve vyšší dimenzi se postupuje analogicky.

Dokažme nejprve část (i). Nechť $G := (a_1 - \delta, a_1 + \delta) \times (a_2 - \delta, a_2 + \delta)$ je podmnožinou okolí uvedeného ve znění věty a $K > 0$ je konstanta, která na něm omezuje všechny parciální derivace. Pokud $y \in G$ a $y_1 \neq a_1$ a $y_2 \neq a_2$, pak podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) máme

$$\begin{aligned} |f(y_1, y_2) - f(a_1, a_2)| &= |f(y_1, y_2) - f(a_1, y_2) + f(a_1, y_2) - f(a_1, a_2)| \\ &= \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, y_2)(y_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, \xi_2)(y_2 - a_2) \right| \\ &\leq K|y_1 - a_1| + K|y_2 - a_2| \leq 2K\|y - a\| \end{aligned}$$

(rozmyslete si, proč jsme mohli Lagrangeovu větu použít). V případě, kdy y a a se liší jen v jedné souřadnici, snadno dostaneme $|f(y_1, y_2) - f(a_1, a_2)| \leq K\|y - a\|$. Z našich odhadů plyne spojitost f v bodě a .

Dokažme část (ii). Zvolme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že pro $y \in G := (a_1 - \delta, a_1 + \delta) \times (a_2 - \delta, a_2 + \delta)$ platí

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(y) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right| < \varepsilon \quad \text{a} \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(y) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right| < \varepsilon.$$

Pro libovolné $y \in G$ takové, že $y_1 \neq a_1$ a $y_2 \neq a_2$ pak podle Lagrangeovy věty (Věta 6.3.3) máme

$$\begin{aligned} &\left| f(y_1, y_2) - f(a_1, a_2) - \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(y_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)(y_2 - a_2) \right) \right| \\ &= \left| f(y_1, y_2) - f(a_1, y_2) + f(a_1, y_2) - f(a_1, a_2) \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(y_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)(y_2 - a_2) \right) \right| \\ &= \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, y_2)(y_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, \xi_2)(y_2 - a_2) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(y_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)(y_2 - a_2) \right| \\ &= \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, y_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) \right)(y_1 - a_1) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, \xi_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) \right)(y_2 - a_2) \right| \\ &\leq \varepsilon|y_1 - a_1| + \varepsilon|y_2 - a_2| \leq 2\varepsilon\|y - a\|. \end{aligned}$$

V případě, kdy y a a se liší jen v jedné souřadnici, stejný odhad získáme ještě jednodušeji. Protože ε bylo libovolné, ověřili jsme definici totálního diferenciálu funkce f v bodě a . \square

Příklad 12.1.15. (i) Pro funkci $f(x, y) = x^2 + y^2$ platí

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \quad \text{a} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

Protože funkce $(x, y) \mapsto 2x$ a $(x, y) \mapsto 2y$ jsou spojité na \mathbb{R}^2 , funkce f má totální diferenciál na \mathbb{R}^2 .

(ii) Pro funkci $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ platí (používáme Příklad 12.1.13)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) \begin{cases} = \frac{\sqrt[3]{a_2}}{3\sqrt[3]{a_1^2}} & \text{pro } a_1 \neq 0 \\ = 0 & \text{pro } a_1 = 0 \text{ a } a_2 = 0 \\ \text{neexistuje} & \text{pro } a_1 = 0 \text{ a } a_2 \neq 0 \end{cases}$$

a

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a) \begin{cases} = \frac{\sqrt[3]{a_1}}{3\sqrt[3]{a_2^2}} & \text{pro } a_2 \neq 0 \\ = 0 & \text{pro } a_1 = 0 \text{ a } a_2 = 0 \\ \text{neexistuje} & \text{pro } a_1 \neq 0 \text{ a } a_2 = 0. \end{cases}$$

Mimo osový kříž jsou parciální derivace spojité, a proto zde existuje totální diferenciál. Na osovém kříži vyjma počátku vždy jedna parciální derivace neexistuje, a proto zde neexistuje totální diferenciál. Zbývá vyšetřit existenci totálního diferenciálu v počátku, ale to už jsme učinili v Příkladu 12.1.13.

Protože totální diferenciál je reprezentován gradientem, pro který platí aritmetika derivace, čtenáře jistě nepřekvapí, že podobná aritmetika platí i pro totální diferenciál (úplně zřejmé to ale není, musíme ověřit požadovanou aproximační vlastnost).

Tvrzení 12.1.16 (Aritmetika totálního diferenciálu). *Nechť $f, g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^N$ a existují totální diferenciály $df(a)$ a $dg(a)$. Pak*

- (i) $d(f+g)(a) = df(a) + dg(a)$
- (ii) $d(fg)(a) = g(a)df(a) + f(a)dg(a)$
- (iii) *pokud navíc $g(a) \neq 0$, pak $d\frac{f}{g}(a) = \frac{g(a)df(a) - f(a)dg(a)}{g^2(a)}$.*

Důkaz. Důkaz první části tvrzení je triviální. Druhá část plyne z identity

$$\begin{aligned} & f(a+\mathbf{h})g(a+\mathbf{h}) - f(a)g(a) - g(a)df(a)(\mathbf{h}) - f(a)dg(a)(\mathbf{h}) \\ &= f(a+\mathbf{h})g(a+\mathbf{h}) - f(a+\mathbf{h})g(a) + f(a+\mathbf{h})g(a) - f(a)g(a) \\ &\quad - g(a)df(a)(\mathbf{h}) - f(a)dg(a)(\mathbf{h}) \\ &= f(a+\mathbf{h})(g(a+\mathbf{h}) - g(a)) - f(a)dg(a)(\mathbf{h}) + g(a)(f(a+\mathbf{h}) - f(a) - df(a)(\mathbf{h})) \\ &= f(a+\mathbf{h})(g(a+\mathbf{h}) - g(a) - dg(a)(\mathbf{h})) + (f(a) - f(a+\mathbf{h}))dg(a)(\mathbf{h}) \\ &\quad + g(a)(f(a+\mathbf{h}) - f(a) - df(a)(\mathbf{h})) \end{aligned}$$

(u druhého členu na předposledním řádku připomeňme, že existence totálního diferenciálu implikuje spojitost, dále činitel $\frac{dg(a)(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|}$ je omezený díky linearitě totálního diferenciálu).

Důkaz třetí části, díky již dokázané druhé části, plyne z rovností

$$\frac{1}{g(a+\mathbf{h})} - \frac{1}{g(a)} + \frac{dg(a)(\mathbf{h})}{g^2(a)} = \frac{g^2(a) - g(a)g(a+\mathbf{h}) + g(a+\mathbf{h})dg(a)(\mathbf{h})}{g^2(a)g(a+\mathbf{h})}$$

a

$$\begin{aligned} & g^2(a) - g(a)g(a + \mathbf{h}) + g(a + \mathbf{h})dg(a)(\mathbf{h}) \\ &= g(a)(g(a) - g(a + \mathbf{h}) + dg(a)(\mathbf{h})) + (g(a + \mathbf{h}) - g(a))dg(a)(\mathbf{h}). \end{aligned}$$

□

Připomeňme, že celá dosavadní teorie se dala dělat pro zobrazení z \mathbb{R}^N do \mathbb{R}^m . Postupovali bychom po jednotlivých složkách. Tato metoda se však nedá použít na výsledky o složených zobrazeních.

Věta 12.1.17 (O totálním diferenciálu složeného zobrazení). *Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ má totální diferenciál v bodě $a \in \mathbb{R}^N$ a $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ má totální diferenciál v bodě $f(a)$. Pak funkce $g \circ f$ má totální diferenciál v bodě a a platí pro něj*

$$d(g \circ f)(a) = d\vec{g}(\vec{f}(a)) \circ d\vec{f}(a)$$

(neboli $d(\vec{g} \circ \vec{f})(a)(\mathbf{h}) = d\vec{g}(\vec{f}(a))(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}))$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$).

Důkaz. Pro jednoduchost značení pišme $b = \vec{f}(a)$. Díky existenci dílčích totálních diferenciálů existují funkce $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ a $\vec{\psi}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ splňující $\vec{\varphi}(0) = \vec{0}$, $\vec{\psi}(0) = \vec{0}$ (pozor, pokaždé se jedná o počátek v jiném prostoru),

$$\begin{aligned} \vec{f}(a + \mathbf{h}) &= f(a) + df(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h}) && \text{pro všechna } \mathbf{h} \in \mathbb{R}^N \\ \vec{g}(b + \mathbf{l}) &= g(b) + d\vec{g}(b)(\mathbf{l}) + \vec{\psi}(\mathbf{l}) && \text{pro všechna } \mathbf{l} \in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\vec{\varphi}(\mathbf{h})\|_{\mathbb{R}^m}}{\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N}} = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{\mathbf{l} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\vec{\psi}(\mathbf{l})\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\mathbf{l}\|_{\mathbb{R}^m}} = 0. \quad (12.1.2)$$

Proto máme

$$\begin{aligned} \vec{g}(\vec{f}(a + \mathbf{h})) &= g(b + d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h})) \\ &= g(b) + dg(b)(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h})) + \vec{\psi}(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h})) \\ &= g(b) + d\vec{g}(b)(d\vec{f}(a)(\mathbf{h})) + d\vec{g}(b)(\vec{\varphi}(\mathbf{h})) + \vec{\psi}(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h})). \end{aligned}$$

Díky linearitě zobrazení $d\vec{g}(b)$ a první části (12.1.2) dostáváme

$$0 \leq \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|d\vec{g}(b)(\vec{\varphi}(\mathbf{h}))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N}} \leq C \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\vec{\varphi}(\mathbf{h})\|_{\mathbb{R}^m}}{\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N}} = 0.$$

Konečně, pokud $d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h}) \neq \vec{0}$ (v opačném případě není co dokazovat), pak

$$\frac{\|\vec{\psi}(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h}))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N}} = \frac{\|\vec{\psi}(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h}))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h})\|_{\mathbb{R}^m}} \frac{\|d\vec{f}(a)(\mathbf{h}) + \vec{\varphi}(\mathbf{h})\|_{\mathbb{R}^m}}{\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N}}.$$

Snadno se nahlédne, že druhý činitel na pravé straně poslední rovnosti je omezený a první činitel konverguje do nuly pro $\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N} \rightarrow 0$. Celkově jsme ukázali

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\vec{g}(\vec{f}(a + \mathbf{h})) - \vec{g}(\vec{f}(a)) - d\vec{g}(b)(d\vec{f}(a)(\mathbf{h}))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\mathbf{h}\|_{\mathbb{R}^N}} = 0.$$

□

Protože totální diferenciál je reprezentován gradientem a skládání lineárních zobrazení odpovídá součinu reprezentujících matic, z předchozí věty okamžitě dostáváme následující výsledek.

Věta 12.1.18 (Řetízkové pravidlo). *Nechť $\vec{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^m$ má totální diferenciál v bodě $a \in \mathbb{R}^N$ a $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ má totální diferenciál v bodě $\vec{f}(a)$. Pak pro každé $i \in \{1, \dots, N\}$ platí*

$$\frac{\partial(g \circ \vec{f})}{\partial x_i}(a) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(\vec{f}(a)) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a).$$

Příklad 12.1.19. (i) Nechť $F(x_1, x_2) = \arctan \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}$. Pak

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = \frac{1}{1 + 1 + x_1^2 + x_2^2} \frac{\partial \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}}{\partial x_1} = \frac{1}{2 + x_1^2 + x_2^2} \frac{x_1}{\sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}} \quad \text{na } \mathbb{R}^2.$$

(ii) Nechť $\vec{f}(x_1, x_2) = (x_1 + x_2^2, x_1 x_2, x_1)$ a $g(y_1, y_2, y_3) = y_1 y_2 y_3$. Pak na \mathbb{R}^2 máme

$$\begin{aligned} \frac{\partial(g \circ \vec{f})}{\partial x_1}(a) &= \frac{\partial g}{\partial y_1}(\vec{f}(a)) \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) + \frac{\partial g}{\partial y_2}(\vec{f}(a)) \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) + \frac{\partial g}{\partial y_3}(\vec{f}(a)) \frac{\partial f_3}{\partial x_1}(a) \\ &= a_1^2 a_2 \cdot 1 + (a_1^2 + a_1 a_2^2) \cdot a_2 + (a_1^2 a_2 + a_1 a_2^3) \cdot 1. \end{aligned}$$

(iii) Převědeme si gradient do polárních souřadnic. Nechť $u \in C^1(\mathbb{R}^2)$ pracuje s proměnnými x, y a máme $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ pro $r > 0$ a $\varphi \in (0, 2\pi)$. Spočítáme Δu pomocí $\tilde{u}(r, \varphi) = u(x(r, \varphi), y(r, \varphi))$. Platí

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \varphi \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x} (-r \sin \varphi) + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \varphi. \end{aligned}$$

Vynásobíme-li první vztah výrazem $\cos \varphi$ a druhý výrazem $-\frac{\sin \varphi}{r}$, po sečtení získáme vyjádření $\frac{\partial u}{\partial x}$. Podobný trik použijeme pro získání $\frac{\partial u}{\partial y}$. Dostáváme

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} \sin \varphi \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} \cos \varphi. \end{aligned}$$

Poznámka 12.1.20. Poznamenejme, že platnost řetízkového pravidla skutečně vyžaduje existenci totálních diferenciálů zúčastněných zobrazení a nestačí jen existence jejich parciálních derivací. Pokud totiž definujeme zobrazení $\vec{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ předpisem $\vec{f}(t) = (t, t)$, pak obě složky zobrazení mají v počátku derivaci (dokonce se jedná o funkce z $C^\infty(\mathbb{R})$). Dále definujeme $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{pro } xy = 0 \\ 1 & \text{pro } xy \neq 0. \end{cases}$$

Na osovém kříži je tedy funkce g nulová, a má proto v počátku obě parciální derivace. Na druhou stranu, pro funkci $g \circ \vec{f}$ máme

$$(g \circ \vec{f})(t) = \begin{cases} 0 & \text{pro } t = 0 \\ 1 & \text{pro } t \neq 0. \end{cases}$$

Funkce $g \circ \vec{f}$ proto v počátku nemá derivaci.

Dalším klasickým výsledkem, který se dá rozšířit do vyšší dimenze, je Lagrangeova věta o přírůstku, někdy též Věta o střední hodnotě (Věta 6.3.3.) V jednodimenzionální situaci jsme pracovali na intervalu. Zde se jako přirozený ukáže následující typ množiny.

Definice 12.1.21 (Konvexní množina). Řekneme, že množina $A \subset \mathbb{R}^N$ je *konvexní*, jestliže pro každá $x, y \in A$ a $\lambda \in [0, 1]$ platí $\lambda x + (1 - \lambda)y \in A$.

Poznámka 12.1.22. (i) Platí $\lambda x + (1 - \lambda)y = y + \lambda(x - y)$.
(ii) Jsou-li x, y pevně zvolené a $x \neq y$, pak množina $\{\lambda x + (1 - \lambda)y\}$ je úsečka spojující body x a y . Prvky z uvedené množiny nazýváme *konvexní kombinace* prvků x a y .
(iii) Rozmyslete si, že konvexita je také ekvivalentní podmínce

$$k \in \mathbb{N} \wedge x_1, \dots, x_k \in A \wedge \lambda_1, \dots, \lambda_k \in [0, 1] \wedge \sum_{j=1}^k \lambda_j = 1 \implies \sum_{j=1}^k \lambda_j x_j \in A.$$

(iv) Konvexita funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je ekvivalentní tomu, že je konvexní její nadgraf, tedy množina všech $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ takových, že $y > f(x)$.

Věta 12.1.23 (O střední hodnotě). *Nechť $A \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená konvexní množina a $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ má totální diferenciál na A . Pak pro všechna $a, b \in A$, $a \neq b$, existuje $\theta \in (0, 1)$ takové, že*

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= df(a + \theta(b - a))(b - a) = \nabla f(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a) \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_j}(a + \theta(b - a))(b_j - a_j). \end{aligned}$$

Důkaz. Definujme pomocnou funkci

$$F(t) = f(a + t(b - a)).$$

Pak $F = f \circ \mathbf{g}$, kde $\mathbf{g}: t \mapsto a + t(b - a)$ je nekonečněkrát spojitě diferencovatelná na $(0, 1)$. Potom díky Větě o totálním diferenciálu složeného zobrazení (Věta 12.1.17) má funkce F totální diferenciál (tedy vlastní derivaci) na $(0, 1)$ a platí

$$F'(t) = \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{g}(t)) \frac{dg_j}{dt}(t) = \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_j}(a + t(b - a))(b_j - a_j).$$

Podle Lagrangeovy věty o střední hodnotě (Věta 6.3.3) pak existuje $\theta \in (0, 1)$ takové, že

$$f(b) - f(a) = F(1) - F(0) = F'(\theta) = \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_j}(a + \theta(b - a))(b_j - a_j).$$

□

Poznámka 12.1.24. Cvičně si spočítejme druhou derivaci funkce F zavedené v předchozím důkazu, což nám umožní lépe pochopit tvar Taylorova polynomu ve vyšší dimenzi. Aplikujeme-li řetězkové pravidlo na vzorec pro F' , dostáváme

$$\begin{aligned} F''(t) &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(g(t)) \frac{dg_i}{dt}(t) \frac{dg_j}{dt}(t) + \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_j}(g(t)) \frac{d^2 g_j}{dt^2}(t) \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a + t(b - a))(b_i - a_i)(b_j - a_j) + 0. \end{aligned}$$

12.2 Derivace a totální diferenciály vyšších řádů, Taylorův vzorec

Jak uvidíme později, vyšší (zejména druhé) parciální derivace mají velký význam při klasifikaci lokálních extrémů funkcí více proměnných. V předchozím textu si na příkladech čtenář mohl povšimnout, že často platí $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. Tomuto jevu se říká *záměnnost parciálních derivací* a při výpočtech nám může ušetřit mnoho času. Naneštěstí neplatí obecně.

Příklad 12.2.1. Definujme

$$f(x, y) = \begin{cases} xy & \text{pro } |x| < |y| \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Pak snadno nahlédneme, že


$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = y \quad \text{a} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = 0.$$

Odtud

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1 \neq 0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0).$$

Dostatečně hladké funkce však záměnnost parciálních derivací splňují.

Věta 12.2.2 (O záměnnosti parciálních derivací). *Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ je otevřená množina a $f \in C^2(\Omega)$. Pak má f na Ω záměnné druhé parciální derivace.*



Obrázek 12.2: Náčrt k definici funkce porušující záměnnost parciálních derivací v počátku.

Důkaz. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že pracujeme v počátku. Existuje $\delta > 0$ takové, že $(-\delta, \delta) \times (-\delta, \delta) \subset \Omega$. Pro $h, k \in (0, \delta)$ definujeme funkce

$$\begin{aligned} Q(h, k) &= \frac{1}{hk} \left(f(h, k) - f(h, 0) - f(0, k) + f(0, 0) \right) \\ \varphi_k(h) &= \frac{f(h, k) - f(h, 0)}{k} \\ \psi_h(k) &= \frac{f(h, k) - f(0, k)}{h}. \end{aligned}$$

Zafixujme nyní $h, k \in (0, \delta)$. Pak podle Lagrangeovy věty o střední hodnotě (Věta 6.3.3) existují $\xi_1 \in (0, h)$ a $\xi_2 \in (0, k)$ taková, že platí

$$\begin{aligned} Q(h, k) &= \frac{1}{h} \left(\frac{f(h, k) - f(h, 0)}{k} - \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} \right) = \frac{1}{h} \left(\varphi_k(h) - \varphi_k(0) \right) \\ &= \varphi'_k(\xi_1) = \frac{1}{k} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, 0) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi_1, \xi_2). \end{aligned}$$

Podobně dostaneme

$$\begin{aligned} Q(h, k) &= \frac{1}{k} \left(\frac{f(h, k) - f(0, k)}{h} - \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} \right) = \frac{1}{k} \left(\psi_h(k) - \psi_h(0) \right) \\ &= \psi'_h(\xi_3) = \frac{1}{h} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(h, \xi_3) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, \xi_3) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\xi_4, \xi_3). \end{aligned}$$

Ze spojitosti druhých parciálních derivací v počátku nyní plyne, že jsou-li h, k dostatečně malé, máme

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi_1, \xi_2) - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x \partial y}(\xi_4, \xi_3) - \frac{\partial f}{\partial x \partial y}(0, 0) \right| < \varepsilon.$$

Protože jsme výše ukázali $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\xi_1, \xi_2) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi_4, \xi_3)$, nyní již snadno obdržíme dokazovaný výsledek. \square

Důsledek 12.2.3. *Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená a $f \in C^k(\Omega)$ pro $k \geq 2$. Pak jsou všechny parciální derivace k -tého řádu záměnné.*

Důkaz. Předchozí věta dává záměnnost druhých parciálních derivací v \mathbb{R}^N (skutečně, při výpočtu $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ jsou zafixované všechny proměnné až na x_i a x_j). Dále podle předchozího výsledku při postupném parciálním derivování umíme prohodit pořadí dvou po sobě následujících parciálních derivací. \square

Věta 12.2.4 (Taylorův vzorec). *Nechť $a \in \mathbb{R}^N$, $\delta > 0$, $m \in \mathbb{N}$, $f \in C^{m+1}(\mathcal{U}_\delta(a))$ a $a + \mathbf{h} \in \mathcal{U}_\delta(a)$. Pak existuje $\theta \in (0, 1)$ takové, že*

$$\begin{aligned} f(a + \mathbf{h}) &= f(a) + \sum_{i_1=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(a) h_{i_1} + \frac{1}{2!} \sum_{i_1, i_2=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2}}(a) h_{i_1} h_{i_2} \\ &+ \cdots + \frac{1}{m!} \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^N \frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}}(a) h_{i_1} \dots h_{i_m} \\ &+ \frac{1}{(m+1)!} \sum_{i_1, \dots, i_{m+1}=1}^N \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{m+1}}}(a + \theta \mathbf{h}) h_{i_1} \dots h_{i_{m+1}}. \end{aligned}$$

Důkaz. Pro $t \in [0, 1]$ definujme $\varphi(t) = f(a + t\mathbf{h})$. Pak už výsledek plyne z řetězového pravidla (Věta 12.1.18) a (jednodimenzionální) Věty o odhadu chyby Taylorova polynomu (Věta 6.8.10). \square

Definice 12.2.5 (Totální diferenciál řádu k). *Nechť $f \in C^k(\mathcal{U}_\delta(a))$. Totálním diferenciálem řádu k příslušejícím funkci f v bodě a nazýváme k -lineární funkci (zobrazuje \mathbb{R}^{Nk} do \mathbb{R})*

$$d^k f(a)(h^1, \dots, h^k) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^N \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a) h_{i_1}^1 \dots h_{i_k}^k.$$

Definice 12.2.6 (Multiindex). *Nechť $N \in \mathbb{N}$ je pevné. Multiindexem nazýváme N -tici nezáporných celých čísel $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$. Číslo*

$$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_N$$

se nazývá *výška multiindexu*. Pro multiindex α , $f \in C^{|\alpha|}(\Omega)$ a $x \in \mathbb{R}^N$ zavádíme značení

$$D^\alpha f := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_N^{\alpha_N}}, \quad x^\alpha := x_1^{\alpha_1} \dots x_N^{\alpha_N} \quad \text{a} \quad \binom{|\alpha|}{\alpha} = \frac{|\alpha|!}{\alpha_1! \dots \alpha_N!}.$$

Poznámka 12.2.7. Taylorův rozvoj lze při našem novém značení psát ve tvaru

$$\begin{aligned} f(a + \mathbf{h}) &= f(a) + \sum_{|\alpha|=1} \binom{1}{\alpha} D^\alpha f(a) \mathbf{h}^\alpha + \frac{1}{2!} \sum_{|\alpha|=2} \binom{2}{\alpha} D^\alpha f(a) \mathbf{h}^\alpha + \dots \\ &+ \frac{1}{m!} \sum_{|\alpha|=m} \binom{m}{\alpha} D^\alpha f(a) \mathbf{h}^\alpha \\ &+ \frac{1}{(m+1)!} \sum_{|\alpha|=m+1} \binom{m+1}{\alpha} D^\alpha f(a + \theta \mathbf{h}) \mathbf{h}^\alpha. \end{aligned}$$

Jinou možností je zápis pomocí diferenciálů vyšších řádů

$$f(a + \mathbf{h}) = f(a) + \sum_{i=1}^k \frac{1}{i!} d^i f(a)(\mathbf{h}, \dots, \mathbf{h}) + \frac{1}{(k+1)!} d^{k+1} f(a + \theta \mathbf{h})(\mathbf{h}, \dots, \mathbf{h}).$$

Cvičení 12.2.8. Dokažte si zobecnění binomické věty

$$(h_1 + h_2 + \dots + h_N)^n = \sum_{|\alpha|=n} \binom{n}{\alpha} \mathbf{h}^\alpha \quad \text{se značením } \mathbf{h} := (h_1, \dots, h_N).$$

12.3 Potenciál vektorového pole

V dalším si představíme analogii pojmu primitivní funkce pro funkce více proměnných. Nový pojem budeme dále studovat a ukážeme si, jak se používají jeho vlastnosti při řešení diferenciálních rovnic.

Definice 12.3.1 (Potenciál vektorového pole). Vektorové pole $\mathbf{T} = (T_1, \dots, T_N): \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ nazýváme *potenciální* na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, jestliže existuje funkce $U: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = T_i \quad \text{na } \Omega \text{ pro všechna } i \in \{1, \dots, N\}.$$

Funkci U pak nazýváme *potenciálem* vektorového pole \mathbf{T} .

Je zřejmé, že přičteme-li k potenciálu vektorového pole \mathbf{T} libovolnou aditivní konstantu, výsledná funkce je také potenciálem vektorového pole \mathbf{T} . Na druhou stranu pokud vezmeme $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, kde $\Omega_1 = (0, 1) \times (0, 1)$ a $\Omega_2 = (2, 3) \times (0, 1)$ a $\mathbf{T} \equiv (0, \dots, 0)$, pak jakákoliv funkce tvaru

$$U = \begin{cases} C_1 & \text{na } \Omega_1 \\ C_2 & \text{na } \Omega_2, \end{cases}$$

kde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, je potenciálem vektorového pole \mathbf{T} . Není tedy obecně pravda, že by potenciál byl určen jednoznačně až na (jednu) aditivní konstantu, jak jsme tomu byli zvyklí u primitivní funkce (která je jednorozměrným případem potenciálu). Tento typ jednoznačnosti nám nabídne vhodně zvolený typ množin.

Definice 12.3.2 (Souvislá množina). Množina $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ se nazývá *souvislá*, jestliže každé její dva body lze spojit lomenou čarou tvořenou konečným počtem úseček, které celé leží v Ω . Množina $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ se nazývá *oblast*, je-li otevřená a souvislá.

Věta 12.3.3 (O nejednoznačnosti potenciálu na oblasti). *Nechť vektorové pole \mathbf{T} má na oblasti $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ potenciály U_1 a U_2 . Pak existuje $C \in \mathbb{R}$ takové, že $U_2 = U_1 + C$.*

Důkaz. Stačí ukázat, že funkce s nulovými parciálními derivacemi na Ω musí být konstantní. Zvolíme-li libovolné dva body v Ω a aplikujeme-li Větu o střední hodnotě (Věta 12.1.23) na jednotlivých segmentech jim odpovídající lomené čáry z definice souvislé množiny, okamžitě dostáváme, že tyto body mají stejnou funkční hodnotu. \square

Poznámka 12.3.4. Připomeňme, že v teorii primitivních funkcí jsme pracovali jen na otevřených intervalech v \mathbb{R} . Jednalo se tedy o oblasti a dosažené výsledky stran nejednoznačnosti primitivní funkce odpovídají našim výsledkům o nejednoznačnosti potenciálu.

Podobně jako nemusí existovat primitivní funkce, nemusí existovat ani potenciál. Skutečně, protože je pojem parciální derivace odvozen od derivace klasické, snadno si rozmyslíme, že pro existenci potenciálu je nutné, aby funkce

$$x_1 \mapsto f(x_1, \dots, x_N), \quad x_2 \mapsto f(x_1, \dots, x_N), \quad \dots, \quad x_N \mapsto f(x_1, \dots, x_N)$$

měly Darbouxovu vlastnost na intervalech odpovídajících „propíchnutí“ množiny Ω v předpisech uvedených funkcí. Máme však ještě jednu nutnou podmínku, která požaduje jistou provázanost jednotlivých složek vektorového pole \mathbf{T} .

Věta 12.3.5 (Nutná podmínka existence potenciálu). *Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\mathbf{T} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$. Má-li \mathbf{T} potenciál na Ω , pak platí*

$$\frac{\partial T_i}{\partial x_j} = \frac{\partial T_j}{\partial x_i} \quad \text{na } \Omega \quad \text{pro všechna } i, j \in \{1, \dots, N\}.$$

Důkaz. Pokud existuje potenciál, podle předpokladu má spojitě všechny parciální derivace druhého řádu. Ty jsou proto záměnné a máme

$$\frac{\partial T_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial T_j}{\partial x_i}$$

na Ω pro všechna $i, j \in \{1, \dots, N\}$. \square

Nyní si vyslovíme a dokážeme postačující podmínku pro existenci potenciálu.

Věta 12.3.6 (Postačující podmínka existence potenciálu). *Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřený interval (tedy kvádr v případě omezenosti), $\mathbf{T} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$ a*

$$\frac{\partial T_i}{\partial x_j} = \frac{\partial T_j}{\partial x_i} \quad \text{na } \Omega \quad \text{pro všechna } i, j \in \{1, \dots, N\}.$$

Pak má vektorové pole \mathbf{T} potenciál na Ω .

Důkaz. Podrobný důkaz provedeme jen pro případ $N = 2$. Jeho rozšíření do obecné dimenze okomentujeme na konci.

Krok 1: konstrukce potenciálu v \mathbb{R}^2 .

Označme $(\alpha, \beta) \times (\sigma, \tau) := \Omega$ a zafixujme bod $(a, b) \in \Omega$. Definujme pro každé $(x, y) \in \Omega$

$$U(x, y) = \int_a^x T_1(s, b) ds + \int_b^y T_2(x, t) dt.$$

Definice je korektní, protože funkce $s \mapsto T_1(s, b)$ je spojitá na (α, β) . Podobně pro druhý integrál. Zbývá ukázat, že $\frac{\partial U}{\partial x} = T_1$ a $\frac{\partial U}{\partial y} = T_2$ na Ω . Tento výsledek plyne z rovností

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_a^x T_1(s, b) ds = T_1(x, b), \quad \frac{\partial}{\partial x} \int_b^y T_2(x, t) dt = T_1(x, y) - T_1(x, b) \quad (12.3.1)$$

a

$$\frac{\partial}{\partial y} \int_a^x T_1(s, b) ds = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} \int_b^y T_2(x, t) dt = T_2(x, y), \quad (12.3.2)$$

jejichž platností se budeme zabývat ve druhém kroku.

Krok 2: důkaz pomocných formulí (12.3.1) a (12.3.2).

První rovnost v (12.3.1) a obě rovnosti v (12.3.2) okamžitě plynou z Takzvané hlavní věty diferenciálního a integrálního počtu (Věta 7.5.12). Dokažme zbývající rovnost. Díky předpokladu $\frac{\partial T_i}{\partial x_j} = \frac{\partial T_j}{\partial x_i}$ máme

$$T_1(x, y) - T_1(x, b) = \int_b^y \frac{\partial T_1}{\partial y}(x, t) dt = \int_b^y \frac{\partial T_2}{\partial x}(x, t) dt.$$

Zbývá tedy ukázat

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_b^y T_2(x, t) dt = \int_b^y \frac{\partial T_2}{\partial x}(x, t) dt,$$

neboli

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_b^y \left(\frac{T_2(x+h, t) - T_2(x, t)}{h} - \frac{\partial T_2}{\partial x}(x, t) \right) dt = 0.$$

V poslední rovnosti můžeme na zlomek uvnitř integrandu použít Lagrangeovu větu o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) a pro každé t ležící mezi b a y dostaneme ξ_t ležící mezi 0 a h takové, že

$$\frac{T_2(x+h, t) - T_2(x, t)}{h} = \frac{\partial T_2}{\partial x}(x + \xi_t, t).$$

Nyní si stačí uvědomit, že spojitost $\frac{\partial T_2}{\partial x}$ implikuje stejnoměrnou spojitost $\frac{\partial T_2}{\partial x}$ na kompaktech (v našem případě za kompaktní množinu vezmeme třeba $[x-\delta, x+\delta] \times [\min\{b, y\}, \max\{b, y\}]$ pro $\delta > 0$ dostatečně malé). Ukázali jsme, že k zadanému $\varepsilon > 0$ máme pro h dostatečně blízko k počátku

$$\begin{aligned} & \left| \int_b^y \left(\frac{T_2(x+h, t) - T_2(x, t)}{h} - \frac{\partial T_2}{\partial x}(x, t) \right) dt \right| \\ &= \left| \int_b^y \left(\frac{\partial T_2}{\partial x}(x + \xi_t, t) - \frac{\partial T_2}{\partial x}(x, t) \right) dt \right| \leq \left| \int_b^y \varepsilon dt \right| = |y - b| \varepsilon. \end{aligned}$$

Z toho plyne požadovaný výsledek.

Krok 3: Modifikace pro obecnou dimenzi.

V obecném případě potenciál konstruujeme předpisem

$$U(x_1, \dots, x_N) = \int_{a_1}^{x_1} T_1(s_1, a_2, \dots, a_n) ds_1 + \int_{a_2}^{x_2} T_2(x_1, s_2, a_3, \dots, a_n) ds_2 \\ + \dots + \int_{a_N}^{x_N} T_N(x_1, \dots, x_{N-1}, s_N) ds_N.$$

Zbytek důkazu v obecné dimenzi přenecháváme čtenáři na rozmyšlenou (podrobně se zabývejte případem $N = 3$ a vše bude jasné). \square

V předchozím výsledku není možné interval nahradit za libovolnou oblast, jak ukazuje následující příklad.

Příklad 12.3.7. Nechť vektorové pole $\mathbf{T}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je na $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ je definováno předpisem

$$\mathbf{T}(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

Pak $\mathbf{T} \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}; \mathbb{R}^2)$ a navíc

$$\frac{\partial T_1}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial T_2}{\partial x}.$$

Pokud by existoval potenciál U na $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, muselo by pro něj platit podle Newtonovy formule

$$0 = U(1, 1) - U(-1, 1) + U(-1, 1) - U(-1, -1) + U(-1, -1) - U(1, -1) \\ + U(1, -1) - U(1, 1) \\ = \int_{-1}^1 T_1(s, 1) ds + \int_{-1}^1 T_2(-1, t) dt - \int_{-1}^1 T_1(s, -1) ds - \int_{-1}^1 T_2(1, t) dt \\ = \int_{-1}^1 \frac{-1}{1 + s^2} ds + \int_{-1}^1 \frac{-1}{1 + t^2} dt - \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + s^2} ds - \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + t^2} dt \\ = 4 \int_{-1}^1 \frac{-1}{1 + s^2} ds = -4 \frac{\pi}{2} = -2\pi$$

a máme spor.

Poznámka 12.3.8. Lepší představu o jevu popisovaném v předchozím příkladu si uděláme, pokud definujeme v polárních souřadnicích funkci

$$\tilde{U}(r, \varphi) = \varphi \quad \text{pro } r > 0 \text{ a } \varphi \in \mathbb{R}.$$

Přechodem ke kartézským souřadnicím získáme takzvanou *víceznačnou funkci*. Formálně získáme $U(x, y) = C + \arctan \frac{y}{x}$ pro $x \neq 0$. Ale tato konstanta by se měla měnit při každém průchodu přes osu y (protože máme $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x -$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = \pi$). Jednotlivé větve této funkce pak splňují (zkuste si spočítat sami pomocí řetízkového pravidla)

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad \text{a} \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Ukažme si ještě techniku hledání potenciálu.

Příklad 12.3.9. Necht' vektorové pole $\mathbf{T}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je na \mathbb{R}^2 definováno předpisem

$$\mathbf{T}(x, y) = (5x^4y + 2x^3y^2, x^5 + x^4y + 2y).$$

Protože $\mathbf{T} \in C^1(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$ a navíc zde platí

$$\frac{\partial(5x^4y + 2x^3y^2)}{\partial y} = 5x^4 + 4x^3y = \frac{\partial(x^5 + x^4y + 2y)}{\partial x},$$

pole \mathbf{T} má na \mathbb{R}^2 potenciál U . Protože $\frac{\partial U}{\partial x} = 5x^4y + 2x^3y^2$, pro zafixované $y \in \mathbb{R}$ máme

$$U(x, y) = \int (5x^4y + 2x^3y^2) dx = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + C(y).$$

Konstanta $C(y)$ závisí na $y \in \mathbb{R}$ a lze ji chápat jako funkci $y \mapsto C(y)$. Abychom ji určili, využijeme druhou podmínku

$$x^5 + x^4y + 2y = \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial(x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + C(y))}{\partial y} = x^5 + x^4y + C'(y).$$

Odtud $C'(y) = 2y$, a proto $C(y) = y^2 + C$, kde $C \in \mathbb{R}$. Celkově máme

$$U(x, y) = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + y^2 + C \quad \text{na } \mathbb{R}^2.$$

Mohli jsme také postupovat integrací obou složek T_1, T_2

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \int (5x^4y + 2x^3y^2) dx = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + C(y), \\ U(x, y) &= \int (x^5 + x^4y + 2y) dy = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + y^2 + D(x), \end{aligned}$$

a odtud porovnáním výsledků

$$C(y) = y^2 + C, \quad D(x) = C.$$

V našich budoucích aplikacích na diferenciální rovnice nebudeme přímo potřebovat potenciálnost studovaného vektorového pole. Postačí nám, bude-li toto vektorové pole potenciální po přenásobení vhodnou (nám známou) funkcí.

Definice 12.3.10 (Integrační faktor). Necht' $\mathbf{T}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ je vektorové pole a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina. Řekneme, že funkce $\mu: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je *integračním faktorem* vektorového pole \mathbf{T} na množině Ω , jestliže $\mu\mathbf{T}$ je potenciální na Ω .

Z Věty o nutné podmínce existence potenciálu (Věta 12.3.5) okamžitě dostáváme nutnou podmínku pro integrační faktor.

Věta 12.3.11 (Nutná podmínka pro integrační faktor). *Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\mathbf{T} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$ a $\mu \in C^1(\Omega)$ je integrační faktor pole \mathbf{T} na Ω . Pak platí*

$$\frac{\partial(\mu T_i)}{\partial x_j} = \frac{\partial(\mu T_j)}{\partial x_i} \quad \text{na } \Omega \quad \text{pro všechna } i, j \in \{1, \dots, N\}.$$

Jsou známe také postačující podmínky pro existenci integračního faktoru. Protože však tyto výsledky neposkytují explicitní vzorec pro integrační faktor, nebudeme pro ně mít využití.

Integrační faktor se hledá pomocí metody uhodnutí kombinované s právě uvedenou nutnou podmínkou. Podrobnosti si brzy ukážeme v oddíle o řešení diferenciálních rovnic ve tvaru totálního diferenciálu. Všimněme si, že pro $N = 1$ máme jednu podmínku (tedy jednu diferenciální rovnici) na jednu neznámou funkci μ , zatímco pro $N \geq 2$ máme na jednu funkci μ více než jednu podmínku, proto lze očekávat (a skutečně tomu tak je), že tato úloha je přeuročená a obecně v tomto případě integrační faktor nemusí existovat. Naopak, pro $N = 1$ lze ukázat, že integrační faktor za rozumných předpokladů na hladkost všech funkcí existuje (ovšem jen lokálně, tedy na jistém okolí daného bodu).

12.4 Věta o implicitní funkci

V našem dosavadním výkladu jsme se zatím zabývali pouze explicitně zadanými funkcemi. Často se však v matematice setkáme se situací, že přímý předpis pro studovanou funkci neumíme získat. V takovou chvíli typicky nemáme k dispozici nic z dosud probrané teorie. Tuto teorii nám však může zpřístupnit mocný nástroj, který se nazývá Věta o implicitní funkci. Uvedme si nejprve několik příkladů, abychom si udělali představu o situacích, kterými se budeme zabývat.

Příklad 12.4.1. (i) Uvážíme-li diferenciální rovnici

$$y' = \frac{2x}{3y^2 + 1},$$

jedná se o rovnici se separovanými proměnnými, jejíž řešení je na \mathbb{R} dáno vztahem

$$y^3 + y = \int (3y^2 + 1) dy = \int 2x dx = x^2 + C.$$

Funkce $y \mapsto y^3 + y$ je invertovatelná na celém \mathbb{R} . Inverzi nazvěme třeba Φ . Přejdeme k zápisu

$$y = \Phi(x^2 + C)$$

nám však žádné velké výhody nepřinese, protože pokud bychom chtěli výsledek třeba derivovat, vzoreček z První věty o derivaci inverzní funkce, tedy Věty 3.3.16, (který stejně vede jen na $y' = \frac{2x}{3y^2+1}$) požaduje, abychom k zadanému bodu $x \in \mathbb{R}$

znali jeho funkční hodnotu $y(x)$.

(ii) Uvažme podmnožinu \mathbb{R}^2 danou předpisem

$$x^2 + y^2 = 1$$

(tedy jednotkovou kružnicí v \mathbb{R}^2). Pokud nás zajímá, zda uvedený vztah definuje nějakou funkci, uvědomme si, že pro $x \notin [-1, 1]$ neexistuje $y \in \mathbb{R}$ splňující požadovaný vztah, číslům $x = \pm 1$ jednoznačně odpovídá $y = 0$ a pro $x \in (-1, 1)$ máme dvě řešení $y = \pm\sqrt{1-x^2}$. Přestože se na první pohled může zdát, že nejlepší situace je v bodech $x = \pm 1$, protože zde máme jednoznačně určené řešení, z hlediska aplikace diferenciálního počtu je mnohem výhodnější případ $x \in (-1, 1)$, kdy za pomoci vhodné počáteční podmínky určíme jednoznačnou (alespoň na malém okolí) větev řešení a tu pak můžeme třeba derivovat.

(iii) Uvažme funkci $f(x) = x^2$ a definujme $L(r)$ jako délku grafu funkce f uvnitř kružnice se středem v počátku a o poloměru $r > 0$. Například pro $r = \sqrt{2}$ máme (používáme $f(-1) = f(1) = 1$)

$$L(\sqrt{2}) = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + f'^2(x)} dx = 2 \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx.$$

Výpočet integrálu není příliš složitý (položí se $2x = \sinh t$), ale situaci komplikuje přepočítání mezi poloměrem a délkou intervalu $(-z, z)$ splňujícího

$$\sqrt{z^2 + z^4} = r,$$

přes který integrujeme. Tento problém by opět znesnadnil třeba výpočet

$$L'(r) = \frac{d}{dr} \int_{-z(r)}^{z(r)} \sqrt{1 + 4x^2} dx = 2\sqrt{1 + 4z^2(r)}z'(r).$$

(Tento typ úloh se vyskytuje v teorii minimálních ploch.)

Všechny tři části předchozího příkladu můžeme shrnout do situace, že studujeme funkci $x \mapsto y(x)$, kterou nemáme danou explicitně, nýbrž implicitně vztahem

$$F(x, y(x)) = 0,$$

kde F je funkce dvou proměnných (v první části předchozího příkladu máme $F(x, y) = y^3 + y - x^2 - C$, ve druhé $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ a ve třetí $F(r, z) = \sqrt{z^2 + z^4} - r$).

Náš první výsledek nám říká, kdy je možné vztahem $F(x, y) = 0$ zadefinovat funkci $x \mapsto y(x)$.

Věta 12.4.2 (O existenci implicitní funkce (základní verze)). *Nechť $F: \mathbb{R}^{N+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^N$ a $b \in \mathbb{R}$. Nechť $F(a, b) = 0$ a existuje okolí bodu (a, b) , kde F je spojitá a funkce $y \mapsto F(x, y)$ je ryze monotonní (pro všechna x stejným způsobem). Pak existují $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ existuje právě jedno $y_x \in \mathcal{U}_\Delta(b)$ splňující $F(x, y_x) = 0$. Navíc funkce $x \mapsto y_x$ je spojitá na $\mathcal{U}_\delta(a)$.*

Důkaz. Nechť $\tau > 0$ je takové, že funkce $y \mapsto F(x, y)$ je na $\mathcal{U}_\tau((a, b))$ rostoucí (případ klesající funkce se vyřídí analogicky) a F je zde spojitá.

Krok 1: existence y_x .

Zvolme $\Delta > 0$ tak, aby $(a, b - \Delta), (a, b + \Delta) \in \mathcal{U}_\tau((a, b))$. Proto

$$F(a, b - \Delta) < F(a, b) = 0 < F(a, b + \Delta).$$

Odtud díky spojitosti funkce F v bodech $(a, b - \Delta)$ a $(a, b + \Delta)$ dále existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ platí $(x, b - \Delta), (x, b + \Delta) \in \mathcal{U}_\tau((a, b))$ a

$$F(x, b - \Delta) < 0 < F(x, b + \Delta).$$

Proto Darbouxova věta (Věta 6.2.1) dává $y_x \in (b - \Delta, b + \Delta)$ splňující $F(x, y_x) = 0$. Na intervalu $(b - \Delta, b + \Delta)$ je y_x jednoznačné díky ryzí monotonii funkce $y \mapsto F(x, y)$.

Krok 2: spojitost $x \mapsto y_x$.

Spojnost dokážeme drobnou modifikací předchozího postupu. Nechť $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ a $\varepsilon > 0$. Případným zmenšením ε dosáhneme toho, že $(x, y_x - \varepsilon), (x, y_x + \varepsilon) \in \mathcal{U}_\tau((a, b))$. Odtud díky spojitosti funkce F v bodech $(x, y_x - \varepsilon)$ a $(x, y_x + \varepsilon)$ a ryzí monotonii funkce $y \mapsto F(x, y)$ existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $\xi \in \mathcal{U}_\eta(a)$ platí $(\xi, y_x - \varepsilon), (\xi, y_x + \varepsilon) \in \mathcal{U}_\tau((a, b))$ a

$$F(\xi, y_x - \varepsilon) < 0 < F(\xi, y_x + \varepsilon).$$

Nutně pak (díky Darbouxově větě a již dokázané jednoznačnosti) platí

$$y_x - \varepsilon < y_\xi < y_x + \varepsilon.$$

□

Poznámka 12.4.3. V aplikacích se nejčastěji setkáme se situací, kdy je monotonie funkce $y \mapsto F(x, y)$ zaručena podmínkami

$$\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \neq 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} \text{ existuje na okolí bodu } (a, b) \text{ a je v něm spojitá.}$$

Příklad 12.4.4. V případě úlohy s $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ máme

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y.$$

Předchozí teorii je tedy možné aplikovat kdekoli na jednotkové kružnici s výjimkou bodů $(-1, 0)$ a $(1, 0)$.

Poznámka 12.4.5. Věta o existenci implicitní funkce (Věta 12.3.6) se často aplikuje na geometrické problémy. Kupříkladu v rovině nemá x -ová osa nijak odlišnou funkci od osy y -ové. Proto v předchozím příkladu není nijak nepřírozené pokoušet se vyjadřovat proměnnou x pomocí proměnné y . V takové situaci o aplikovatelnosti Věty o existenci implicitní funkce (Věta 12.4.2) rozhoduje podmínka

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x \neq 0$$

a teorii je možné aplikovat na jednotkové kružnici s výjimkou bodů $(0, -1)$ a $(0, 1)$.

Věta 12.4.6 (O derivaci implicitní funkce (základní verze)). *Nechť $F: \mathbb{R}^{N+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, $a \in \mathbb{R}^N$, $b \in \mathbb{R}$. Nechť*

(i) $F(a, b) = 0$

(ii) *existuje okolí bodu (a, b) , kde F je třídy C^k*

(iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \neq 0$ *(parciální derivace podle poslední proměnné).*

Pak existují $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ existuje právě jedno $y_x \in \mathcal{U}_\Delta(b)$ splňující $F(x, y_x) = 0$ a funkce $\varphi: x \mapsto y_x$ je třídy C^k na $\mathcal{U}_\delta(a)$. Navíc

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))} \quad \text{pro všechna } j \in \{1, \dots, N\} \text{ a } x \in \mathcal{U}_\delta(a).$$

Důkaz. Podle Poznámky 12.4.3 jsou splněny předpoklady předchozí věty. Proto je funkce φ definována na $\mathcal{U}_\delta(a)$, je zde spojitá a tuto množinu zobrazuje do intervalu $(b - \Delta, b + \Delta)$. Případným zmenšením δ dosáhneme toho, že pro všechna $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ je $(x, \varphi(x))$ uvnitř okolí, kde je F třídy C^k . Zafixujeme $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$. Funkce F má v bodě $(x, \varphi(x))$ totální diferenciál. Pro $h \in \mathbb{R}^N$ a $s \in \mathbb{R}$ dostatečně blízko k počátku (ve své dimenzi) pak máme

$$F(x + \mathbf{h}, \varphi(x) + s) - F(x, \varphi(x)) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial F}{\partial x_i}(x, \varphi(x))h_i + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))s + \eta(\mathbf{h}, s),$$

kde η splňuje

$$\frac{\eta(\mathbf{h}, s)}{\|(\mathbf{h}, s)\|} \rightarrow 0 \quad \text{pro } (\mathbf{h}, s) \rightarrow \vec{0}.$$

Poslední vlastnost navíc umožňuje přepis

$$\begin{aligned} \eta(\mathbf{h}, s) &= \frac{\eta(\mathbf{h}, s)}{\|(\mathbf{h}, s)\|} \frac{h_1^2 + \dots + h_N^2 + s^2}{\|(\mathbf{h}, s)\|} \\ &= \frac{\eta(\mathbf{h}, s)}{\|(\mathbf{h}, s)\|} \frac{h_1}{\|(\mathbf{h}, s)\|} h_1 + \dots + \frac{\eta(\mathbf{h}, s)}{\|(\mathbf{h}, s)\|} \frac{h_N}{\|(\mathbf{h}, s)\|} h_N + \frac{\eta(\mathbf{h}, s)}{\|(\mathbf{h}, s)\|} \frac{s}{\|(\mathbf{h}, s)\|} s \\ &=: \xi_1(\mathbf{h}, s)h_1 + \dots + \xi_N(\mathbf{h}, s)h_N + \xi_{N+1}(\mathbf{h}, s)s, \end{aligned}$$

kde

$$\xi_i(\mathbf{h}, s) \rightarrow 0 \quad \text{pro } (\mathbf{h}, s) \rightarrow \vec{0} \quad \text{pro každé } i \in \{1, \dots, N+1\}. \quad (12.4.1)$$

Položme nyní výše $\mathbf{h} = t\mathbf{e}_j$, kde \mathbf{e}_j je j -tý bázový vektor a $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ je dostatečně malé. Pak pro $s := \varphi(x + \mathbf{h}) - \varphi(x)$ dostáváme

$$\begin{aligned} &F(x + t\mathbf{e}_j, \varphi(x + t\mathbf{e}_j)) - F(x, \varphi(x)) \\ &= \frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x))t + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))(\varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x)) \\ &\quad + \xi_j(t\mathbf{e}_j, \varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x))t \\ &\quad + \xi_{N+1}(t\mathbf{e}_j, \varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x))(\varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x)). \end{aligned}$$

Odtud díky tomu, že oba členy levé strany jsou nulové, máme

$$\frac{\varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x)}{t} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x)) + \xi_j(t\mathbf{e}_j, \varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) + \xi_{N+1}(t\mathbf{e}_j, \varphi(x + t\mathbf{e}_j) - \varphi(x))}.$$

Provedeme-li nyní limitní přechod $t \rightarrow 0$ (připomeňme, že φ je spojitá funkce a máme (12.4.1)), dostáváme dokazovaný vzorec ze znění věty. Protože parciální derivace na pravé straně získaného vzorce jsou spojitě na okolí bodu (a, b) a φ je spojitá na okolí bodu a , je rovněž spojitá $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}$ na odpovídajícím okolí bodu a . Tím je důkaz dokončen v případě, že $k = 1$.

Pokud $k = 2$, pro libovolné $i \in \{1, \dots, N\}$ máme díky spojitosti druhých parciálních derivací funkce F a spojitosti prvních parciálních derivací funkce φ použitím řetízkového pravidla (na třetím řádku z důvodu lepší čitelnosti vynecháváme argument $(x, \varphi(x))$)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(x) &= - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))} \right) \\ &= - \frac{\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x)) \right) \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) - \frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x)) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \right)}{\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \right)^2} \\ &= - \frac{\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x_j} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right) \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial x_j} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right)}{\left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2}. \end{aligned}$$

Z výsledného vzorce také vidíme, že spojitost druhých parciálních derivací funkce F a spojitost prvních parciálních derivací funkce φ implikují spojitost druhých parciálních derivací funkce φ . Pro $k \geq 3$ pokračujeme indukcí. Při počítání parciálních derivací l -tého řádu se využijí parciální derivace prvního až l -tého řádu funkce F a parciální derivace prvního až $(l-1)$ -tého řádu funkce φ . Spojitost zdůvodníme ze získaného vzorce pomocí aritmetiky spojitosti. \square

Poznámka 12.4.7. Když už máme dokázanou existenci parciálních derivací funkce φ , dá se při jejich výpočtu využívat následující pohodlnější postup (který se v praxi upřednostňuje před derivováním podílu). Vyjdeme z toho, že na $\mathcal{U}_\delta(a)$ platí rovnost $F(x, \varphi(x)) = 0$ a tu postupně derivujeme (pozor, pracujeme v \mathbb{R}^N , nikoliv v \mathbb{R}^{N+1})

$$0 = \frac{\partial 0}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} F(x, \varphi(x)) = \frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x).$$

Z této rovnosti je možné vyjádřit $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x, \varphi(x))$, neboť $\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \neq 0$ na $\mathcal{U}_\delta(a)$. Získanou rovnost (pro $F \in C^2$ na okolí bodu (a, b)) můžeme dále derivovat a dostáváme (opět pro přehlednost vynecháváme argument $(x, \varphi(x))$)

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial F}{\partial x_j} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x_j} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}. \end{aligned}$$

Takto bychom mohli pokračovat dále. Parciální derivace funkce φ nejvyššího řádu (ta nás zajímá) se vyskytuje vždy v jediném členu, je vždy vynásobena nenulovým výrazem $\frac{\partial F}{\partial y}$ (takže tímto výrazem můžeme dělit). V identitě se vyskytují parciální derivace funkce F nejvýše stejného řádu a dále parciální derivace funkce φ nižších řádů, které jsme si vyjádřili v předchozích krocích.

Poznámka 12.4.8. Samozřejmě není vůbec podstatné, že vyjadřujeme poslední proměnnou pomocí ostatních. Takto lze vyjadřovat kteroukoliv z proměnných, je-li parciální derivace funkce F vůči této proměnné ve studovaném bodě nenulová.

Příklad 12.4.9. Ukažme, že identita

$$\log \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$$

na jistém okolí bodu $(x_0, y_0) = (1, 0)$ jednoznačně určuje funkci $y = y(x)$ a spočítáme $y'(1)$ a $y''(1)$. Definujme funkci

$$F(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x}.$$

Okamžitě vidíme, že $F(1, 0) = \log 1 - \arctan 0 = 0$. Dále

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{x + y}{x^2 + y^2}$$

a

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2} - \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{y - x}{x^2 + y^2}.$$

Odtud jednak vidíme, že $\frac{\partial F}{\partial y}(1, 0) \neq 0$. Dále z pravidel pro derivaci podílu dostáváme, že F je třídy C^∞ na jakékoliv podmnožině \mathbb{R}^2 neobsahující počátek. Jsou tedy splněny předpoklady předchozích dvou vět, které nám dávají funkci $y = y(x)$ a můžeme ji derivovat. Použijeme postup z předchozí poznámky. Budeme derivovat rovnost

$$0 = \log \sqrt{x^2 + y^2(x)} - \arctan \frac{y(x)}{x}.$$

Na dostatečně malém okolí bodu 1 máme

$$0 = \frac{1}{2(x^2 + y^2)}(2x + 2yy') - \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \left(\frac{-y}{x^2} + \frac{y'}{x} \right). \quad (12.4.2)$$

Tedy v bodě $x = 1$ (připomeňme $y(1) = 0$) platí

$$0 = \frac{1}{2}(2 + 0 \cdot y'(1)) - 1 \cdot (0 + y'(1)) \quad \implies \quad y'(1) = 1.$$

Hodnotu $y''(1)$ zjistíme dalším derivováním vztahu (12.4.2) (pro pohodlnější derivování jej napřed upravíme do podoby $0 = \frac{x+y+(y-x)y'}{x^2+y^2}$) a máme

$$0 = \frac{(1 + y' + (y' - 1)y' + (y - x)y'')(x^2 + y^2) - (x + y + (y - x)y')(2x + 2yy')}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Do poslední identity dosadíme $x = 1$ (také $y(1) = 0$ a již spočítaný výsledek $y'(1) = 1$)

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{(1 + 1 + (1 - 1) \cdot 1 + (0 - 1)y''(1))(1 + 0) - (1 + 0 + (0 - 1) \cdot 1)(2 + 0)}{(1 + 0)^2} \\ &= 1 + 1 - y''(1) - 0 \cdot 2. \end{aligned}$$

Proto $y''(1) = 2$.

Posledně představená metoda derivování implicitně zadané funkce je natolik uživatelsky příjemná, že se často vyplatí přistupovat přes implicitní funkce k problémům, které svou povahou s implicitně zadanými funkcemi mají pramálo společného.

Příklad 12.4.10. Za pomoci teorie implicitních funkcí spočítejme druhou a třetí derivaci inverzní funkce. Nechť tedy máme standardní situaci, kdy funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má na okolí bodu $y_0 \in \mathbb{R}$ derivaci neměnicí znaménko (všude kladná, nebo všude záporná). Nechť na tomto okolí existují také druhá a třetí derivace funkce f . Vztah $f^{-1}(x) = y$ na vhodných množinách odpovídá vztahu $x = f(y)$, který využijeme ke konstrukci funkce F . Položme

$$F(x, y) = x - f(y)$$

(tedy $x = f(y)$ je splněno právě tehdy, když $F(x, y) = 0$). Označme $x_0 = f(y_0)$. Pak zřejmě $F(x_0, y_0) = 0$. Funkce F je třídy C^k právě tehdy, když funkce f je třídy C^k . Navíc $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = -f'(y_0) \neq 0$. Podle předchozí věty vztah $F(x, y)$ definuje C^k -funkci $x \mapsto y(x)$ (námi studovanou funkci f^{-1}). Postupným derivováním dostáváme z rovnosti $0 = x - f(y(x))$

$$\begin{aligned} 0 &= 1 - f'(y(x))y'(x) \\ 0 &= -f''(y(x))y'^2(x) - f'(y(x))y''(x) \\ 0 &= -f'''(y(x))y'^3(x) - 2f''(y(x))y'(x)y''(x) - f''(y(x))y'(x)y''(x) \\ &\quad - f'(y(x))y'''(x) \\ &= -f'''(y(x))y'^3(x) - 3f''(y(x))y'(x)y''(x) - f'(y(x))y'''(x). \end{aligned}$$

Z první rovnosti snadnou úpravou dostáváme nám známý vzorec

$$y'(x) = \frac{1}{f'(y(x))}.$$

Druhá rovnost spolu s právě získaným výsledkem dávají

$$y''(x) = -\frac{f''(y(x))y'^2(x)}{f'(y(x))} = -\frac{f''(y(x))}{f'^3(y(x))}$$

a podobně ze třetí rovnosti dostáváme

$$\begin{aligned} y'''(x) &= -\frac{f'''(y(x))y'^3(x) + 3f''(y(x))y'(x)y''(x)}{f'(y(x))} \\ &= -\frac{f'''(y(x))\frac{1}{f'^3(y(x))} - 3f''(y(x))\frac{1}{f'(y(x))}\frac{f''(y(x))}{f'^3(y(x))}}{f'(y(x))} \\ &= \frac{3f''^2(y(x)) - f'''(y(x))f'(y(x))}{f'^5(y(x))}. \end{aligned}$$

Poznámka 12.4.11. K derivování inverzní funkce přístup přes implicitní funkce není potřeba. Je možné derivovat základní vzoreček $y' = \frac{1}{f'(y(x))}$. Pokud pro přehlednost nebudeme psát argumenty, postup vypadá následovně

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{-f''y'}{f'^2} = \frac{-f''}{f'^3} \\ y''' &= \frac{-f'''y'f'^3 + 3f''f'^2f''y'}{f'^6} = \frac{-f'''f'^2 + 3f''^2f'}{f'^6} = \frac{3f''^2 - f'''f'}{f'^5}. \end{aligned}$$

Naše věty o implicitních funkcích nám umožňují pracovat s derivací, což je nejdůležitější veličina pro vyšetřování průběhu funkce.

Příklad 12.4.12. Uvažme vztah

$$e^y + \log x + xy = 0. \quad (12.4.3)$$

Levá strana má smysl pro $x > 0$ a $y \in \mathbb{R}$. Definujme $F(x, y) = e^y + \log x + xy$. Pro každé $x > 0$ pevné platí

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = -\infty, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \infty \quad \text{a} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = e^y + x > 0.$$

Odtud okamžitě vidíme, že pro každé $x > 0$ existuje jednoznačné $y(x)$ splňující $F(x, y(x)) = 0$. Ze základní verze Věty o derivaci implicitní funkce (Věta 12.4.6) dostáváme, že zobrazení $\varphi: x \mapsto y(x)$ splňuje $\varphi \in C^\infty((0, \infty))$. Povšimněme si dále, že platí

$$F(x, 0) = 0 \quad \iff \quad x = \frac{1}{e}.$$

Navíc

$$\varphi'\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}\left(\frac{1}{e}, 0\right)}{\frac{\partial F}{\partial y}\left(\frac{1}{e}, 0\right)} = -\frac{\frac{1}{x} + y|_{(x,y)=\left(\frac{1}{e}, 0\right)}}{e^y + x|_{(x,y)=\left(\frac{1}{e}, 0\right)}} = -\frac{e + 0}{1 + \frac{1}{e}} < 0.$$

Odtud $\varphi > 0$ na $(0, \frac{1}{e})$ a $\varphi < 0$ na $(\frac{1}{e}, \infty)$. Tento výsledek spolu se vzorcem

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{1}{x} + \varphi(x)}{e^{\varphi(x)} + x}$$

zaručují, že φ je klesající na $(0, \frac{1}{e})$. Navíc si ve formuli (12.4.3) povšimněme, že pro $x \rightarrow 0_+$ musí platit $y(x) \rightarrow \infty$, tedy

$$\lim_{x \rightarrow 0_+} \varphi(x) = \infty.$$

Podobně pozorováním formule (12.4.3) v případě, že $x \rightarrow \infty$, objevíme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0.$$

Zabývejme se dále otázkou, kdy platí $\varphi'(x) = 0$. Pro takový bod musí platit $\frac{1}{x} + y(x) = 0$ a s využitím (12.4.3) přicházíme k podmínce

$$\psi(x) := e^{-\frac{1}{x}} + \log x - 1 = 0.$$

Funkce ψ splňuje

$$\psi < 0 \quad \text{na } (\frac{1}{e}, 1], \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \psi(x) = \infty \quad \text{a} \quad \psi'(x) = -e^{-\frac{1}{x}} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} > 0 \quad \text{na } (1, \infty).$$

Odtud vidíme, že na intervalu $(\frac{1}{e}, \infty)$ existuje právě jeden bod x_0 , kde má funkce φ nulovou derivaci. Navíc spojitost φ' spolu s $\varphi'(\frac{1}{e}) < 0$ a $\varphi'(x_0) = 0$ implikují, že $\varphi' < 0$ na $(\frac{1}{e}, x_0)$ a φ je zde klesající. Naopak o intervalu (x_0, ∞) víme, že zde derivace nemá nulový bod, tedy φ je ryze monotonní a limitní chování v nekonečnu spolu se záporností funkce připouštějí pouze možnost, že funkce φ je zde rostoucí. Navíc jsme také zjistili, že v bodě x_0 je globální minimum.

Plná verze Věty o implicitní funkci pracuje s m -ticí funkcí $F_1, \dots, F_m: \mathbb{R}^{N+m} \rightarrow \mathbb{R}$ a nabízí vyjádření poslední m -tice proměnných pomocí proměnných ostatních.

Věta 12.4.13 (O implicitní funkci). *Nechť $N, m \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, $\vec{F}: \mathbb{R}^{N+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in \mathbb{R}^N$, $b \in \mathbb{R}^m$. Nechť*

- (i) $\vec{F}(a, b) = (0, \dots, 0)$
- (ii) *existuje okolí bodu (a, b) , kde všechny složky zobrazení \vec{F} jsou třídy C^k*
- (iii)

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a, b) & \frac{\partial F_1}{\partial y_2}(a, b) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(a, b) \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1}(a, b) & \frac{\partial F_2}{\partial y_2}(a, b) & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial y_m}(a, b) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(a, b) & \frac{\partial F_m}{\partial y_2}(a, b) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(a, b) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Pak existují $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ existuje právě jedno $y_x \in \mathcal{U}_\Delta(b)$ splňující $\vec{F}(x, y_x) = (0, \dots, 0)$ a pro zobrazení $\vec{\varphi}: x \mapsto y_x$ platí, že $\vec{\varphi} \in C^k(\mathcal{U}_\delta(a); \mathbb{R}^m)$.

Důkaz. Důkaz provedeme indukcí přes $m \in \mathbb{N}$. Případ $m = 1$ plyne z předchozích dvou vět. Předpokládejme, že věta platí pro nějaké $m \in \mathbb{N}$. Dokážeme platnost věty pro $m + 1$. Označme matici ze znění věty

$$\mathbb{A} := \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a, b) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_{m+1}}(a, b) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_{m+1}}{\partial y_1}(a, b) & \cdots & \frac{\partial F_{m+1}}{\partial y_{m+1}}(a, b) \end{pmatrix}.$$

Krok 1: případ jednotkové matice \mathbb{A} .

Myšlenka důkazu je následující. Nejprve použijeme funkci F_{m+1} k tomu, abychom vyjádřili proměnnou y_{m+1} pomocí ostatních proměnných, což nám umožňují předchozí věty. Pak použijeme funkce F_1, \dots, F_m k tomu, abychom vyjádřili proměnné y_1, \dots, y_m pomocí x_1, \dots, x_N , což nám umožňuje indukční předpoklad.

Přistupme k podrobnému důkazu. Protože $F_{m+1}(a, b) = 0$ a $\frac{\partial F_{m+1}}{\partial y_{m+1}} = 1 \neq 0$, podle předchozích dvou vět existují $\delta_1, \Delta_1 > 0$ taková, že pro každé

$$(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m) \in \mathcal{U}_{\delta_1}((a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_m))$$

existuje právě jedno $y_{m+1} \in \mathcal{U}_{\Delta_1}(b_{m+1})$ takové, že

$$F_{m+1}(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m, y_{m+1}) = 0.$$

Navíc zobrazení $\varphi_{m+1}: (x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m) \mapsto y_{m+1}$ splňuje

$$\varphi_{m+1} \in C^k(\mathcal{U}_{\delta_1}((a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_m))).$$

Nyní definujme pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$ pomocnou funkci

$$\begin{aligned} H_i(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m) \\ := F_i(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m, \varphi_{m+1}(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m)). \end{aligned}$$

Podle řetízkového pravidla platí v bodě $(a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_m)$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, m\}$ (připomeňme, že $\mathbb{A} = \mathbb{I}$)

$$\frac{\partial H_i}{\partial y_j} = \frac{\partial F_i}{\partial y_j} + \frac{\partial F_i}{\partial y_{m+1}} \frac{\partial \varphi_{m+1}}{\partial y_j} = \delta_{ij} + 0 \cdot \frac{\partial \varphi_{m+1}}{\partial y_j} = \delta_{ij},$$

tedy odpovídající matice parciálních derivací je jednotková (hlavně regulární). Pomocí řetízkového pravidla, hladkosti F_i a φ_{m+1} snadno nahlédneme, že

$$H_i \in C^k(\mathcal{U}_{\delta_1}((a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_m))).$$

Na funkce H_i proto můžeme aplikovat indukční předpoklad a dostáváme $\delta_2, \Delta_2 > 0$ taková, že pro každé $(x_1, \dots, x_N) \in \mathcal{U}_{\delta_2}((a_1, \dots, a_N))$ existuje jednoznačné $(y_1, \dots, y_m) \in \mathcal{U}_{\Delta_2}((b_1, \dots, b_m))$ splňující pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$

$$\begin{aligned} 0 &= H_i(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m) \\ &= F_i(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m, \varphi_{m+1}(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_m)) \end{aligned}$$

a zobrazení $\varphi_i: (x_1, \dots, x_N) \mapsto y_i$ jsou třídy C^k na $\mathcal{U}_{\delta_2}((a_1, \dots, a_N))$.

Z toho plynou všechny požadované výsledky až na to, že nemáme správný tvar okolí vůči proměnným y_1, \dots, y_{m+1} . Pokud si však připomeneme, že platí $\varphi_i(a_1, \dots, a_N) = b_i$ a funkce φ_i jsou spojité na dostatečně malých okolích bodu (a_1, \dots, a_N) , patřičným zmenšením δ_2 dosáhneme i tohoto výsledku.

Krok 2: případ obecné matice \mathbb{A} .

Protože \mathbb{A} je v obecném případě regulární, existuje inverzní matice \mathbb{A}^{-1} . Necht

nyní $\vec{L}: \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ je lineární (tedy C^∞) zobrazení reprezentované maticí \mathbb{A}^{-1} . Definujme zobrazení $\vec{T} := \vec{L} \circ \vec{F}$. Zřejmě se jedná o C^k -zobrazení na okolí bodu (a, b) . Navíc díky tomu, že řetězkové pravidlo odpovídá součinu matic, máme

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial y_1}(a, b) & \frac{\partial T_1}{\partial y_2}(a, b) & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial y_{m+1}}(a, b) \\ \frac{\partial T_2}{\partial y_1}(a, b) & \frac{\partial T_2}{\partial y_2}(a, b) & \cdots & \frac{\partial T_2}{\partial y_{m+1}}(a, b) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_{m+1}}{\partial y_1}(a, b) & \frac{\partial T_{m+1}}{\partial y_2}(a, b) & \cdots & \frac{\partial T_{m+1}}{\partial y_{m+1}}(a, b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Podle předchozích kroků existují $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $x \in \mathcal{U}_\delta(a)$ existuje právě jedno $z_x \in \mathcal{U}_\Delta(b)$ splňující $\vec{T}(x, z_x) = (0, \dots, 0)$ a jednotlivé složky zobrazení $\vec{\psi}: x \mapsto z_x$ jsou třídy C^k na $\mathcal{U}_\delta(a)$. Podle definice zobrazení T zřejmě platí

$$\vec{T}(x, z_x) = (0, \dots, 0) \iff \vec{F}(x, z_x) = (0, \dots, 0).$$

Odtud bod $z_x \in \mathbb{R}^{m+1}$ je hledaný bod y_x , hledané zobrazení $\vec{\varphi}$ je $\vec{\psi}$ a má požadované vlastnosti. \square

Příklad 12.4.14. Rovnice

$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 &= 1 \end{aligned}$$

jsou splněny v bodě $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$. Zabýváme se otázkou, zda na okolí tohoto bodu uvedené rovnice jednoznačně určují proměnné y, z pomocí proměnné x . Píšeme $(a_1, b_1, b_2) := (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ a zavedeme C^∞ -funkce

$$\begin{aligned} F_1(x, y, z) &= x + y + z \\ F_2(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 - 1. \end{aligned}$$

Máme

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2y & 2z \end{pmatrix}.$$

Odtud

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y}(a_1, b_1, b_2) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(a_1, b_1, b_2) \\ \frac{\partial F_2}{\partial y}(a_1, b_1, b_2) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(a_1, b_1, b_2) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} = -\sqrt{2} \neq 0.$$

Můžeme tedy použít Větu o implicitní funkci (Věta 12.4.13) a ta nám dává vyjádření $z = z(x)$ a $y = y(x)$ jako nekonečněkrát diferencovatelných funkcí na nějakém okolí bodu a_1 . Zde máme (protože je zde $N = 1$, jedná se o klasickou derivaci)

$$\begin{aligned} 0 &= (F_1(x, y(x), z(x)))' = 1 + y' + z' \\ 0 &= (F_2(x, y(x), z(x)))' = 2x + 2yy' + 2zz'. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme

$$\begin{aligned} y' &= -1 - z' \\ 0 &= 2x + 2y(-1 - z') + 2zz' = 2x - 2y + (2z - 2y)z'. \end{aligned}$$

Proto

$$z' = \frac{y-x}{z-y} \quad \text{a} \quad y' = -1 - \frac{y-x}{z-y} = \frac{x-z}{z-y}.$$

Speciálně

$$z'(a_1) = \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = 1 \quad \text{a} \quad y'(a_1) = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = -2.$$

Pokud by nás zajímaly derivace druhého řádu, můžeme dále počítat

$$\begin{aligned} 0 &= (F_1(x, y(x), z(x)))'' = (1 + y' + z')' = y'' + z'' \\ 0 &= (F_2(x, y(x), z(x)))'' = (2x + 2yy' + 2zz')' = 2 + 2y'^2 + 2yy'' + 2z'^2 + 2zz''. \end{aligned}$$

Odtud $y'' = -z''$ a

$$0 = 2 + 2y'^2 - 2yz'' + 2z'^2 + 2zz'' = 2 + 2y'^2 + 2z'^2 + (2z - 2y)z''.$$

Proto

$$z'' = \frac{1 + y'^2 + z'^2}{y-z} = \frac{(y-z)^2 + (x-z)^2 + (y-x)^2}{(y-z)^3} = -y''.$$

Poznámka 12.4.15. (i) Povšimněme si, že nenulovost determinantu ze znění věty je v našem případě ekvivalentní podmínce $y \neq z$. Proto se dá Věta o implicitní funkci (Věta 12.4.13) používat na okolí všech bodů splňujících

$$x + y + z = 0 \quad \text{a} \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

s výjimkou bodů, kde

$$x + y + z = 0 \quad \text{a} \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \text{a} \quad y = z.$$

(ii) Po krátkém výpočtu se dá zjistit, že zakázány jsou body $(\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{6}}, -\sqrt{\frac{1}{6}})$ a $(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{1}{6}}, \sqrt{\frac{1}{6}})$. Rovnice $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ popisuje jednotkovou sféru v \mathbb{R}^3 a rovnice $x + y + z = 0$ popisuje jednu z rovin procházejících počátkem. Obě rovnice jsou splněny na průniku těchto množin, což je kružnice o jednotkovém poloměru.

12.5 Rovnice ve tvaru totálního diferenciálu

V dalším budeme uvažovat rovnice typu

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{respektive} \quad M(x, y) \frac{dx}{dy} + N(x, y) = 0.$$

Tyto rovnice se často prezentují ve tvaru

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0. \quad (12.5.1)$$

Doposud jsme v našem výkladu nikdy nezavedli symboly „ dx “ a „ dy “ samostatně, nejedná se tedy o matematicky korektní zápis. To alespoň v této situaci napravíme.

Definice 12.5.1 (Rovnice ve tvaru totálního diferenciálu). Rovnici (12.5.1) nazveme *rovnici ve tvaru totálního diferenciálu* na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, jestliže existuje $U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ takové, že levá strana rovnice (12.5.1) je totálním diferenciálem funkce U na Ω , neboli pro všechna $(x, y) \in \Omega$ a $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ platí

$$dU(x, y)(h_1, h_2) = M(x, y)h_1 + N(x, y)h_2.$$

Funkci U v takovém případě nazýváme *potenciálem* rovnice (12.5.1).

Věta 12.5.2 (O řešení rovnice ve tvaru totálního diferenciálu). *Nechť U je potenciálem rovnice (12.5.1) na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $M, N \in C(\Omega)$ a $N \neq 0$ na Ω . Pak každým bodem $(x_0, y_0) \in \Omega$ prochází právě jedno řešení rovnice*

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$$

a je implicitně dáno vztahem

$$U(x, y) = U(x_0, y_0).$$

Pokud $M \neq 0$ na Ω , platí analogický výsledek pro rovnici

$$M(x, y) \frac{dx}{dy} + N(x, y) = 0.$$

Důkaz. Nejprve dokažme existenci. Podle Věty o implicitní funkci (Věta 12.4.13) vztah

$$U(x, y) - U(x_0, y_0) = 0$$

na jistém okolí bodu x_0 definuje funkci $y(x)$. Skutečně,

$$F(x, y) := U(x, y) - U(x_0, y_0) \in C^1(\Omega)$$

a

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial U}{\partial y}(x_0, y_0) = N(x_0, y_0) \neq 0.$$

Podle Věty o implicitní funkci (Věta 12.4.13) dále na tomto okolí platí

$$y'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x}}{\frac{\partial U}{\partial y}} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}.$$

Odtud

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0.$$

Nyní dokažme jednoznačnost. Pokud y splňuje $y(x_0) = y_0$, na nějakém okolí bodu x_0 řeší rovnici

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0$$

a U je potenciál této rovnice, pak podle řetízkového pravidla máme

$$\frac{d}{dx}U(x, y(x)) = \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial y} \frac{dy}{dx} = M(x, y) + N(x, y)y' = 0.$$

Podle Věty o nejednoznačnosti primitivní funkce (Věta 4.1.4) na odpovídajícím okolí musí platit $U(x, y(x)) = U(x_0, y_0)$. Řešení se proto na dostatečně malém okolí shoduje s jednoznačnou funkcí danou Větou o implicitní funkci (Věta 12.4.13).

Pro druhou rovnici a podmínku $M \neq 0$ na Ω je postup analogický. \square

Příklad 12.5.3. Uvažme rovnici

$$5x^4y + 2x^3y^2 + (x^5 + x^4y + 2y)y' = 0, \quad y(0) = 1.$$

Přepis do tvaru před hledáním potenciálu je

$$(5x^4y + 2x^3y^2) dx + (x^5 + x^4y + 2y) dy = 0.$$

V Příkladu 12.3.9 jsme našli potenciál

$$U(x, y) = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + y^2 + C \quad \text{na } \mathbb{R}^2.$$

Díky tomu, že funkce $N(x, y) := x^5 + x^4y + 2y$ splňuje $N(0, 1) = 2 \neq 0$, můžeme použít předchozí větu a řešení rovnice je na okolí počátku dáno vztahem

$$0 = U(x, y) - U(0, 1) = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + y^2 + C - (1 + C) = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + y^2 - 1$$

(povšimněte si, jak se aditivní konstanta C z nejednoznačnosti potenciálu vyrušila). U naší rovnice navíc nejsme závislí jen na Větě o implicitní funkci (Věta 12.4.13). Z přepisu

$$\left(\frac{1}{2}x^4 + 1\right)y^2 + x^5y - 1 = 0$$

dostáváme

$$y(x) = \frac{-x^5 \pm \sqrt{x^{10} + 2(x^4 + 2)}}{x^4 + 2},$$

přičemž počáteční podmínka $y(0) = 1$ připouští jen jednu větev řešení

$$y(x) = \frac{-x^5 + \sqrt{x^{10} + 2(x^4 + 2)}}{x^4 + 2} \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Poznamenejme ještě, že získané řešení je jednoznačné na \mathbb{R} . Skutečně, pokud by tomu tak nebylo, musely by v nějakém bodě na grafu výše uvedené funkce být

porušeny předpoklady Věty o implicitní funkci (Věta 12.4.13). V našem případě by muselo nastat

$$0 = N(x, y(x)) = x^5 + x^4 y(x) + 2y(x) \iff y(x) = \frac{-x^5}{x^4 + 2}.$$

Pokud poslední podmínku porovnáme se vzorcem pro $y(x)$, vidíme, že taková situace nenastane nikdy.

Poznámka 12.5.4. K existenci a jednoznačnosti v předchozím příkladu se dá přistupovat také přes Picard–Lindelöfovou větu (Věta 8.3.5). Rovnici si přepíšeme do tvaru

$$y' = -\frac{5x^4 y + 2x^3 y^2}{x^5 + x^4 y + 2y}.$$

Funkce dvou proměnných na pravé straně je spojitá na množině

$$\mathbb{R}^2 \setminus \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{-x^5}{x^4 + 2} \right\}.$$

Lokální lipschitzovskost ověříme zderivováním pravé strany podle y a opět nám vyjde podmínka $y \neq \frac{-x^5}{x^4 + 2}$ (není potřeba derivaci provádět, stačí si uvědomit, jak funguje vzoreček pro derivaci podílu dvou funkcí). Picard–Lindelöfovou větu (Věta 8.3.5) proto můžeme používat na množinách

$$\Omega_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R} \wedge y < \frac{-x^5}{x^4 + 2} \right\}$$

a

$$\Omega_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R} \wedge y > \frac{-x^5}{x^4 + 2} \right\}.$$

Připomeňme, že vektorové pole mít potenciál nemusí. Existence potenciálu je spíše vzácností a souvisí s podmínkou

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x},$$

která je v případě dostatečné hladkosti funkcí M, N a vhodného tvaru množiny Ω zároveň podmínkou nutnou i postačující.

Pokud uvedená podmínka není splněna, můžeme se ještě pokusit nalézt integrační faktor, který rovnici do vhodného tvaru převede. Zde se v praxi postupuje metodou částečného uhodnutí. Integrační faktor hledáme ve tvaru

$$\mu(x, y) = m(\Phi(x, y)),$$

kde funkci $\Phi(x, y)$ zkusíme nastřelit a funkce m nám v případě šťastného nástřelu vyjde z Věty o nutné podmínce pro integrační faktor (Věta 12.3.5), tedy

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu(x, y)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, y)N(x, y)).$$

Zde díky tvaru $\mu(x, y) = m(\Phi(x, y))$ máme (pro přehlednost vynecháváme argument (x, y) u funkcí M, N, Φ)

$$m'(\Phi(x, y)) \frac{\partial \Phi}{\partial y} M + m(\Phi(x, y)) \frac{\partial M}{\partial y} = m'(\Phi(x, y)) \frac{\partial \Phi}{\partial x} N + m(\Phi(x, y)) \frac{\partial N}{\partial x}.$$

K tomu stačí splnit

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} =: \Psi(x, y).$$

Pokud je možné přepsat $\Psi(x, y)$ do tvaru $H(\Phi(x, y))$ (toto je kritická část postupu, která se podaří jen málokdy), máme úlohu se separovanými proměnnými

$$\frac{m'(z)}{m(z)} = H(z)$$

a tu řeší

$$m(z) = e^{\int H(z) dz}.$$

Tím je nalezen požadovaný integrační faktor. Mezi nejčastěji používané volby patří

$$\Phi(x, y) = x, \quad \Phi(x, y) = y, \quad \Phi(x, y) = xy \quad \text{a} \quad \Phi(x, y) = x + y.$$

Aditivní konstanta při integraci v tomto případě nic zajímavého nepřináší.

Příklad 12.5.5. Uvažme úlohu

$$2xy + x^2y + \frac{y^3}{3} + (x^2 + y^2)y' = 0.$$

Nejedná se přímo o rovnici ve tvaru totálního diferenciálu, neboť

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + x^2 + y^2 \neq 2x = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Pokusme se hledat integrační faktor. Nejprve volíme $\Phi(x, y) = y$. Pak máme

$$\begin{aligned} \frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} &= \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{2x - (2x + x^2 + y^2)}{(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3}) \cdot 1 - (x^2 + y^2) \cdot 0} \\ &= \frac{-x^2 - y^2}{2xy + x^2y + \frac{y^3}{3}}. \end{aligned}$$

Výraz úplně napravo není možné zapsat jako funkci závisující pouze na y , čímž pro nás tento pokus končí neúspěchem.

Zkusme položit $\Phi(x, y) = x$. Pak

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{2x - (2x + x^2 + y^2)}{(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3}) \cdot 0 - (x^2 + y^2) \cdot 1} = 1.$$

To už je funkce závislá na zvolené proměnné x a odtud

$$m(x) = e^{\int 1 dx} = e^x.$$

Nyní přecházíme k rovnici ve tvaru totálního diferenciálu

$$e^x \left(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3} \right) dx + e^x (x^2 + y^2) dy = 0.$$

Proto

$$U(x, y) = \int e^x \left(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3} \right) dx = e^x \left(x^2y + \frac{y^3}{3} \right) + \varphi(y)$$

a

$$e^x (x^2 + y^2) = \frac{\partial U}{\partial y} = e^x (x^2 + y^2) + \varphi'(y) \quad \implies \quad \varphi'(y) = 0.$$

Celkově má naše rovnice řešení dané implicitně předpisem

$$e^x \left(x^2y + \frac{y^3}{3} \right) = C,$$

kde konstantu C určíme z počáteční podmínky a tu lze volit jakkoliv kromě případu $0 = N(x_0, y_0) = x_0^2 + y_0^2$.

Příklad 12.5.6. Uvažme úlohu

$$xy^2 + (x^2y - x)y' = 0.$$

Nejedná se přímo o rovnici ve tvaru totálního diferenciálu, neboť (ověření provádíme rovnou ve tvaru, který odpovídá čitateli ze vzorečku pro hledání integračního faktoru)

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 2xy - 1 - 2xy = -1 \neq 0.$$

Pokusme se hledat integrační faktor. Nejprve volíme $\Phi(x, y) = x$. Pak máme

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{-1}{(xy^2) \cdot 0 - (x^2y - x) \cdot 1} = \frac{1}{x^2y - x}$$

a hned vidíme, že jsme neuspěli. Nyní zkusme položit $\Phi(x, y) = y$. Pak

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{-1}{(xy^2) \cdot 1 - (x^2y - x) \cdot 0} = \frac{-1}{xy^2}$$

a opět jsme neuspěli. Zkusme dále volbu $\Phi(x, y) = x + y$. Ta dává

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{-1}{(xy^2) \cdot 1 - (x^2y - x) \cdot 1} = \frac{-1}{xy^2 - x^2y + x},$$

kde se výsledek nedá zapsat jako funkce pracující pouze s $x + y$ (pokud by to šlo, dvojice $(1, 0)$ a $(0, 1)$ by musely dostat stejnou funkční hodnotu).

Zkusme ještě $\Phi(x, y) = xy$. Dostáváme

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{-1}{(xy^2) \cdot x - (x^2y - x) \cdot y} = \frac{-1}{xy}.$$

Konečně jsme našli funkci závislou pouze na $\Phi(x, y)$. Dostáváme diferenciální rovnici

$$\frac{m'(z)}{m(z)} = -\frac{1}{z}$$

a tu řeší

$$m(z) = e^{-\int \frac{1}{z} dz} = e^{-\log |z|} = \frac{1}{|z|}.$$

Volíme integrační faktor $\mu(x, y) = \frac{1}{xy}$ (a dále už nepracujeme na souřadných osách). Máme rovnici ve tvaru totálního diferenciálu

$$y dx + \left(x - \frac{1}{y}\right) dy = 0.$$

Pro ni dosáváme

$$U(x, y) = \int y dx = xy + \varphi(y)$$

a

$$x - \frac{1}{y} = \frac{\partial U}{\partial y} = x + \varphi'(y) \quad \implies \quad \varphi'(y) = -\frac{1}{y}.$$

Celkově má naše rovnice řešení dané implicitně předpisem

$$xy - \log |y| = C,$$

kde konstantu C určíme z počáteční podmínky. Správné dořešení příkladu by požadovalo dále zkoumat možnost lepení na souřadných osách. Poznamenejme ještě, že formule $xy - \log |y| = C$ sice neumožňuje pohodlně vyjádřit y , ale máme

$$x = \frac{1}{y}(C + \log |y|).$$

Pokud by původní zadání bylo $(xy^2)x' + x^2y - x = 0$, měli bychom explicitní vzorec pro řešení. V některých aplikacích (zejména z geometrie) se skutečně stává, že nám příliš nezáleží na tom, zda řešíme úlohu $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$ nebo $M(x, y)x' + N(x, y) = 0$.

Příklad 12.5.7. Uvažme lineární rovnici prvního řádu

$$y' + p(x)y = f(x) \quad \iff \quad p(x)y - f(x) + y' = 0.$$

Pak $M(x, y) = p(x)y - f(x)$ a $N(x, y) \equiv 1$. Platí

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 0 - p(x) = -p(x).$$

Pokud je tedy $p \equiv 0$, máme rovnici ve tvaru totálního diferenciálu

$$-f(x) dx + 1 dy = 0.$$

Potenciál získáme z formulí (F je primitivní funkce k f)

$$U(x, y) = \int -f(x) dx = -F(x) + \varphi(y)$$

a

$$1 = \frac{\partial U}{\partial y} = \varphi'(y).$$

Proto je řešení dáno vztahem

$$-F(x) + y = C \quad \Longleftrightarrow \quad y = F(x) + C.$$

Neplatí-li $p \equiv 0$, zkusme hledat integrační faktor pomocí volby $\Phi(x, y) = x$. Odtud

$$\frac{m'(\Phi(x, y))}{m(\Phi(x, y))} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M \frac{\partial \Phi}{\partial y} - N \frac{\partial \Phi}{\partial x}} = \frac{-p(x)}{(p(x)y - f(x)) \cdot 0 - 1 \cdot 1} = p(x).$$

Dostáváme integrační faktor $\mu(x) = e^{P(x)}$, kde P je primitivní funkce k p . Rovnice má po přenásobení tvar

$$e^{P(x)}(p(x)y - f(x)) dx + e^{P(x)} dy = 0.$$

Potenciál získáme z formulí

$$U(x, y) = \int e^{P(x)} dy = e^{P(x)}y + \psi(x)$$

a

$$e^{P(x)}(p(x)y - f(x)) = \frac{\partial U}{\partial x} = e^{P(x)}p(x)y + \psi'(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \psi'(x) = -f(x)e^{P(x)}.$$

Celkově je řešení dáno implicitně vztahem

$$e^{P(x)}y - \int f(x)e^{P(x)} dx = C.$$

Odtud

$$y(x) = e^{-P(x)} \left(\int f(x)e^{P(x)} dx + C \right).$$

Poznámka 12.5.8. Poslední úloha se dá interpretovat tak, že naše nová metoda je schopna vyřešit lineární rovnice prvního řádu pouhou volbou $\Phi(x, y) = x$. Protože máme k dispozici i mnoho dalších funkcí dosaditelných za $\Phi(x, y)$, dá se říci, že metody řešení rovnic ve tvaru totálního diferenciálu jsou nesrovnatelně mocnější nástroj, než je metoda integračního faktoru pro lineární rovnice prvního řádu.

12.6 Lokální extrémy funkcí více proměnných

Definice 12.6.1 (Lokální extrémy). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na $M \subset \mathbb{R}^N$. Řekneme, že f má v bodě $a \in M$ *lokální maximum* vzhledem k M , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$f(x) \leq f(a) \quad \text{na } \mathcal{U}_\delta(a) \cap M.$$

Lokální minimum se definuje analogicky. Ostré lokální maximum a minimum definujeme pomocí ostrých nerovností a prstencových okolí.

Snadnou modifikací jednorozměrného důkazu obdržíme nutnou podmínku pro lokální extrém.

Věta 12.6.2 (Nutná podmínka pro lokální extrém). Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na $M \subset \mathbb{R}^N$, $a \in M$ je vnitřní bod množiny M a $i \in \{1, \dots, N\}$. Má-li f v bodě a lokální extrém (vzhledem k M) a existuje-li $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$, pak $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$.

Body splňující $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$ pro každé $i \in \{1, \dots, N\}$ se nazývají *stacionární body*. Už v jednorozměrném případě jsme viděli, že ve stacionárním bodě nemusí být lokální extrém (uvažte funkci $x \mapsto x^3$). Nicméně díky Taylorovu rozvoji jsme dokázali, že stacionarita bodu spolu s vhodnou kontrolou znaménka druhé derivace extrém v tomto bodě zaručují. Obdobný výsledek se pokusíme získat i ve vícerozměrném případě.

Definice 12.6.3 (Klasifikace kvadratických forem). Nechť A je symetrická matice typu $N \times N$ a $Q: \mathbb{R}^N \mapsto \mathbb{R}$ je jí odpovídající kvadratická forma, tedy

$$Q(\mathbf{h}) = (A\mathbf{h}, \mathbf{h}) = \sum_{i,j=1}^N a_{ij}h_ih_j \quad \text{pro všechna } \mathbf{h} \in \mathbb{R}^N.$$

Tato kvadratická forma se nazývá

- *pozitivně definitní*, jestliže $Q(\mathbf{h}) > 0$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N \setminus \{\mathbf{0}\}$
- *negativně definitní*, jestliže $Q(\mathbf{h}) < 0$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N \setminus \{\mathbf{0}\}$
- *pozitivně semidefinitní*, jestliže $Q(\mathbf{h}) \geq 0$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$
- *negativně semidefinitní*, jestliže $Q(\mathbf{h}) \leq 0$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$
- *indefinitní*, jestliže existují $\mathbf{h}, \mathbf{l} \in \mathbb{R}^N$ taková, že $Q(\mathbf{h}) < 0 < Q(\mathbf{l})$.

Připomeňme si metody určování definitnosti kvadratických forem. První metodou je diagonalizace procvičovaná v lineární algebře. Druhou metodou je převod na čtverec.

Příklad 12.6.4. Nechť

$$Q(\mathbf{h}) = h_1^2 + 4h_2^2 + 7h_3^2 + 4h_1h_2 + 2h_1h_3 + 16h_2h_3.$$

Tento předpis postupně upravujeme

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{h}) &= (h_1 + 2h_2 + h_3)^2 + 6h_3^2 + 12h_2h_3 \\ &= (h_1 + 2h_2 + h_3)^2 + (\sqrt{6}h_2 + \sqrt{6}h_3)^2 - 6h_2^2. \end{aligned}$$

Kvadratická forma je indefinitní, neboť máme

$$Q(-1, 1, -1) = 0 + 0 - 6 \quad \text{a} \quad Q(1, 0, 0) = 1 + 0 + 0.$$

Třetím nástrojem je Sylvesterovo kritérium, podle něhož je Q pozitivně definitní právě tehdy, když všechny hlavní subdeterminanty matice \mathbb{A} jsou kladné. Přejdem k matici, jejíž prvky mají obrácené znaménko, dostáváme, že Q je negativně definitní právě tehdy, když znaménko hlavních subdeterminantů je $(-1)^k$, kde k je pořadí subdeterminantu, neboli počet řádků hlavní submatice, z níž právě počítáme determinant. Pozor, toto platí pouze pro symetrické matice \mathbb{A} !

Příklad 12.6.5. Nechtě

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pak

$$D_1 := \det(-1) = -1 < 0, \quad D_2 := \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$$

a

$$D_3 := \det \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -4 + 0 + 0 - (-1) - 0 - 0 = -3 < 0.$$

Kvadratická forma je proto negativně definitní. Pokud bychom naopak pracovali s maticí $-\mathbb{A}$, měli bychom

$$D_1 = 1 > 0, \quad D_2 = 3 > 0, \quad D_3 = 3 > 0$$

a pozitivně definitní kvadratickou formu.

Občas (zejména v nízké dimenzi) se hodí charakterizace definitnosti pomocí znamének vlastních čísel a skutečnosti, že determinant se rovná součinu vlastních čísel.

Příklad 12.6.6. Nechtě

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pak $\det \mathbb{A} = -3$. Jedno vlastní číslo je proto kladné a druhé záporné. Odpovídající kvadratická forma je proto indefinitní.

Pro naše záměry se bude hodit ještě jedna charakterizace pozitivní definitnosti.

Lemma 12.6.7. *Kvadratická forma Q je pozitivně definitní právě tehdy, když existuje $\alpha > 0$ splňující $Q(\mathbf{h}) \geq \alpha \|\mathbf{h}\|^2$ pro všechna $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$.*

Důkaz. Implikace „ \Leftarrow “ je zřejmá. Dokažme „ \Rightarrow “. Definujme

$$\alpha := \inf\{Q(\mathbf{h}) : \|\mathbf{h}\| = 1\}.$$

Díky pozitivní definitnosti počítáme infimum ze samých kladných čísel, proto je $\alpha \geq 0$. Navíc Q je spojitá funkce a ta na jednotkové sféře (kompaktní množina) nabývá svého minima. Proto je $\alpha > 0$. Nyní pro libovolné $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^N \setminus \mathbf{0}$ máme

$$Q(\mathbf{h}) = Q\left(\|\mathbf{h}\| \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) = \|\mathbf{h}\|^2 Q\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) \geq \alpha \|\mathbf{h}\|^2.$$

Pro $\mathbf{h} = \mathbf{0}$ je nerovnost zřejmě splněna. \square

Poznámka 12.6.8. Negativní definitnost se dá obdobně charakterizovat pomocí podmínky $Q(\mathbf{h}) \leq -\alpha \|\mathbf{h}\|^2$.

Věta 12.6.9 (Postačující podmínka pro lokální extrém). *Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^N$ je stacionární bod funkce f a existuje $\delta > 0$ takové, že $f \in C^3(\mathcal{U}_\delta(a))$. Definujme kvadratickou formu $Q: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem*

$$Q(\mathbf{h}) := d^2 f(a)(\mathbf{h}, \mathbf{h}) = \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j.$$

*Je-li Q pozitivně definitní, f má v bodě a ostré lokální minimum.
Je-li Q negativně definitní, f má v bodě a ostré lokální maximum.
Je-li Q indefinitní, f nemá v bodě a lokální extrém.*

Důkaz. Podle Taylorova vzorce na $\mathcal{U}_\delta(a)$ platí

$$\begin{aligned} f(a + \mathbf{h}) &= f(a) + \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j \\ &\quad + \frac{1}{6} \sum_{i,j,k=1}^N \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(a + \theta \mathbf{h}) h_i h_j h_k \\ &= f(a) + 0 + \frac{1}{2} Q(\mathbf{h}) + \frac{1}{6} \sum_{i,j,k=1}^N \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(a + \theta \mathbf{h}) h_i h_j h_k. \end{aligned}$$

Je-li nyní Q pozitivně definitní, pak podle předchozího lemmatu pro $\|\mathbf{h}\|$ dostatečně malé máme

$$\begin{aligned} f(a + \mathbf{h}) &= f(a) + \frac{1}{2} Q(\mathbf{h}) + \frac{1}{6} \sum_{i,j,k=1}^N \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(a + \theta \mathbf{h}) h_i h_j h_k \\ &\geq f(a) + \frac{1}{2} \alpha \|\mathbf{h}\|^2 - \sum_{i,j,k=1}^N \max_{\bar{\mathcal{U}}_{\frac{\delta}{2}}(a)} \left| \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} \right| |h_i| |h_j| |h_k| \\ &\geq f(a) + \frac{1}{2} \alpha \|\mathbf{h}\|^2 - C \|\mathbf{h}\|^3 = f(a) + \left(\frac{1}{2} \alpha - C \|\mathbf{h}\| \right) \|\mathbf{h}\|^2 \\ &\geq f(a) + \frac{1}{4} \alpha \|\mathbf{h}\|^2. \end{aligned}$$

Analogicky postupujeme v případě negativně definitní formy. Je-li Q indefinitní, pak existují $\mathbf{h}, \mathbf{l} \in \mathbb{R}^N$ taková, že $Q(\mathbf{h}) < 0 < Q(\mathbf{l})$. Pro $t \in (0, 1)$ dostatečně malé pak máme ($\theta \in (0, 1)$ závisí na \mathbf{t} i \mathbf{h})

$$\begin{aligned} f(a + t\mathbf{h}) &= f(a) + \frac{1}{2}Q(t\mathbf{h}) + \frac{1}{6} \sum_{i,j,k=1}^N \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(a + \theta t\mathbf{h}) t^3 h_i h_j h_k \\ &\leq f(a) + \frac{1}{2}t^2 Q(\mathbf{h}) + Ct^3 < f(a). \end{aligned}$$

Podobně $f(a + t\mathbf{l}) > f(a)$ pro $t \in (0, 1)$ dostatečně malé. \square

Poznámka 12.6.10. (i) Stacionární bod, v němž je Q indefinitní, se nazývá *sedlový bod*. Typickým případem je počátek pro funkci $f(x, y) = x^2 - y^2$.

(ii) Matici druhých parciálních derivací se říká *Hessova matice*. Značíme ji $\mathbb{H}_f(x)$.

(iii) Pokud je ve stacionárním bodě Q netriviální a pozitivně semidefinitní, pomocí konce předchozího důkazu nahlédneme, že v tomto bodě nemůže být lokální maximum. Nicméně lokální minimum v něm být může a nemusí. Uvažte počátek a funkce $f(x, y) = x^2 \pm y^4$. Podobně pro netriviální negativně semidefinitní formu.

(iv) Pokud je kvadratická forma příslušející druhému diferenciatlu pozitivně semidefinitní na nějakém okolí stacionárního bodu, v bodě je (obecně neostré) lokální minimum. To nám dá následující modifikace finálního výpočtu z předchozího důkazu

$$\begin{aligned} f(a + \mathbf{h}) &= f(a) + \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a + \theta \mathbf{h}) h_i h_j \\ &= f(a) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a + \theta \mathbf{h}) h_i h_j \geq f(a). \end{aligned}$$

Podobně pro negativně semidefinitní kvadratickou formu na okolí stacionárního bodu.

(v) V případě, kdy nám předchozí věta poskytuje neplnohodnotnou nebo žádnou informaci, nezbyvá, než se pokusit použít elementární prostředky.

Příklad 12.6.11. Zkoumejme lokální extrémy funkce

$$f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$$

na \mathbb{R}^3 . Jedná se o $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ -funkci, jejíž gradient a Hessova matice mají tvar

$$\nabla f(x, y, z) = (3x^2 + 12y, 2y + 12x, 2z + 2) \quad \text{a} \quad \mathbb{H}_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 6x & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Z tvaru gradientu snadno nalezneme stacionární body

$$a = (0, 0, -1) \quad \text{a} \quad b = (24, -144, -1).$$

V bodě b se pokusíme aplikovat Sylvesterovo kritérium. Máme

$$D_1 = 6 \cdot 24 > 0, \quad D_2 = 6 \cdot 24 \cdot 2 - 12^2 > 0 \quad \text{a} \quad D_3 = 6 \cdot 24 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 12^2 > 0.$$

Hessova matice je zde pozitivně definitní. Proto f má v bodě b ostré lokální minimum. V bodě a máme

$$D_1 = 0.$$

Odtud vidíme, že Hessova matice už nemůže být ani pozitivně, ani negativně definitní. Navíc

$$D_3 = -2 \cdot 12^2 \neq 0.$$

Všechna vlastní čísla jsou proto nenulová, a proto je Hessova matice indefinitní a v bodě a je sedlový bod.

Příklad 12.6.12. Zkoumejme lokální extrémů funkce

$$f(x, y) = x^2 + y^4 - y^3$$

na \mathbb{R}^2 . Jedná se o $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ -funkci, jejíž gradient a Hessova matice mají tvar

$$\nabla f(x, y) = (2x, 4y^3 - 3y^2) \quad \text{a} \quad \mathbb{H}_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12y^2 - 6y \end{pmatrix}.$$

Z tvaru gradientu snadno nalezneme stacionární body $a = (0, 0)$ a $b = (0, \frac{3}{4})$. V bodě b máme

$$\mathbb{H}_f(0, \frac{3}{4}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{27}{4} - \frac{18}{4} \end{pmatrix}.$$

Hessova matice je zde pozitivně definitní. Proto f má v bodě b ostré lokální minimum. V bodě a máme

$$\mathbb{H}_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hessova matice je netriviální a pozitivně semidefinitní. V počátku proto nemůže být lokální maximum. Pokud si však povšimneme chování funkce f na y -ové ose, tedy

$$f(0, y) = y^4 - y^3 = y^3(y - 1)$$

(pro $y \in (-1, 0)$ máme kladné funkční hodnoty, pro $y \in (0, 1)$ záporné), okamžitě dostáváme, že v počátku není lokální extrém.

Příklad 12.6.13. Zkoumejme lokální extrémů funkce

$$f(x, y) = x^2 + y^4 - y^5$$

na \mathbb{R}^2 . Jedná se o $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ -funkci, jejíž gradient a Hessova matice mají tvar

$$\nabla f(x, y) = (2x, 4y^3 - 5y^4) \quad \text{a} \quad \mathbb{H}_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12y^2 - 20y^3 \end{pmatrix}.$$

Z tvaru gradientu snadno nalezneme stacionární body $a = (0, 0)$ a $b = (0, \frac{4}{5})$. V bodě b máme

$$\mathbb{H}_f(0, \frac{4}{5}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{192}{25} - \frac{256}{25} \end{pmatrix}.$$

Hessova matice je zde indefinitní. Proto f má v b sedlový bod.

V bodě a máme

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hessova matice je netriviální a pozitivně semidefinitní. V počátku proto nemůže být lokální maximum. Na druhou stranu, máme

$$f(x, y) = x^2 + y^4 - y^5 = x^2 + y^4(1 - y).$$

Odtud $f > 0$ na $(-1, 1)^2 \setminus \{0, 0\}$, a proto je v počátku ostré lokální minimum.

12.7 Globální extrémy funkcí více proměnných

Základní existenční nástroj pro existenci globálních extrémů spojitých funkcí jsme už měli a to sice existenci extrémů spojitých funkcí na kompaktních množinách. Výsledek se dá lehce rozšířit, využijeme-li ještě základní vlastnosti limity funkce.

Tvrzení 12.7.1. *Nechť $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $M \subset \mathbb{R}^N$.*

- (i) *Je-li M omezená a uzavřená, f zde nabývá svého maxima a minima.*
- (ii) *Je-li $M = \mathbb{R}^N$ a $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, f zde nabývá svého minima. Podobně pro maximum.*
- (iii) *Je-li $M = \mathbb{R}^N$, $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = 0$ a existuje bod, v němž má f zápornou hodnotu, pak na M nabývá svého minima. Podobně pro maximum.*

Důkaz. První výsledek již známe, neboť omezenost a uzavřenost v konečnědimenzionálním prostoru implikují kompaktnost. Dokažme druhý výsledek. Z definice limity existuje $R > 0$ takové, že

$$f > f(0) \quad \text{na } \mathbb{R}^N \setminus \mathcal{U}_R(0).$$


Navíc $\overline{\mathcal{U}_R(0)}$ je kompaktní, proto zde f nabývá svého minima a platí

$$\min_M f = \min_{\overline{\mathcal{U}_R(0)}} f \leq f(0).$$

Z toho již plyne požadovaný výsledek. Ostatní tvrzení dokážeme pomocí podobné myšlenky. \square

Příklad 12.7.2. Uvažme funkci $f(x, y) = x^2 + y^2$ na množině $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$.

Jedná se o spojitou funkci na kompaktní množině, proto zde musí nabývat svého maxima a minima, které se nyní pokusíme najít. Předně každý globální extrém na otevřené množině je i lokálním extrémem, proto můžeme použít nutnou

Obrázek 12.3: Ilustrace množiny $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$.

podmínku pro lokální extrém pro vyloučení velkého počtu bodů. Skutečně, funkce f splňuje

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

Proto ve vnitřku množiny M s výjimkou počátku nikde globální extrém být nemůže. Hranice množiny M je tvořena čtyřmi úsečkami. Na úsečce v prvním kvadrantu se dají funkční hodnoty popsat pomocí

$$\varphi_1(x) := f(x, 1-x) = x^2 + (1-x)^2 = 2x^2 - 2x + 1.$$

Je jasné, že pokud funkce φ_1 nemá lokální extrém v nějakém bodě $x \in (0, 1)$, pak ani funkce f nemá lokální extrém (vůči M) v bodě $(x, 1-x)$. Protože

$$\varphi_1'(x) = 4x - 2 \quad \text{na } (0, 1),$$

funkce f nemá globální extrém v žádném bodě tvaru $(x, 1-x)$, kde $x \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$.

Ve druhém kvadrantu podobně používáme funkci

$$\varphi_2(x) := f(x, 1+x) = 2x^2 + 2x + 1 \quad \text{na } (-1, 0).$$

Pro její derivaci máme

$$\varphi_2'(x) = 4x + 2 \quad \text{na } (-1, 0).$$

To má za následek, že ani v bodech tvaru $(x, 1+x)$, kde $x \in (-1, 0) \setminus \{-\frac{1}{2}\}$, není globální extrém.

Ve třetím kvadrantu používáme funkci

$$\varphi_3(x) := f(x, -1-x) = 2x^2 + 2x + 1 \quad \text{na } (-1, 0).$$

Pro její derivaci máme

$$\varphi_3'(x) = 4x + 2 \quad \text{na } (-1, 0).$$

Proto ani v bodech tvaru $(x, -1-x)$, kde $x \in (-1, 0) \setminus \{-\frac{1}{2}\}$, není globální extrém.

Konečně, ve čtvrtém kvadrantu používáme funkci

$$\varphi_4(x) := f(x, x-1) = 2x^2 - 2x + 1 \quad \text{na } (0, 1).$$

Pro její derivaci máme

$$\varphi_4'(x) = 4x - 2 \quad \text{na } (0, 1).$$

Tedy ani v bodech tvaru $(x, x-1)$, kde $x \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$, není globální extrém. Shrňme-li dosavadní výsledky, pak víme, že funkce f svých globálních extrémů nabývá, ale nemůže to být v žádném bodě s výjimkou bodů $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ a $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Do těchto bodů stačí již jen dosadit

$$f(0, 0) = 0, \quad f(1, 0) = f(0, 1) = f(-1, 0) = f(0, -1) = 1,$$

$$f(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = f(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

a již víme vše, co potřebujeme.

Poznámka 12.7.3. Samozřejmě šlo využít symetrie a uvažovat pouze první kvadrant. Pak ovšem musíme navíc uvažovat uměle vzniklou hranici.

Poznámka 12.7.4. Při právě použité metodě nevádí, pokud nebudeme příliš důslední při vylučování bodů, kde extrém být nemůže. Poslední fáze (dosazování) si s takovými body poradí.

Ve vyšší dimenzi může být poměrně komplikovaný rozklad na množiny, kde ověřujeme nutnou podmínku lokálního extrému pro funkci vyšetřovanou pomocí funkcí pomocných. Někdy bývá výhodný popis takových množin pomocí výroků. Dále si musíme kompaktní množinu někdy uměle vyrobit a pak ji porovnat s množinou původní.

Příklad 12.7.5. Vyšetřujeme extrémy funkce $F(x, y, z) = \frac{x+y}{1+z\sqrt{z}}$ na množině

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq x^2 \wedge z \geq |y|\}.$$

Nejprve si povšimněme toho, že

$$(\pm 1, 0, 1) \in M \quad \text{a} \quad f(\pm 1, 0, 1) = \pm \frac{1}{2},$$

a pro $(x, y, z) \in M$ takové, že $z \geq 25$ platí

$$\begin{aligned} |f(x, y, z)| &\leq \left| \frac{x}{1+z\sqrt{z}} \right| + \left| \frac{y}{1+z\sqrt{z}} \right| \leq \frac{\sqrt{z}}{1+z\sqrt{z}} + \frac{z}{1+z\sqrt{z}} \\ &\leq \frac{1}{z} + \frac{1}{\sqrt{z}} \leq \frac{6}{25} < \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Proto na kompaktní množině (omezená množina, která je průnikem tří uzavřených množin)

$$N := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq x^2 \wedge z \geq |y| \wedge z \leq 25\}$$

funkce f nabývá svého maxima a minima a platí

$$\min_N f = \min_M f \quad \text{a} \quad \max_N f = \max_M f.$$

Stačí tedy vyšetřovat extrémů na množině N . Množinu N si rozdělíme na deset kusů

$$N_1 = \{z \in (0, 25) \wedge x \in (-\sqrt{z}, \sqrt{z}) \wedge y \in (-z, z)\}$$

$$N_2 = \{z \in (0, 25) \wedge x \in (-\sqrt{z}, \sqrt{z}) \wedge y = -z\}$$

$$N_3 = \{z \in (0, 25) \wedge x \in (-\sqrt{z}, \sqrt{z}) \wedge y = z\}$$

$$N_4 = \{z \in (0, 25) \wedge x = -\sqrt{z} \wedge y \in (-z, z)\}$$

$$N_5 = \{z \in (0, 25) \wedge x = \sqrt{z} \wedge y \in (-z, z)\}$$

$$N_6 = \{z \in (0, 25) \wedge x = -\sqrt{z} \wedge y = -z\}$$

$$N_7 = \{z \in (0, 25) \wedge x = -\sqrt{z} \wedge y = z\}$$

$$N_8 = \{z \in (0, 25) \wedge x = \sqrt{z} \wedge y = -z\}$$

$$N_9 = \{z \in (0, 25) \wedge x = \sqrt{z} \wedge y = z\}$$

$$N_{10} = \{(0, 0, 0)\} \cup (N \cap \{z = 25\}).$$

Podle předchozích výpočtů a podle $f(0, 0, 0) = 0$ hledané extrémů nemohou být na množině N_{10} . Na množině N_1 (otevřená množina) máme

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + z\sqrt{z}},$$

proto extrémů nejsou ani zde. Pro studium chování funkce f na N_2 použijeme pomocnou funkci

$$\varphi_2(x, z) := \frac{x - z}{1 + z\sqrt{z}}$$

definovanou na otevřené množině $\{z \in (0, 25) \wedge x \in (-\sqrt{z}, \sqrt{z})\}$. Díky tomu, že $\frac{\partial \varphi_2}{\partial x} = \frac{1}{1 + z\sqrt{z}}$, hledané extrémů nejsou ani zde. Podobně pro množinu N_3 .

V případě množiny N_4 je rozhodující chování

$$\varphi_4(y, z) := \frac{-\sqrt{z} + y}{1 + z\sqrt{z}}$$

na otevřené množině $\{z \in (0, 25) \wedge y \in (-z, z)\}$. Díky tomu, že $\frac{\partial \varphi_4}{\partial y} = \frac{1}{1 + z\sqrt{z}}$, ani zde hledané extrémů nejsou. Podobně pro množinu N_5 .

Přístupme k množinám N_6, N_7, N_8, N_9 . Zde zkouáme funkce typu

$$\frac{\pm\sqrt{z} \pm z}{1 + z^2} \quad \text{pro } z \in (0, 25).$$

Z dosavadních výpočtů a právě uvedených formulí platí

$$-\min_M f = \max_M f = \max_{z \in (0, 25)} \frac{\sqrt{z} + z}{1 + z\sqrt{z}} = \max_{t \in (0, 5)} \frac{t + t^2}{1 + t^3} = \max_{t \in (0, 5)} \frac{t}{t^2 - t + 1} = 1.$$

Úplně napravo jsme použili

$$\left(\frac{t}{t^2 - t + 1}\right)' = \frac{t^2 - t + 1 - t(2t - 1)}{(t^2 - t + 1)^2} = \frac{1 - t^2}{(t^2 - t + 1)^2}.$$

Při popisu chování funkce na hranici se také mohou hodit polární nebo sférické souřadnice.

Příklad 12.7.6. Zkoumejme extrémy funkce $f(x, y) = 4x + 3y$ na uzavřeném jednotkovém kruhu. Extrémů se opět nabývá. Na vnitřku kruhu platí

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3,$$

extrémy proto musí být na hranici. Tu popíšeme pomocí polárních souřadnic

$$x = \cos t \quad \text{a} \quad y = \sin t \quad \text{pro } t \in [0, 2\pi).$$

pro funkci $\varphi(t) = f(\cos t, \sin t)$ máme díky Cauchy–Schwarzově nerovnosti pro skalární součin (Věta 11.1.12)

$$|f(t)| = |4 \cos t + 3 \sin t| = |(4, 3) \cdot (\cos t, \sin t)| \leq \|(4, 3)\| \|(\cos t, \sin t)\| = 5 \cdot 1 = 5,$$

přičemž hodnoty na pravé straně je dosaženo, jsou-li vektory ve skalárním součinu rovnoběžné. Odtud

$$\min_M f = -5 \quad \text{a} \quad \max_M f = 5.$$

V některých případech může být výhodnější (nebo jediné možné) popsat hranici množiny implicitně. Tehdy je třeba použít níže uvedený nástroj. Ten může být někdy výhodný i za situací, kdy lze vyjádřit hranici explicitně, ale příslušné vyjádření je příliš komplikované.

Věta 12.7.7 (O Lagrangeových multiplikatorech). *Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $m \in \mathbb{N}$, $m < N$ a $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(\Omega)$. Označme*

$$M = \{x \in \Omega: g_i(x) = 0 \text{ pro všechna } i \in \{1, \dots, m\}\}.$$

Nechť matice $\{\frac{\partial g_i(a)}{\partial x_j}\}_{i=1, j=1}^{m, N}$ má hodnotu rovnu m . Jestliže f má v $a \in M$ lokální extrém vzhledem k M , pak existují čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ taková, že

$$\nabla f(a) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(a).$$

Důkaz. Označme $s = N - m$. Díky předpokladu o hodnotě matice popsané ve větě lze v matici $\{\frac{\partial g_i(a)}{\partial x_j}\}_{i=1, j=1}^{m, N}$ najít s takových sloupců, že jejich vynecháním získáme regulární čtvercovou matici. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že jsme vynechali prvních s sloupců. Aplikací Věty o implicitní funkci (Věty 12.4.13)

dostáváme $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každý bod $(x_1, \dots, x_s) \in \mathcal{U}_\delta((a_1, \dots, a_s))$ existuje právě jeden bod $(x_{s+1}, \dots, x_N) \in \mathcal{U}_\Delta((a_{s+1}, \dots, a_N))$, který budeme v dalším značit $\vec{\varphi}(x_1, \dots, x_s)$, splňující pro všechna $i \in \{1, \dots, m\}$

$$0 = g_i(x_1, \dots, x_s, \varphi_1(x_1, \dots, x_s), \dots, \varphi_m(x_1, \dots, x_s)) := \eta_i(x_1, \dots, x_s).$$

Navíc $\vec{\varphi} \in C^1(\mathcal{U}_\delta((a_1, \dots, a_s)); \mathbb{R}^m)$. Definujme $\psi: \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$ na $\mathcal{U}_\delta((a_1, \dots, a_s))$ předpisem

$$\psi(x_1, \dots, x_s) = f(x_1, \dots, x_s, \varphi_1(x_1, \dots, x_s), \dots, \varphi_m(x_1, \dots, x_s)).$$

Pak podle řetízkového pravidla $\psi \in C^1(\mathcal{U}_\delta((a_1, \dots, a_s)))$ a podle předpokladu věty má v bodě (a_1, \dots, a_s) lokální extrém. Proto pro všechna $j \in \{1, \dots, s\}$ platí podle řetízkového pravidla

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_N) + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_{s+k}}(a_1, \dots, a_N) \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s). \end{aligned} \quad (12.7.1)$$

Navíc platí pro všechna $j \in \{1, \dots, s\}$ a všechna $i \in \{1, \dots, m\}$

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \eta_i}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s) = \frac{\partial \eta_i}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s) \\ &= \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_N) + \sum_{k=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_{s+k}}(a_1, \dots, a_N) \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s). \end{aligned} \quad (12.7.2)$$

Definujme nyní lineárně nezávislé vektory $\mathbf{v}_j, j \in \{1, \dots, s\}$, předpisem

$$\mathbf{v}_j = \left(\delta_{1j}, \delta_{2j}, \dots, \delta_{sj}, \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s), \dots, \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_s) \right).$$

Definujme ještě

$$H = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$$

a nechť H^\perp je ortogonální doplněk H v \mathbb{R}^N . Podle (12.7.1) máme

$$\nabla f(a) \cdot \mathbf{v}_j = 0 \quad \text{pro každé } j \in \{1, \dots, s\}$$

a podle (12.7.2) zase

$$\nabla g_i(a) \cdot \mathbf{v}_j = 0 \quad \text{pro každé } j \in \{1, \dots, s\} \text{ a } i \in \{1, \dots, m\}.$$

Odtud $\nabla f(a) \in H^\perp$ a $\nabla g_i(a) \in H^\perp$ pro každé $\{1, \dots, m\}$. Dokonce musí platit

$$\text{span}\{\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_m(a)\} = H^\perp,$$

neboť podle předpokladu o matici je nalevo m -dimenzionální prostor a prostor napravo má dimenzi $N - s = m$ (podívejte se na definici H a H^\perp). Proto musí být $\nabla f(a)$ lineární kombinací $\nabla g_i(a), i \in \{1, \dots, m\}$. \square

Poznámka 12.7.8. (i) Čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ se nazývají *Lagrangeovy multiplikátory*.
(ii) Jednotlivé funkce g_1, \dots, g_m se nazývají *vazby*. Odpovídajícím extrémům se říká *vázané extrémy*.
(iii) Přestože se znění věty týká lokálních extrémů, tato věta se v praxi takřka výhradně používá na hledání extrémů globálních. Na druhou stranu, existují obsáhlejší verze věty umožňující vytvořit kvadratickou formu, jejíž definitnost určuje typ lokálního extrému (zde je potřeba postupovat velmi opatrně, musí dojít ke snížení dimenze za pomoci Věty o implicitní funkci (Věta 12.4.13)).
(iv) Předchozí věta se v praxi používá podobně jako nutná podmínka k vyloučení bodů, v nichž lokální extrém být nemůže. Tentokrát nám ale zbudou dva druhy bodů. Jednak to jsou body, které porušují podmínku o hodnosti matice, dále body, které splňují vazební podmínky a existují pro ně Lagrangeovy multiplikátory. Ve druhém případě máme soustavu

$$\begin{aligned} g_i(a) &= 0 && \text{pro } i \in \{1, \dots, m\} \\ \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) &= \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a) && \text{pro } j \in \{1, \dots, N\}. \end{aligned}$$

Celkově v tomto případě máme $m + N$ (obecně nelineárních) rovnic pro $N + m$ neznámých $a_1, \dots, a_N, \lambda_1, \dots, \lambda_m$. Hodnotu konstant $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ znát nepotřebujeme.

(v) Výše uvedený postup je také možno interpretovat tak, že si definujeme pomocnou funkci

$$L(x_1, \dots, x_N) := f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$$

a zkoumáme, které body z množiny M mohou být stacionárními body funkce L alespoň pro jednu sadu parametrů $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Ekvivalentně můžeme definovat dokonce

$$L(x_1, \dots, x_N, \lambda_1, \dots, \lambda_m) := f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$$

a zkoumat stacionární body této funkce $N + m$ proměnných.

Nyní si novou metodu ukážeme na příkladech. Čtenář si jistě všimne, že všechny níže uvedené příklady se dají řešit rychleji bez použití Lagrangeových multiplikátorů (třeba pomocí polárních souřadnic). Upřímní autoři zde musí přiznat, že neznají jediný příklad, u kterého by měl výpočet za použití Lagrangeových multiplikátorů rozumnou délku, a zároveň příklad nešel řešit elementárnějším a rychlejším způsobem.

Příklad 12.7.9. Hledejme globální extrémy funkce $f(x, y) = x^3 + y^3$ na množině $M = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. Máme spojitou funkci na kompaktu, proto se extrémů nabývá. Na vnitřku množiny M použijeme nutnou podmínku, která nám spolu s

$$\nabla f = (3x^2, 3y^2)$$

dává počátek jako jediný bod podezřelý z extrému. V tomto bodě však extrém být nemůže, protože se v každém jeho okolí nalézají jak body s kladnou funkční hodnotou, tak body se zápornou funkční hodnotou, zatímco v počátku je funkční hodnota nulová. Na hranici množiny M použijeme metodu Lagrangeových multiplikátorů. Definujme

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

Předně $\nabla g = (2x, 2y)$. Proto je podmínka o hodnotě matice porušena pouze v počátku. Ten ale nesplňuje vazební podmínku. Nyní položme

$$L(x, y) = x^3 + y^3 - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Pak

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= 3x^2 - 2\lambda x \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 3y^2 - 2\lambda y. \end{aligned}$$

Celkově získáváme soustavu

$$\begin{aligned} 0 &= 3x^2 - 2\lambda x \\ 0 &= 3y^2 - 2\lambda y \\ 1 &= x^2 + y^2. \end{aligned}$$

Nyní máme tři možnosti. Pokud $x = 0$, dostáváme podezřelé body $(0, \pm 1)$. Pokud $y = 0$, dostáváme podezřelé body $(\pm 1, 0)$. Konečně, pokud $x \neq 0$ a $y \neq 0$, máme

$$3x - 2\lambda = 0 = 3y - 2\lambda \quad \implies \quad x = y \quad \implies \quad (x, y) = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

V ostatních bodech být extrémů nemohou. Nyní stačí dosadit

$$f(0, \pm 1) = \pm 1, \quad f(\pm 1, 0) = \pm 1, \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

a víme vše.

Příklad 12.7.10. Hledejme globální extrémy funkce $f(x, y) = xy + xz$ na množině $M = \{x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x^2 + z^2 \leq 1\}$. Máme spojitou funkci na kompaktu, proto se extrémů nabývá. Předně si povšimněme toho, že globální minimum musí být záporné a globální maximum kladné (uvažte $f(\pm \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10})$). Na vnitřku množiny M použijeme nutnou podmínku a díky

$$\nabla f = (y + z, x, x)$$

dostáváme, že pokud by se uvnitř množiny M v nějakém bodě nabývalo extrému, muselo by pro něj platit $x = 0$, čemuž ale odpovídá nulová funkční hodnota, která však nemůže být extrémem, jak jsme zjistili výše. Hranici množiny M si rozdělíme na tři podmnožiny

$$\partial M = M_1 \cup M_2 \cup M_3,$$

kde

$$M_1 = \{x^2 + y^2 = 1 \wedge x^2 + z^2 \leq 1\}$$

$$M_2 = \{x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x^2 + z^2 = 1\}$$

$$M_3 = \{x^2 + y^2 = 1 \wedge x^2 + z^2 = 1\}.$$

Na množině M_1 máme vazbu $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1$. Díky tomu, že $\nabla g = (2x, 2y, 0)$, je podmínka na hodnotu matice porušena jen pokud $x = y = 0$, kde je ovšem pro nás nezajímavá nulová funkční hodnota. Dále pracujeme s funkcí

$$L(x, y, z) = xy + xz - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Po zderivování máme

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y + z - 2\lambda x$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = x - 2\lambda y$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = x.$$

Odtud dostáváme soustavu

$$0 = y + z - 2\lambda x$$

$$0 = x - 2\lambda y$$

$$0 = x$$

$$1 = x^2 + y^2.$$

Tuto soustavu není nutné řešit, protože podmínka $x = 0$ zaručuje, že můžeme dostat pouze body s nezajímavou nulovou funkční hodnotou. Podobně postupujeme na množině M_2 . Ze symetrie úlohy v proměnných y a z je hned vidět, že opět globální extrém nezískáme.

Přistupme konečně k množině M_3 . Zde máme dvě vazby $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1$ a $h(x, y, z) = x^2 + z^2 - 1$. Podmínka na hodnotu se týká matice

$$\begin{pmatrix} 2x & 2y & 0 \\ 2x & 0 & 2z \end{pmatrix}.$$

Hodnota této matice nebude rovna dvěma, pokud budou řádky lineárně závislé. Pokud vyloučíme nezajímavý případ $x = 0$ (vede na nulovou funkční hodnotu), lineární závislost řádků může nastat už jen v případě $y = z = 0$, který opět vede na nulovou funkční hodnotu. Definujme pomocnou funkci

$$L(x, y, z) = xy + xz - \lambda(x^2 + y^2 - 1) - \mu(x^2 + z^2 - 1).$$

Po zderivování máme

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y + z - 2\lambda x - 2\mu x$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = x - 2\lambda y$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = x - 2\mu z.$$

Odtud dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} 0 &= y + z - 2\lambda x - 2\mu x \\ 0 &= x - 2\lambda y \\ 0 &= x - 2\mu z \\ 1 &= x^2 + y^2 \\ 1 &= x^2 + z^2. \end{aligned}$$

Poslední dvě rovnice dávají, že buď $y = -z$ nebo $y = z$. První případ opět vede na nulovou funkční hodnotu. Zabýváme se případem druhým a to jen v případě $x \neq 0$ (jediný zajímavý). Zde máme $\lambda = \mu \neq 0$. Ze druhé rovnice vyjádříme x a první rovnice pak má tvar

$$0 = 2y - 4\lambda x = 2y - 8\lambda^2 y = 2y(1 - 4\lambda^2).$$

Zbývá nám vyšetřit tři možnosti. Pokud $y = 0$, máme rovněž $z = 0$ a nulovou funkční hodnotu. Pokud $\lambda = \pm\frac{1}{2}$, platí $x = \pm y$. Odtud

$$1 = x^2 + y^2 = 2y^2 \quad \implies \quad y^2 = \frac{1}{2}.$$

Proto

$$f(x, y, z) = f(\pm y, y, y) = \pm 2y^2 = \pm 1.$$

Odtud $\min_M f = -1$ (nabývá se ho ve dvou bodech $(\mp\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}})$) a dále $\max_M f = 1$ (nabývá se ho ve dvou bodech $(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}})$).

12.8 Věta o regulárním zobrazení

V dalším se budeme zabývat otázkou invertovatelnosti zobrazení $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$. Výsledky, které získáme, jsou důležité například při vícerozměrné integraci nebo při řešení parciálních diferenciálních rovnic pomocí vhodné změny souřadného systému.

V jednorozměrném případě nám k invertovatelnosti na otevřeném intervalu stačí, když má funkce spojitou a nenulovou derivaci. Zde se pokusíme obdržet vícerozměrnou analogii takového výsledku.

Definice 12.8.1 (Jacobián). Nechť všechny složky zobrazení $\mathbf{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ mají v bodě $a \in \mathbb{R}^N$ parciální derivace. Pak matici

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix}$$

nazýváme Jacobiho maticí zobrazení \mathbf{f} v bodě a . Její determinant se nazývá *Jacobiho determinant* nebo též *jacobián* a značí se $J_{\mathbf{f}}(a)$.

Definice 12.8.2 (Regulární zobrazení). Nechť $\mathbf{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Řekneme, že \mathbf{f} je *regulární zobrazení* na Ω , jestliže

- (i) množina Ω je otevřená
- (ii) $\mathbf{f} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^N)$
- (iii) $J_{\mathbf{f}} \neq 0$ na Ω .

Příklad 12.8.3. (i) Připomeňme si polární souřadnice definované vztahy

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \\y &= r \sin \varphi.\end{aligned}$$

Nejčastěji se pracuje se zobrazením $\mathbf{f}: (r, \varphi) \mapsto (x, y)$, které zobrazuje $(0, \infty) \times (-\pi, \pi)$ na $\mathbb{R}^2 \setminus \{x \leq 0 \wedge y = 0\}$. Jacobiho matice má tvar

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Proto $J_{\mathbf{f}} = r \neq 0$ na studované množině a jedná se o regulární zobrazení.

(ii) Sférické souřadnice jsou definované vztahy

$$\begin{aligned}x &= r \cos \psi \cos \varphi \\y &= r \cos \psi \sin \varphi \\z &= r \sin \psi.\end{aligned}$$

Nejčastěji se pracuje se zobrazením $\mathbf{f}: (r, \psi, \varphi) \mapsto (x, y, z)$, které zobrazuje $(0, \infty) \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \times (-\pi, \pi)$ na $\mathbb{R}^3 \setminus \{x \leq 0 \wedge y = 0\}$. Jacobiho matice má tvar

$$\begin{pmatrix} \cos \psi \cos \varphi & -r \sin \psi \cos \varphi & -r \cos \psi \sin \varphi \\ \cos \psi \sin \varphi & -r \sin \psi \sin \varphi & r \cos \psi \cos \varphi \\ \sin \psi & r \cos \psi & 0 \end{pmatrix}.$$

Proto $J_{\mathbf{f}} = -r^2 \cos \psi \neq 0$ na studované množině a jedná se o regulární zobrazení.

(iii) Válcové souřadnice jsou definované vztahy

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \\y &= r \sin \varphi \\z &= h.\end{aligned}$$

Nejčastěji se pracuje se zobrazením $\mathbf{f}: (r, \varphi, h) \mapsto (x, y, z)$, které zobrazuje $(0, \infty) \times (-\pi, \pi) \times \mathbb{R}$ na $\mathbb{R}^3 \setminus \{x \leq 0 \wedge y = 0\}$. Jacobiho matice má tvar

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proto $J_{\mathbf{f}} = r \neq 0$ na studované množině a jedná se o regulární zobrazení.

Cvičení 12.8.4. Rozmyslete si, jak se zavádí sférické souřadnice v \mathbb{R}^N .

Věta 12.8.5 (O inverzi (lokální verze)). *Nechť $\mathbf{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ je regulární zobrazení na $\mathcal{U}_\tau(a)$ pro jistá $a \in \mathbb{R}^N$ a $\tau > 0$. Pak existuje $\sigma > 0$ s následujícími vlastnostmi:*

- (i) \mathbf{f} je prosté na $\mathcal{U}_\sigma(a)$
- (ii) $\mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a))$ je otevřená množina v \mathbb{R}^N (s jakoukoliv normou)
- (iii) značí-li \mathbf{g} inverzní zobrazení k $\mathbf{f}|_{\mathcal{U}_\sigma(a)}$, pak $\mathbf{g} \in C^1(\mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a)); \mathbb{R}^N)$
- (iv) $J_{\mathbf{g}}(\mathbf{f}(x)) = \frac{1}{J_{\mathbf{f}}(x)}$ pro všechna $x \in \mathcal{U}_\sigma(a)$
- (v) pokud $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ a $\mathbf{f} \in C^k(\mathcal{U}_\tau(a); \mathbb{R}^N)$, pak $\mathbf{g} \in C^k(\mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a)); \mathbb{R}^N)$.

Důkaz. Důkaz je založen na Větě o implicitní funkci (Věta 12.4.13), kde prohodíme roli proměnných x_1, \dots, x_N a y_1, \dots, y_N . Pro $x \in \mathcal{U}_\tau(a)$ a $y \in \mathbb{R}^N$ definujeme funkce

$$F_i(x, y) = y_i - f_i(x) \quad \text{pro } i \in \{1, \dots, N\}.$$

Pro tyto funkce platí

$$F_i(a, f(a)) = f_i(a) - f_i(a) = 0 \quad \text{pro všechna } i \in \{1, \dots, N\},$$

$F_i \in C^1(\mathcal{U}_\tau(a) \times \mathbb{R}^N)$ a

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(a, \mathbf{f}(a)) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_N}(a, \mathbf{f}(a)) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_N}{\partial x_1}(a, \mathbf{f}(a)) & \cdots & \frac{\partial F_N}{\partial x_N}(a, \mathbf{f}(a)) \end{pmatrix} = (-1)^N J_{\mathbf{f}}(a) \neq 0.$$

Můžeme proto aplikovat Větu o implicitní funkci (Věta 12.4.13) a dostáváme $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $y \in \mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a))$ existuje právě jedno $x \in \mathcal{U}_\Delta(a)$ splňující

$$0 = F_i(x, y) = y_i - f_i(x) \quad \text{pro všechna } i \in \{1, \dots, N\}.$$

Označíme-li toto x jako $\varphi(y)$, pak $\varphi \in C^1(\mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a)); \mathbb{R}^N)$. Ze spojitosti \mathbf{f} v bodě a plyne existence $\sigma \in (0, \Delta)$ splňujícího

$$\mathbf{f}(x) \in \mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a)) \quad \text{pro každé } x \in \mathcal{U}_\sigma(a).$$

Díky tomu je \mathbf{f} prosté zobrazení na $\mathcal{U}_\sigma(a)$. Skutečně, \mathbf{f} zobrazuje $\mathcal{U}_\sigma(a)$ do $\mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a))$ a tam každému bodu $y \in \mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a))$ odpovídá právě jeden bod $x \in \mathcal{U}_\Delta(a)$ splňující $y = \mathbf{f}(x)$ podle výsledků získaných výše.

Dokažme nyní otevřenost $\mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a))$. Nechť $y \in \mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a))$ a $x \in \mathcal{U}_\sigma(a)$ je takový bod, že $\mathbf{f}(x) = y$, neboli $x = \varphi(y)$. Z toho, že $y \in \mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a))$, a spojitosti φ na $\mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a))$ plyne existence $\eta > 0$ splňujícího

$$\mathcal{U}_\eta(y) \subset \mathcal{U}_\delta(\mathbf{f}(a)) \quad \text{a} \quad \varphi(\mathcal{U}_\eta(y)) \subset \mathcal{U}_\sigma(a).$$

Z poslední vlastnosti díky předchozí konstrukci dostáváme $\mathcal{U}_\eta(y) \subset \mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a))$. To dává otevřenost $\mathbf{f}(\mathcal{U}_\sigma(a))$.

Tvrzení (iii) a (v) plynou z toho, že funkce F_i mají stejnou hladkost jako funkce f_i a tuto hladkost mají podle Věty o implicitní funkci (Věta 12.4.13) rovněž jednotlivé složky zobrazení φ .

Konečně, tvrzení (iv) získáme derivováním vztahu $\varphi(\mathbf{f}(x)) = x$ na $\mathcal{U}_\sigma(a)$. Skutečně, podle řetízkového pravidla máme

$$\nabla(\varphi(\mathbf{f}(x))) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_1}(\mathbf{f}(x)) & \cdots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_N}(\mathbf{f}(x)) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_N}{\partial y_1}(\mathbf{f}(x)) & \cdots & \frac{\partial \varphi_N}{\partial y_N}(\mathbf{f}(x)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N}(x) \end{pmatrix}$$

a to se má rovnat jednotkové matici. \square

Poznámka 12.8.6. Nenulovost jakobiánu spolu s hladkostí (na rozdíl od jednodimenzionálního případu) nejsou globálně schopny zaručit prostotu. To si snadno uvědomíme, pokud uvážíme polární souřadnice s proměnnými (r, φ) z množiny $(0, \infty) \times \mathbb{R}$.

Věta 12.8.7 (O inverzi (globální verze)). *Nechť $\mathbf{f}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ je regulární zobrazení na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Pak*

(i) $\mathbf{f}(\Omega)$ je otevřená množina

(ii) \mathbf{f} je lokálně prosté, neboli ke každému bodu z Ω existuje okolí, kde \mathbf{f} je prosté. Je-li navíc \mathbf{f} prosté na Ω , odpovídající inverzní zobrazení je regulární na $\mathbf{f}(\Omega)$ a pro každé $x \in \Omega$ je Jacobiho matice \mathbf{f} v bodě x inverzní maticí k Jacobiho matici zobrazení \mathbf{f}^{-1} v bodě $\mathbf{f}(x)$.

Je-li \mathbf{f} prosté na Ω , $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ a $\mathbf{f} \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^N)$, pak $\mathbf{f}^{-1} \in C^k(\mathbf{f}(\Omega); \mathbb{R}^N)$.

Důkaz. Tvrzení (i) a (ii) plynou z předchozí věty (připomeňme, že sjednocení otevřených množin je otevřená množina). Zbylá tvrzení plynou rovněž z předchozí věty, neboť mají lokální charakter. \square

Poznámka 12.8.8. Předchozí větě se také říká Věta o regulárním zobrazení (přesněji, týká se to dvou tvrzení pro \mathbf{f} prosté).

Příklad 12.8.9. Převeďme do polárních souřadnic a tím vyřešme úlohu

$$x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Definujme pomocné zobrazení $\tilde{u}(r, \varphi) = u(x(r, \varphi), y(r, \varphi))$ pro $(r, \varphi) \in (0, \infty) \times (-\pi, \pi)$, neboli $\tilde{u} = u \circ \mathbf{f}$, kde \mathbf{f} bylo představeno v první části Příkladu 12.8.3. Podle globální verze Věty o inverzi (Věta 12.8.7) funkce $u \in C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{x \leq 0 \wedge y = 0\})$ řeší původní úlohu na $\mathbb{R}^2 \setminus \{x \leq 0 \wedge y = 0\}$ právě tehdy, když nová funkce $\tilde{u} \in C^1((0, \infty) \times (-\pi, \pi))$ řeší na $(0, \infty) \times (-\pi, \pi)$ novou úlohu, kterou získáme přepočítáním pomocí řetízkového pravidla. Máme

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial f_1}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial f_2}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \varphi \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial f_1}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial f_2}{\partial \varphi} = -\frac{\partial u}{\partial x} r \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \varphi, \end{aligned}$$

a proto

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} \sin \varphi \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} \cos \varphi.\end{aligned}$$

Původní rovnice dostává nový tvar

$$0 = r \cos \varphi \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} \cos \varphi \right) - r \sin \varphi \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} \sin \varphi \right) = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi}.$$

Proto jsou řešením naší rovnice funkce tvaru $\tilde{u}(r, \varphi) = \tilde{U}(r)$ pro jakoukoliv funkci $U \in C^1((0, \infty))$. Odtud původní úlohu řeší

$$u(x, y) = \tilde{U}(\sqrt{x^2 + y^2}) =: U(x^2 + y^2) \quad \text{na } \mathbb{R}^2 \setminus \{x \leq 0 \wedge y = 0\}.$$

Toto je zřejmě řešení na $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Je-li možné funkci U v počátku spojitě (zprava) dodefinovat tak, aby existovala $U'_+(0)$, máme řešení na celém \mathbb{R}^2 .

Kapitola 13

Klasický variační počet

13.1 Úvod

Stejně jako bylo přirozené rozšířit teorii extrémů funkcí jedné reálné proměnné na teorii extrémů funkcí více proměnných, existují aplikace vyžadující ještě obecnější přístup. Budeme se zabývat extrémy v nekonečnědimenzionálních prostorech, jejichž prvky jsou funkce. Jako motivaci si uveďme následující příklad.

Příklad 13.1.1 (Úloha o brachystochroně). Nechť $a, b, A, B \in \mathbb{R}$, $a < b$, $A > B$. Naším cílem je nalézt trajektorii, po níž se hmotný bod vlivem působení gravitace co nejrychleji dostane z bodu (a, A) do bodu (b, B) (jiná interpretace: mezi oběma body vyrobíme skluzavku a necháme po ní sklouznout kuličku, přičemž zanedbáváme tření a předpokládáme, že se kulička klouže, nekutálí se, nebo její moment setrvačnosti je zanedbatelný). Bereme-li do úvahy jen trajektorie, které je možné popsat jako graf $C^1([a, b])$ -funkce, pak pro celkový čas máme

$$T(y) = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2(x)}}{v(x)} dx,$$

přičemž integrál budeme brát buď Newtonův nebo, pokud je to možné, i jako Riemannův. Toto platí pro celou kapitolu a nebudeme se k tomu již více vracet. Vyjádření rychlosti v získáme ze zákona zachování mechanické energie

$$\frac{1}{2}mv^2(x) + mgy(x) = mgA \quad \implies \quad v(x) = \sqrt{2g(A - y(x))}.$$

Celkově minimalizujeme funkcionál

$$T(y) = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2(x)}}{\sqrt{A - y(x)}} dx$$

přes funkce z $C^1([a, b])$ splňující $y(a) = A$ a $y(b) = B$. Všimněme si ještě, že díky počáteční podmínce $y(a) = A$ nelze integrál uvažovat jako Riemannův.

Definice 13.1.2 (Funkcionál). Zobrazení z normovaného lineárního prostoru do \mathbb{R} se nazývá *funkcionál*.

Příklad 13.1.3. (i) Délka grafu funkce

$$F(y) = \int_a^b \sqrt{1 + y'(x)} \, dx$$

je funkcionál na $C^1([a, b])$ (připomeňme ještě, že na $C^1([a, b])$ je zvykem zavádět normu $\|y\|_{C^1([a, b])} := \max_{[a, b]} |y| + \max_{[a, b]} |y'|$).

(ii) Riemannův (či Newtonův) integrál z funkce f je dokonce lineární funkcionál na $C([a, b])$.

(iii) Funkcionálem na $C^1([a, b])$ je také

$$F(y) = \sqrt{\int_a^b y'^2(x) \, dx}.$$

V dalším si nejprve vybudujeme abstraktní teorii pro klasifikaci lokálních extrémů, která se velmi podobá teorii pro lokální extrémy funkcí více proměnných. Později při aplikaci této teorie zjistíme, že kupříkladu ověřování pozitivní definitnosti druhého diferenciálu v nekonečné dimenzi není vůbec snadné a vyžaduje vybudování nových nástrojů. Právě toto rozšíření abstraktní teorie bude těžištěm této kapitoly. Nakonec se budeme zabývat několika klasickými úlohami, jako jsou již zmíněná úloha o brachystochroně či úloha o zavěšeném řetězu.

Naše teorie bude pracovat s prostorem $C^1([a, b])$. Na rozdíl od případu extrémů funkcí více proměnných se nám podaří získat jen velmi slabé výsledky ohledně existence globálních extrémů. Konkrétně bude zcela chybět výsledek, který by byl svou užitečností srovnatelný s Větou o nabývání extrémů spojitou funkcí (Věta 11.9.16), tj. že spojitá funkce na omezené a uzavřené (tedy kompaktní) množině nabývá svého maxima a minima (v nekonečnědimenzionálním prostoru omezenost a uzavřenost neimplikují kompaktnost). Moderní matematická analýza z těchto důvodů prostor $C^1([a, b])$ nahrazuje takzvanými *Sobolevovými prostory*, které jsou vybudovány na teorii *Lebesgueova integrálu* a z hlediska variačního počtu nabízejí silnější výsledky. Tyto partie jdou ale nad rámec těchto skript.

13.2 Abstraktní teorie

Protože v prostorech funkcí nemáme přirozeně danou kanonickou bázi, základním pojmem diferenciálního počtu je derivace ve směru.

Definice 13.2.1 (Gâteauxův a Fréchetův diferenciál). Nechť X je normovaný lineární prostor, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál a $a \in D_F$.

(i) Nechť $h \in X$ a existuje $\delta > 0$ takové, že $\{a + th: |t| < \delta\} \subset D_F$. Řekneme, že F má v bodě a *Gâteauxův diferenciál* ve směru h (nebo též *Gâteauxovu derivaci* ve směru h), jestliže existuje vlastní limita

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(a + th) - F(a)}{t} = \frac{d}{dt} F(a + th)|_{t=0}.$$

Tuto limitu pak značíme $\delta F(a; h)$ a nazýváme ji *Gâteauxovým diferenciálem* funkcionálu F v bodě a ve směru h .

(ii) Necht existuje $\delta > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\delta(a) \subset D_F$. Řekneme, že F má v bodě a *Fréchetův diferenciál*, jestliže existuje spojitý lineární funkcionál $L: X \rightarrow \mathbb{R}$ splňující

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a) - Lh}{\|h\|} = 0.$$

Zmíněný lineární funkcionál pak značíme $dF(a)$ a nazýváme jej *Fréchetovým diferenciálem* funkcionálu F v bodě a .

Poznámka 13.2.2. (i) Snadno se ověří, že Gâteauxův diferenciál (v daném bodě a směru) a Fréchetův diferenciál (v daném bodě) jsou v případě existence určeny jednoznačně.

(ii) Pro funkce více proměnných (tedy $X = \mathbb{R}^N$ s libovolnou normou) je Gâteauxův diferenciál derivací ve směru a Fréchetův diferenciál je totální diferenciál.

(iii) Existence Fréchetova diferenciálu zřejmě implikuje existenci Gâteauxova diferenciálu pro každý směr a pak platí

$$\delta F(a; h) = dF(a)(h).$$

Toho se využívá při hledání Fréchetova diferenciálu. Spočítáme Gâteauxovy diferenciály ve všech směrech a máme jediného kandidáta na Fréchetův diferenciál.

(iv) Existence Fréchetova diferenciálu implikuje spojitost.

(v) Zatímco lineární zobrazení mezi konečnědimenzionálními prostory jsou vždy spojitá, v nekonečné dimenzi toto není pravda. Stačí uvážit prostor ℓ_2 a na něm funkcionál

$$Lx := x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots,$$

kde $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$. Tento funkcionál je zřejmě lineární, ale pro prvky $e_k = \{\delta_{ik}\}_{i=1}^\infty$ platí

$$L\left(\frac{e_k}{k}\right) = 1, \quad \frac{e_k}{k} \rightarrow 0 \text{ v } \ell_2 \quad \text{a} \quad L(0) = 0.$$

Příklad 13.2.3. Uvažujme zobrazení

$$F(y) = \int_0^1 xy^2(x) dx$$

na $C([0, 1])$. Pro každé $h \in C([0, 1])$ a $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ máme

$$\frac{F(y+th) - F(y)}{t} = \frac{1}{t} \int_0^1 x((y+th)^2 - y^2) dx = \int_0^1 2xyh dx + t \int_0^1 xh^2 dx.$$

Odtud (pro zafixované h jsou oba integrály konečné)

$$\delta F(y; h) = \int_0^1 2xyh dx \quad \text{pro všechna } y \in C([0, 1]) \text{ a } h \in C([0, 1]).$$

Tím jsme zároveň dostali i jediného kandidáta na Fréchetův diferenciál. Zbývá ověřit podmínku z definice. Máme ($\|\cdot\|$ značí normu na prostoru $C([0, 1])$, tedy $\|h\| = \max_{[0,1]} |h|$)

$$\frac{F(y+h) - F(y) - \delta F(y; h)}{\|h\|} = \frac{1}{\|h\|} \int_0^1 x((y+h)^2 - y^2 - 2yh) dx = \frac{1}{\|h\|} \int_0^1 xh^2 dx,$$

kde stačí využít

$$\left| \frac{1}{\|h\|} \int_0^1 xh^2 dx \right| \leq \frac{1}{\|h\|} \int_0^1 1 \cdot \max_{[0,1]}^2 |h| dx = \frac{1}{\|h\|} \max_{[0,1]}^2 |h| = \|h\|$$

a odtud již snadno obdržíme existenci Fréchetova diferenciálu. Proto $dF(y)(h) = \int_0^1 2xyh dx$.

Cvičení 13.2.4. (i) Uvažte zobrazení

$$F(y) = \int_0^1 xy'^2(x) dx$$

na $C^1([0, 1])$, kde $\|h\|_{C^1([0,1])} = \max_{[0,1]} |h| + \max_{[0,1]} |h'|$. Stejným postupem jako v předchozím příkladu ukažte, že

$$dF(y)(h) = \delta F(y; h) = \int_0^1 2xy'h' dx \quad \forall y \in C^1([0, 1]) \text{ a } h \in C^1([0, 1]).$$

(ii) Podobně pro

$$F(y) = \int_0^1 (xy^2(x) + xy'^2(x)) dx$$

získejte

$$dF(y)(h) = \delta F(y; h) = 2 \int_0^1 (xyh + xy'h') dx \quad \forall y \in C^1([0, 1]) \text{ a } h \in C^1([0, 1]).$$

(iii) Předchozí příklady naznačují, jak vypadá základní aritmetika Gâteauxova diferenciálu (případně Fréchetova diferenciálu). Čemu se rovná $\delta(\alpha F + \beta G)(y; h)$ pro $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a funkcionály F, G ? Vyslovte odpovídající větu a dokažte ji.

Definice 13.2.5 (Lokální minimum). Nechť X je normovaný lineární prostor a $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál. Řekneme, že $a \in D_F$ je *bodem lokálního minima* funkcionálu F , jestliže existuje $\varepsilon > 0$ takové, že

$$F(a) \leq F(x) \quad \text{pro všechna } x \in \mathcal{U}_\varepsilon(a) \cap D_F.$$

V případě ostré nerovnosti na $\mathcal{P}_\varepsilon(a) \cap D_F$ hovoříme o ostrém lokálním minimu. Analogicky se definuje lokální maximum.

Definice 13.2.6 (Stacionární bod). Nechť X je normovaný lineární prostor a necht' $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál. Řekneme, že $a \in D_F$ je *stacionárním bodem* (nebo *extremálou* nebo *kritickým bodem*) funkcionálu F , jestliže

$$\delta F(a; h) = 0 \quad \text{pro všechna } h \in X.$$

Základním tvrzením právě budované teorie je následující nutná podmínka.

Věta 13.2.7 (Eulerova nutná podmínka). *Nechť X je normovaný lineární prostor, funkcionál $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ má lokální extrém v bodě $a \in X$, je definován na nějakém okolí bodu a a $h \in X$. Pokud existuje $\delta F(a; h)$, pak $\delta F(a; h) = 0$.*

Důkaz. Vše plyne z chování funkce $t \mapsto F(a + th)$, neboť toto zobrazení má v bodě $t = 0$ lokální extrém. \square

Příklad 13.2.8. Uvážíme-li funkcionál z Příkladu 13.2.3, pak je Eulerova nutná podmínka splněna zřejmě pro $y \equiv 0$. Naopak, nutná podmínka není splněna pro žádnou jinou spojitou funkci. Skutečně, je-li $y \in C([0, 1])$ netriviální, stačí zvolit $h := y$ a dostaneme nenulový integrál (pokud existuje $x_0 \in [0, 1]$ takové, že $f(x_0) > 0$, díky spojitosti na jistém okolí platí $f(x) > \frac{1}{2}f(x_0)$, atd.).

Poznámka 13.2.9. V předchozím příkladu jsme měli velice jednoduchý funkcionál, a proto bylo poměrně snadné určit, které body jsou stacionární a které nikoliv. V praxi se většinou pracuje s integrálními funkcionály, kde integrand závisí nejen na x a y , ale také na y' (podívejte se na funkcionál vystupující v úloze o brachystochroně). K hledání stacionárních bodů takových funkcionálů byly vyvinuty techniky, které si představíme později.

Nyní si vybudujeme analogickou teorii ke klasifikaci lokálních extrémů pomocí definitnosti kvadratických forem příslušejících druhým diferenciacím funkcí více proměnných. Pro jednoduchost značení všechny výsledky vyslovíme jen pro lokální minimum.

Definice 13.2.10 (Druhý Gâteauxův diferenciac). Nechť X je normovaný lineární prostor, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál, $a, h, k \in X$ a existuje $\delta F(a; h)$. Nechť existuje vlastní

$$\delta^2 F(a; h, k) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\delta F(a + tk; h) - \delta F(a; h)}{t}.$$

Pak $\delta^2 F(a; h, k)$ nazýváme *druhým Gâteauxovým diferenciacem* ve směrech h a k .

Poznámka 13.2.11. Pokud $k = h$, pak máme

$$\delta^2 F(a; h, h) = \frac{d^2}{dt^2} F(a + th)|_{t=0}.$$

Věta 13.2.12 (Lagrangeova nutná podmínka). *Nechť X je normovaný lineární prostor, funkcionál $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ má lokální minimum v bodě $a \in X$ a $h \in X$. Pokud existuje $\delta^2 F(a; h, h)$, pak $\delta^2 F(a; h, h) \geq 0$.*

Důkaz. Definujme $g(t) = F(a + th)$. Máme $g'(0) = 0$ (podle Eulerovy nutné podmínky, tedy Věty 13.2.7). Pokud by platilo $g''(0) = \delta^2 F(a; h, h) = -\theta < 0$, pak bychom pro $t > 0$ dostatečně malé měli díky Lagrangeově větě o přírůstku funkce (Věta 6.3.3)

$$g(t) - g(0) = tg'(\xi) = t \frac{g'(\xi) - g'(0)}{\xi} \xi \leq t \frac{-\theta}{2} \xi < 0,$$

což je ve sporu s tím, že v bodě a je lokální minimum. \square

Příklad 13.2.13. Pro funkcional z Příkladu 13.2.3 máme pro každé $y \in C([0, 1])$

$$\begin{aligned} \delta^2 F(y; h, h) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\delta F(y + th; h) - \delta F(y; h)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2}{t} \left(\int_0^1 x(y + th)h \, dx - \int_0^1 xyh \, dx \right) = 2 \int_0^1 xh^2 \, dx. \end{aligned}$$

Lagrangeova nutná podmínka (Věta 13.2.12) je tedy splněna pro všechna $y \in C([0, 1])$. Pro hledání lokálního minima se ukázala jako užitečnější dříve použitá Eulerova nutná podmínka. Na druhou stranu, Lagrangeova nutná podmínka pro lokální maximum (s obrácenou nerovností) nám říká, že náš funkcional nemá žádné lokální maximum na $C([0, 1])$.

Postačující podmínka má podobný tvar jako u funkcí více proměnných. Uvedeme si slabší verzi (oproti standardním výsledkům v literatuře), abychom byli schopni výsledek dokázat elementárními prostředky.

Věta 13.2.14 (Lagrangeova postačující podmínka (zeslabená verze)). *Nechť X je normovaný lineární prostor a $a \in X$ je stacionárním bodem funkcionalu $F: X \rightarrow \mathbb{R}$. Jestliže existuje okolí bodu a , kde platí $\delta^2 F(x; h, h) \geq 0$ pro všechna $h \in X$, pak F má v bodě a lokální minimum.*

Důkaz. Nechť podmínka $\delta^2 F(x; h, h) \geq 0$ platí na $\mathcal{U}_\eta(a)$. Pro libovolné $y \in \mathcal{U}_\eta(a)$ definujme

$$g(t) = F(a + t(y - a)) \quad \text{pro } t \in [0, 1].$$

Pak máme pro $\xi \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} F(y) - F(a) &= g(1) - g(0) = g'(0) + \frac{1}{2}g''(\xi) \\ &= \delta F(a; y - a) + \frac{1}{2}\delta^2 F(a + \xi(y - a); y - a, y - a) \geq 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

\square

Poznámka 13.2.15. Standardní znění namísto nezápornosti druhých Gâteauxových diferenciálů na okolí požaduje spojitost druhého Fréchetova diferenciálu v bodě a a existenci $\alpha > 0$ splňujícího

$$\delta^2 F(a; h, h) \geq \alpha \|h\|^2 \quad \text{pro všechna } h \in X.$$

Takové znění pak nabízí ostré lokální minimum v bodě a . Důkaz tohoto tvrzení je trochu těžší a navíc se pro naši situaci, kdy pracujeme s prostorem $C^1([a, b])$, výše uvedený předpoklad špatně ověřuje.

Příklad 13.2.16. Pro funkcionál z Příkladu 13.2.3 jsme již našli jediný stacionární bod $y \equiv 0$ a navíc jsme již také ukázali

$$\delta^2 F(y; h, h) = \int_0^1 x h^2 dx \geq 0.$$

Náš stacionární bod je tedy bodem lokálního minima.

Cvičení 13.2.17. Ukažte, že v předchozím příkladu není možné pro žádné $\alpha > 0$ splnit podmínku

$$\delta^2 F(a; h, h) \geq \alpha \|h\|^2 \quad \text{pro všechna } h \in X.$$

K tomu stačí sestavit posloupnost funkcí $\{h_k\} \subset C([0, 1])$ splňující

$$\|h_k\| = \max_{[0,1]} |h_k| = 1 \quad \text{a} \quad \int_0^1 x h_k^2 dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

V jednodimenzionálním případě se výše uvedená kritéria týkají nezápornosti druhé derivace a ta zase souvisí s konvexitou. I ve variačním počtu je konvexita postačující podmínkou pro existenci globálního minima ve stacionárním bodě.

Definice 13.2.18 (Konvexita funkcionálu). Nechť X je normovaný lineární prostor, $M \subset X$ je konvexní a $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál. Řekneme, že funkcionál F je *konvexní* na M , jestliže

$$F(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda F(x) + (1 - \lambda)F(y) \quad \text{pro všechna } x, y \in M \text{ a } \lambda \in [0, 1].$$

Věta 13.2.19 (Postačující podmínka pro konvexní funkcionál). *Nechť X je normovaný lineární prostor a $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je konvexní funkcionál definovaný na celém X . Pak každý jeho stacionární bod je bodem globálního minima F na X .*

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $a \in X$ je stacionární bod, ale existuje $b \in X$ takové, že $F(b) < F(a)$. Díky konvexitě pak máme pro každé $t \in (0, 1)$

$$\frac{F(a + t(b - a)) - F(a)}{t} \leq \frac{(1 - t)F(a) + tF(b) - F(a)}{t} = F(b) - F(a).$$

Odtud $\delta F(a; b - a) \leq F(b) - F(a) < 0$ a bod a není stacionárním bodem, což je spor. \square

Příklad 13.2.20. Předchozí věta se dá aplikovat na funkcionál z Příkladu 13.2.3. Ten je totiž konvexní, což snadno plyne z odhadu založeného na Youngově nerovnosti

$$\begin{aligned} (\lambda y + (1 - \lambda)z)^2 &= \lambda^2 y^2 + 2\lambda(1 - \lambda)yz + (1 - \lambda)^2 z^2 \\ &\leq \lambda^2 y^2 + \lambda(1 - \lambda)(y^2 + z^2) + (1 - \lambda)^2 z^2 \\ &= \lambda y^2 + (1 - \lambda)z^2. \end{aligned}$$

Také bylo možné využít konvexitu funkce $t \mapsto t^2$.

13.3 Funkcionály reprezentované integrálem

V dalším se budeme zabývat lokálními extrémy funkcionálů tvaru

$$F(y) = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) \, dx$$

na množině

$$M := \{y \in C^1([a, b]) : y(a) = A, y(b) = B\},$$

kde $a, b, A, B \in \mathbb{R}$, $a < b$ a $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$. Argument funkce f značíme (x, y, z) .

Předchozí teorii zde nemůžeme aplikovat přímo, neboť množina M obecně není lineární prostor (vyjma případu $A = B = 0$). Tento problém vyřešíme tím, že si zdefinujeme pomocnou funkci v jako afinní funkci splňující $v(a) = A$ a $v(b) = B$ (tedy $v(x) = A + \frac{B-A}{b-a}(x-a)$), píšeme $y = u + v$ a pracujeme s funkcionálem

$$\Phi(u) := F(u + v)$$

na množině

$$X := \{u \in C^1([a, b]) : u(a) = 0, u(b) = 0\},$$

což už je lineární prostor. Používáme zde normu

$$\|u\|_{C^1([a, b])} = \max_{[a, b]} |u| + \max_{[a, b]} |u'|.$$

V dalším budeme vždy pod symbolem X rozumět právě zavedený prostor.

Domluvme se ještě, že z důvodu zjednodušení budou v dalším výrazy $y'(a)$ a $y'(b)$ znamenat jednostranné derivace v těchto krajních bodech z vnitřní strany intervalu (a, b) . Podobně, budeme-li hovořit o splnění nějaké diferenciální rovnice na $[a, b]$, myslíme tím, že v krajních bodech tuto rovnici splňují odpovídající jednostranné derivace.

Pro aplikaci předchozí teorie potřebujeme znát tvar $\delta\Phi(u; h)$ a $\delta^2\Phi(u; h, h)$. V zájmu přehlednosti zápisu budeme dále používat značení $f_z = \frac{\partial f}{\partial z}$, atd.

Lemma 13.3.1 (O tvaru $\delta\Phi(u; h)$ a $\delta^2\Phi(u; h, h)$). *Nechť F, Φ, v jsou jako výše a $u, h \in X$. Pak (používáme $y := u + v$)*

$$\delta\Phi(u; h) = \int_a^b (f_y(x, y, y')h + f_z(x, y, y')h') \, dx$$

a

$$\delta^2\Phi(u; h, h) = \int_a^b (f_{yy}(x, y, y')h^2 + 2f_{yz}(x, y, y')hh' + f_{zz}(x, y, y')h'^2) \, dx.$$

Důkaz. První výsledek ověříme tak, že provedeme úpravu

$$\begin{aligned}
\delta\Phi(u; h) &= \int_a^b (f_y(x, y, y')h + f_z(x, y, y')h') dx \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b \left(\frac{f(x, y + th, y' + th') - f(x, y, y')}{t} - f_y(x, y, y')h - f_z(x, y, y')h' \right) dx \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b \left(\frac{f(x, y + th, y' + th') - f(x, y, y' + th')}{t} - f_y(x, y, y')h \right) dx \\
&\quad + \lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b \left(\frac{f(x, y, y' + th') - f(x, y, y')}{t} - f_z(x, y, y')h' \right) dx \\
&=: \lim_{t \rightarrow 0} I_1 + \lim_{t \rightarrow 0} I_2
\end{aligned}$$

a ukážeme, že

$$\lim_{t \rightarrow 0} I_1 = \lim_{t \rightarrow 0} I_2 = 0.$$

Protože $f \in C^1([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) pro každé $t > 0$ existuje $\theta \in (0, 1)$ splňující

$$\frac{f(x, y + th, y' + th') - f(x, y, y' + th')}{t} = f_y(x, y + \theta th, y' + th')h.$$

Dále, $y, h \in X$ jsou pevně zvolená (tudíž $\max_{[a, b]} |h| + \max_{[a, b]} |h'| < \infty$) a f_y je spojitá na $[a, b] \times \mathbb{R}^2$, tedy stejnoměrně spojitá na kompaktních podmnožinách $[a, b] \times \mathbb{R}^2$. Proto ke každému $\varepsilon > 0$ dostáváme t_0 takové, že pro $t \in (0, t_0)$ platí

$$\begin{aligned}
|I_1| &= \left| \int_a^b (f_y(x, y + \theta th, y' + th')h - f_y(x, y, y')h) dx \right| \\
&\leq \int_a^b \max_{[a, b]} |h| |f_y(x, y + \theta th, y' + th') - f_y(x, y, y')| dx \\
&\leq \int_a^b \max_{[a, b]} |h| \varepsilon dx = C\varepsilon.
\end{aligned}$$

Podobně pro $t < 0$. Dokázali jsme, že $\lim_{t \rightarrow 0} I_1 = 0$. Výsledek $\lim_{t \rightarrow 0} I_2 = 0$ získáme analogicky. Tím je dokázán vztah pro $\delta\Phi(u; h)$. Vztah pro $\delta^2\Phi(u; h, h)$ obdržíme tak, že předchozí metodu aplikujeme na vztah pro $\delta\Phi(u; h)$. Tentokrát využíváme předpoklad $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$. Navíc použijeme $f_{zy} = f_{yz}$. \square

13.3.1 Euler–Lagrangeova rovnice

Dalším problémem je, že Eulerova nutná podmínka (Věta 13.2.7) díky právě získaným výsledkům získává poněkud nepřehledný tvar

$$\int_a^b (f_y(x, y, y')h + f_z(x, y, y')h') dx = 0 \quad \text{pro všechna } h \in X$$

a my z ní potřebujeme získat stacionární body. V tom nám pomůže integrace per partes kombinovaná s následujícím výsledkem.

Lemma 13.3.2 (Du Bois-Reymondovo lemma). *Nechť pro funkci $g \in C([a, b])$ platí*

$$\int_a^b gh' dx = 0 \quad \text{pro všechna } h \in C^1([a, b]) \text{ splňující } h(a) = h(b) = 0.$$

Pak g je konstantní na $[a, b]$.

Důkaz. Nejprve si povšimněme, že pokud funkce $\varphi \in C([a, b])$ splňuje $\int_a^b \varphi dt = 0$, pak pro funkci $\phi(x) := \int_a^x \varphi(t) dt$ máme $\phi \in C^1([a, b])$ a $\phi(a) = \phi(b) = 0$. Díky tomu podmínka ze znění věty implikuje

$$\int_a^b g\varphi dx = 0 \quad \text{pro všechna } \varphi \in C([a, b]) \text{ splňující } \int_a^b \varphi dx = 0$$

(tato podmínka je dokonce podmínce ze znění věty ekvivalentní, neboť derivace všech funkcí z X mají výše popsané vlastnosti).

Položme

$$\alpha := \frac{1}{b-a} \int_a^b g dt.$$

Díky linearitě integrálu a předchozím výsledkům máme

$$\int_a^b (g - \alpha)\varphi dx = 0 \quad \text{pro všechna } \varphi \in C([a, b]) \text{ splňující } \int_a^b \varphi dx = 0.$$

Speciálně lze volit $\varphi := g - \alpha$ (od spojitě funkce odečítáme přesně tu konstantu, která zařídí nulovost integrálu přes (a, b)) a dostáváme

$$\int_a^b (g - \alpha)^2 dx = 0.$$

Nyní již snadno díky spojitosti a nezápornosti integrandu obdržíme $g \equiv \alpha$ na $[a, b]$. \square

V nejjednodušších případech, kdy funkce f nezávisí na třetí proměnné z (třeba u funkcionálu z Příkladu 13.2.3), je výhodnější používat následující výsledek.

Lemma 13.3.3 (Fundamentální lemma variačního počtu). *Nechť pro funkci $g \in C([a, b])$ platí*

$$\int_a^b gh dx = 0 \quad \text{pro všechna } h \in C^1([a, b]) \text{ splňující } h(a) = h(b) = 0.$$

Pak $g \equiv 0$ na $[a, b]$.

Důkaz. Nechť existuje $x_0 \in (a, b)$ takové, že $g(x_0) > 0$ (díky spojitosti plyne předchozí i za situací $g(a) > 0$ a $g(b) > 0$, případ záporné funkční hodnoty se

řeší podobně, budeme tedy umět vyřešit všechny možné případy). Pak existuje $\delta \in (0, \min\{x_0 - a, b - x_0\})$ takové, že $g(x) > \frac{1}{2}g(x_0)$ na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Definujme

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in [a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ \cos^2(\frac{\pi}{2\delta}(x - x_0)) & \text{pro } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \end{cases}$$

Pak $h \in C^1([a, b])$ a $h(a) = h(b) = 0$. Navíc

$$\begin{aligned} \int_a^b gh \, dx &= \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} g(x) \cos^2(\frac{\pi}{2\delta}(x - x_0)) \, dx \\ &\geq \frac{g(x_0)}{2} \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} \cos^2(\frac{\pi}{2\delta}(x - x_0)) \, dx > 0. \end{aligned}$$

□

Naše dosavadní výsledky nám dávají následující tvar nutné podmínky pro lokální extrém.

Věta 13.3.4 (Euler–Lagrangeova rovnice). *Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F . Pak funkce*

$$x \mapsto f_z(x, y_0(x), y_0'(x))$$

je spojitě diferencovatelná na $[a, b]$ a y_0 splňuje Euler–Lagrangeovu rovnici

$$f_y(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx} f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) = 0 \quad \text{na } [a, b].$$

Důkaz. Jak již bylo ukázáno výše, odečtením vhodné afinní funkce můžeme přejít k funkci $u_0 \in X$ a funkcionálu Φ . Pro každé $h \in X$ pak máme splněnu Eulerovu nutnou podmínku (Věta 13.2.7)

$$0 = \delta\Phi(u_0; h) = \int_a^b (f_y(x, y_0, y_0')h + f_z(x, y_0, y_0')h') \, dx.$$

První část integrálu napravo se dá pomocí integrace per partes přepsat do tvaru (hraniční členy zmizí díky $h(a) = h(b) = 0$)

$$\int_a^b f_y(x, y_0, y_0')h \, dx = - \int_a^b \left(\int_a^x f_y(t, y_0(t), y_0'(t)) \, dt \right) h' \, dx.$$

Proto celkově máme pro všechna $h \in X$

$$0 = \int_a^b \left(\int_a^x f_y(t, y_0(t), y_0'(t)) \, dt - f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) \right) h' \, dx.$$

Du Bois-Reymondovo lemma (Lemma 13.3.2) nám proto dává

$$\int_a^x f_y(t, y_0(t), y_0'(t)) \, dt - f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) \equiv C \quad \text{na } [a, b].$$

Zderivováním dostáváme Euler–Lagrangeovu rovnici. Navíc funkce

$$x \mapsto f_z(x, y_0(x), y_0'(x))$$

musí mít spojitou derivaci na $[a, b]$ (v krajních bodech jednostrannou), protože ostatní členy derivované rovnosti mají spojitou derivaci. \square

Poznámka 13.3.5. Právě uvedený tvar Euler–Lagrangeovy rovnice má jednu nevýhodu, která je vidět na následujícím příkladu. Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_0^1 y^2 y'^2 dx \quad \text{na } X.$$

Euler–Lagrangeova rovnice má tvar

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 2yy'^2 - \frac{d}{dx}(2y^2 y') = 0 \quad \text{na } [0, 1].$$

Tento tvar není vhodný pro další práci (dokonce z něj ani není okamžitě vidět, že řešením je $y \equiv 0$, což je podle zadání zřejmě funkce, která dává globální minimum). Rádi bychom provedli úpravu

$$0 = 2yy'^2 - (2y^2 y')' = 2yy'^2 - (4yy'^2 + 2y^2 y'') = -2y(y'^2 + yy'') = -2y(yy')'$$

a tím dostali rovnici, se kterou už se dá pracovat. Zmíněnou úpravu však obecně provést nemůžeme, neboť nevíme, zda existuje y'' .

Slabinou Euler–Lagrangeovy rovnice je tedy podmínka $y_0 \in C^2([a, b])$, kterou obecně nemusí extrémála splňovat.

Věta 13.3.6 (O regularitě minimizéru). *Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F a $x_0 \in (a, b)$ je takové, že*

$$f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0)) \neq 0.$$

Pak existuje $\delta > 0$ takové, že $y_0 \in C^2((x_0 - \delta, x_0 + \delta))$.

Důkaz. Pokud je $y_0 \in M$ stacionárním bodem, podle předchozí věty splňuje Euler–Lagrangeovu rovnici, jejíž integrací dostáváme $\alpha \in \mathbb{R}$ splňující

$$\alpha \equiv f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) - \int_a^x f_y(t, y_0(t), y_0'(t)) dt \quad \text{na } [a, b].$$

Definujme nyní funkci $\Psi: [a, b] \times \mathbb{R}$ předpisem

$$\Psi(x, w) = f_z(x, y_0(x), w) - \int_a^x f_y(t, y_0(t), y_0'(t)) dt - \alpha.$$

Zřejmě $\Psi(x_0, y_0'(x_0)) = 0$, $\Psi \in C^1([a, b] \times \mathbb{R})$, protože $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in C^1([a, b])$ a

$$\frac{\partial \Psi}{\partial w}(x_0, y_0'(x_0)) = f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0)) \neq 0.$$

Můžeme proto aplikovat Větu o implicitní funkci (Věta 12.4.13) a dostáváme $\delta_1, \Delta > 0$ taková, že pro každé $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ existuje právě jedno $w =: \varphi(x) \in (y'(x_0) - \Delta, y'(x_0) + \Delta)$ splňující $\Psi(x, \varphi(x)) = 0$ a $\varphi \in C^1((x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1))$. Protože funkce $w: x \mapsto y'_0(x)$ také splňuje $\Psi(x, w(x)) = 0$, z její spojitosti ($y_0 \in C^1([a, b])$) a jednoznačnosti dané Větou o implicitní funkci (Věta 12.4.13) dostáváme $\delta \in (0, \delta_1)$ takové, že

$$\varphi(x) = w(x) \quad \text{na } (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Protože na levé straně máme funkci z $C^1((x_0 - \delta, x_0 + \delta))$, máme takovou funkci i na straně pravé, a proto $y_0 \in C^2((x_0 - \delta, x_0 + \delta))$. \square

Cvičení 13.3.7. Modifikací předchozího postupu ukažte, že pokud ve větě předpokládáme $f \in C^k([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ pro jisté $k \in \{2, 3, \dots\} \cup \{\infty\}$, pak $y_0 \in C^k((x_0 - \delta, x_0 + \delta))$. Dejte si pozor na argumentaci pro případ $k = \infty$.

Příklad 13.3.8. (i) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_0^1 xy^2(x) dx \quad \text{s okrajovými podmínkami } y(0) = 0 \text{ a } y(1) = 0.$$

Euler–Lagrangeova rovnice má tvar

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 2xy = 0.$$

Jediným řešením je zřejmě $y \equiv 0$ (globální minimum). Globální maximum existovat nemůže, jak ukazují funkce $x \mapsto C \sin(\pi x)$.

Pokud bychom pracovali na množině $M = \{y \in C^1([0, 1]): y(0) = 0, y(1) = 1\}$, Euler–Lagrangeova rovnice má opět tvar $2xy = 0$ a nám se jí díky počátečním podmínkám nepodaří splnit. Tedy žádná extrémála neexistuje. Dokonce se dá ukázat přímo, že neexistuje globální minimum, neboť funkce

$$y_k(x) := \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in [0, 1 - 2^{-k}] \\ \cos^4(\pi 2^{k-1}(x - 1)) & \text{pro } x \in [1 - 2^{-k}, 1] \end{cases}$$

splňují $F(y_k) \rightarrow 0$, zatímco pro žádnou funkci z M nedostaneme $F(y) = 0$.

(ii) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_a^b y'^2 dx.$$

Pak Euler–Lagrangeova rovnice má tvar

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 0 - \frac{d}{dx} (2y') = 0 \quad \text{na } [a, b].$$

Zde můžeme jednak postupovat bez využití Věty o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6), když si uvědomíme, že naše Euler–Lagrangeova rovnice je ekvivalentní podmínce

$$-2h' = C \quad \text{na } [a, b]$$

a odtud $h = -\frac{C}{2}x + D$ (konstanty C, D budou zde jednoznačně určeny okrajovými podmínkami z definice množiny M). Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6) zde použít můžeme, neboť $f_{zz}(x, y, y') = 2 > 0$ (zde je velice příjemné, že je podmínka z Věty o regularitě minimizéru splněna pro všechna $y \in M$). To nám dává diferenciální rovnici

$$-2y'' = 0,$$

kterou umíme snadno vyřešit.

(iii) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_a^b y'(1 + x^2 y') dx.$$

Povšimněme si, že $f_{zz}(x, y, y') = 2x^2$. Pokud bychom věděli, že $0 \notin (a, b)$, mohli bychom použít Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6). V opačném případě musíme postupovat opatrně

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 0 - \frac{d}{dx} (1 + 2x^2 y') = 0 \quad \text{na } [a, b].$$

To je ekvivalentní

$$1 + 2x^2 y' = C \quad \iff \quad x^2 y' = \frac{C-1}{2} =: D.$$

Pokud $0 \notin (a, b)$, máme

$$y' = \frac{D}{x^2} \quad \iff \quad y = -\frac{D}{x} + E,$$

kde $E \in \mathbb{R}$. Pokud $0 \in (a, b)$, musí platit $D = 0$. To zase implikuje, že $y' = 0$ na $[a, 0) \cup (0, b]$. Protože $y \in C^1([a, b])$ celkově dostáváme $y \equiv E$.

(iv) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_{-1}^1 x^4 y'^2 dx \quad \text{s okrajovými podmínkami } y(-1) = -1 \text{ a } y(1) = 1.$$

Platí $f_{zz}(x, y, y') = 2x^4$, a proto nemůžeme použít Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6) v počátku. Opět se dá postupovat následovně

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 0 - \frac{d}{dx} (2x^4 y') = 0 \quad \text{na } [-1, 1].$$

To je ekvivalentní

$$2x^4 y' = C.$$

Mimo počátek dostáváme $y = -\frac{C}{x^3} + D$. Funkce tohoto typu je možné slepovat v počátku (hledáme funkci z $C^1([-1, 1])$) jen pokud $C = 0$, ale pak dostáváme konstantní řešení, které nesplňuje okrajové podmínky. Celkově neexistuje žádná

extremála a funkcionál F na M nenabývá lokálního minima (ani globálního, podobně pro maximum).

(v) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_{-1}^1 (2y^2 + x^2 y'^2) dx \quad \text{s okrajovými podmínkami } y(-1) = -1 \text{ a } y(1) = 1.$$

Pak Euler–Lagrangeova rovnice má tvar

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 4y - \frac{d}{dx}(2x^2 y') = 0 \quad \text{na } [-1, 1].$$

Protože $f_{zz}(x, y, y') = 2x^2$, nemůžeme použít Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6) v počátku. Použijme ji alespoň zvlášť na intervalech $(-1, 0)$ a $(0, 1)$. Na těchto intervalech dostáváme

$$4y - 4xy' - 2x^2 y'' = 0 \quad \iff \quad x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0.$$

Jedná se o Eulerovu rovnici, jejíž obecné řešení má v našem případě tvar

$$y = \alpha x + \frac{\beta}{x^2}.$$

Protože extremála musí být z prostoru $C^1([a, b])$, z uvedených řešení můžeme v počátku slepit jen dvojici lineárních funkcí se stejnou směrnici a díky okrajovým podmínkám celkově dostáváme jedinou extremálu $y_0 = x$ na $[-1, 1]$.

(vi) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_0^1 xy'^2(x) dx \quad \text{s okrajovými podmínkami } y(0) = 0 \text{ a } y(1) = 0.$$

Euler–Lagrangeova rovnice má tvar

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = 0 - \frac{d}{dx}(2xy') = 0.$$

Odtud $y' = \frac{C_1}{2x}$, a proto

$$y = \frac{C_1}{2} \log x + C_2.$$

Podmínku $y \in C^1([0, 1])$ spolu s okrajovými podmínkami zde splňuje jen $y_0 \equiv 0$. Zřejmě se jedná o globální minimum. Snadno si čtenář sám zkonstruuje příklady ukazující, že pro žádné okrajové podmínky se nenabývá globálního maxima. Obecně v případě okrajových podmínek $y(0) = y(1) = C_2$ se globální minimum nabývá pro $y \equiv C_2$. Pokud máme různé okrajové podmínky $y(0) \neq y(1)$, globálního minima se nenabývá. To se dá také ukázat pomocí následující konstrukce. Předně si povšimněme, že žádná $C^1([0, 1])$ -funkce nemůže zároveň splňovat takové okrajové podmínky a $F(y) = 0$. Bez újmy na obecnosti v dalším předpokládejme, že máme okrajové podmínky $y(0) = 0$ a $y(1) = 1$ (pokud pro tyto podmínky

umíme zkonstruovat posloupnost $\{y_k\} \subset X$ splňující $F(y_k) \rightarrow 0$, umíme to pro jakoukoliv sadu různých okrajových podmínek, stačí si rozmyslet vztah mezi $F(y)$ a $F(\alpha y + \beta)$). Nechme se inspirovat řešením Euler–Lagrangeovy rovnice a definujme spojité funkce

$$y_k = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in [0, \frac{1}{k}] \\ \frac{\log x}{\log k} + 1 & \text{pro } x \in [\frac{1}{k}, 1]. \end{cases}$$

Pak platí

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{k}} xy_k'^2(x) dx + \int_{\frac{1}{k}}^1 xy_k'^2(x) dx &= 0 + \int_{\frac{1}{k}}^1 x \left(\frac{1}{x \log k} \right)^2 dx \\ &= \left(\frac{1}{\log k} \right)^2 \int_{\frac{1}{k}}^1 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{\log k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Není těžké si vymyslet drobnou modifikaci funkce y_k na malém okolí bodu $\frac{1}{k}$, aby vznikla funkce z $C^1([0, 1])$ a hodnoty integrálů spočítané výše se změnily jen nepatrně.

Poznámka 13.3.9. (i) Euler–Lagrangeova rovnice má klíčové postavení ve *variálních metodách* důkazu existence řešení diferenciálních rovnic. Zde se postupuje obráceně. Máme zadanou diferenciální rovnici. Pokusíme se nalézt jí odpovídající funkcionál (pro který je naše rovnice Euler–Lagrangeovou rovnicí) a ukázat, že tento funkcionál má stacionární bod dostatečné hladkosti. Pak okamžitě dostáváme, že tento stacionární bod je řešením zkoumané rovnice. Například v poslední části předchozího příkladu má Euler–Lagrangeova rovnice tvar (po rozderivování)

$$2y' + 2xy'' = 0 \quad y(0) = y(1) = 0.$$

Protože odpovídající funkcionál

$$F(y) = \int_0^1 xy'^2(x) dx$$

má na množině $\{y \in C^1([0, 1]): y(0) = y(1) = 0\}$ globální minimum v $y \equiv 0$ ($C^2([0, 1])$ -funkce), okamžitě dostáváme, že tato funkce řeší uvažovanou diferenciální rovnici.

(ii) V praxi se při aplikaci variačních metod podaří nalézt stacionární bod jen málokdy. Většinou se jen dokáže jeho existence za pomoci geometrických vlastností zkoumaného funkcionálu (pak se aplikují numerické metody pro přibližná řešení diferenciálních rovnic). K nejdůležitějším z těchto vlastností patří konvexitá (sama o sobě ovšem existenci minima nezaručuje, uvažte konvexní funkci \exp) doprovázená dalšími pojmy a technikami, jako jsou *koercivita*, *slabá polospojitosť zdola*, *slabá konvergence* či dalšími pojmy, které přesahují teorii těchto skript. Hlavním problémem, se kterým se musí příslušná teorie vyrovnat, je skutečnost, že v nekonečnědimenzionálních prostorech nejsou omezené množiny kompaktní, čímž přicházíme o možnost vybirání konvergentních posloupností z posloupností omezených.

13.3.2 Euler–Lagrangeova rovnice pro funkcionály speciálních typů

Řešení Euler–Lagrangeovy rovnice může být velice obtížné. Jistá zjednodušení nebo alespoň alternativní postupy se nabízejí v situacích, kdy funkce f nezávisí na jedné nebo více proměnných. Těmto případům se nyní budeme věnovat.

Nejprve se zabýváme případem, že funkce f nezávisí na proměnné z (neboli $f = f(x, y)$). Euler–Lagrangeova rovnice má pak jednodušší tvar

$$f_y(x, y) = 0,$$

což je rovnice, v níž se žádné derivace hledané funkce nevyskytují. Jedná se tedy o podstatně jednodušší úlohu než v obecném případě. Řešení však nemusí být vždy snadné, neboť hledaná funkce je zde zadána implicitně. Poznamenejme ještě, že v tomto případě není nutné požadovat, aby $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R})$, ale stačí $f \in C^1([a, b] \times \mathbb{R})$. Zde totiž k odvození výše uvedené podmínky stačí kombinovat první část Lemmatu o tvaru $\delta\Phi(u; h)$ a $\delta^2\Phi(u; h, h)$ (Lemma 13.3.1) a Fundamentální lemma variačního počtu (Lemma 13.3.3). S typickým funkcionálem tohoto typu jsme se setkali třeba v Příkladu 13.2.3. Navíc, pokud $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R})$, platí zjednodušená formule

$$\delta^2\Phi(u; h, h) = \int_a^b f_{yy}(x, y)h^2 dx.$$

To nám často umožňuje přímo používat výsledky abstraktní teorie týkající se druhého diferenciálu.

Pokud funkce f nezávisí na proměnné y (neboli $f = f(x, y')$), Euler–Lagrangeova rovnice má tvar

$$-\frac{d}{dx}f_z(x, y') = 0$$

a její řešení se dá popsat podmínkou $f_z(x, y'_0) = C$. Tím jsme dostali diferenciální rovnici prvního řádu.

Poznamenejme ještě, že v tomto případě navíc platí zjednodušená formule

$$\delta^2\Phi(u; h, h) = \int_a^b f_{zz}(x, y')h'^2 dx,$$

která je opět často vhodná pro aplikaci abstraktní teorie týkající se druhého diferenciálu.

Příklad 13.3.10. Mezi křivkami, které lze popsat grafem C^1 -funkce, hledáme tu, která spojuje bod (a, A) s bodem (b, B) , kde $a < b$, a je z takových křivek nejkratší. Minimalizujeme tedy funkcionál

$$F(y) = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

přes funkce z $C^1([a, b])$ splňující $y(a) = A$ a $y(b) = B$. Pro řešení Euler–Lagrangeovy rovnice proto máme

$$\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2(x)}} = C \quad \Leftrightarrow \quad y'^2 = C^2(1+y'^2).$$

Odtud vidíme, že extrémálními mohou být jen afinní funkce, což spolu s okrajovými podmínkami dává jediného kandidáta na lokální minimum $y_0(x) = A + \frac{B-A}{b-a}(x-a)$. Dále pro libovolné y z uvažované třídy funkcí platí

$$\delta^2 \Phi(u; h, h) = \int_a^b f_{zz}(x, y') h'^2 dx = \int_a^b \frac{1}{(1+y'^2(x))^{\frac{3}{2}}} h'^2 dx \geq 0.$$

Díky tomu lze aplikovat Lagrangeovu postačující podmínku (Věta 13.2.14) a dostáváme, že naše extrémála je bodem lokálního minima. Dokonce se dá dvojným zderivováním snadno ověřit, že funkce $t \mapsto \sqrt{1+t^2}$ je konvexní. Proto je funkcionál F konvexní a jedná se o globální minimum díky Větě o postačující podmínce pro konvexní funkcionál (Věta 13.2.19).

Dalším důležitým případem je $f = f(y, y')$. Zde máme následující popis extrémál.

Tvrzení 13.3.11 (Nutná podmínka řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu). *Jestliže $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$ řeší Euler–Lagrangeovu rovnici, pak*

$$f(y_0, y'_0) - y'_0 f_z(y_0, y'_0) \equiv C.$$

Důkaz. Přenásobíme Euler–Lagrangeovu rovnici výrazem y'_0 a dostáváme

$$\begin{aligned} 0 &= y'_0 f_y(y_0, y'_0) - y'_0 \frac{d}{dx} f_z(y_0, y'_0) \\ &= y'_0 f_y(y_0, y'_0) - \frac{d}{dx} (y'_0 f_z(y_0, y'_0)) + y''_0 f_z(y_0, y'_0) \\ &= \frac{d}{dx} (f(y_0, y'_0)) - \frac{d}{dx} (y'_0 f_z(y_0, y'_0)). \end{aligned}$$

Odtud

$$f(y_0, y'_0) - y'_0 f_z(y_0, y'_0) \equiv C.$$

□

Poznámka 13.3.12. (i) Jedná se skutečně pouze o podmínku nutnou, neboť přenásobením výrazem y'_0 v důkazu není ekvivalentní operací.

(ii) Výhoda právě dokázaného výsledku spočívá v tom, že standardní Euler–Lagrangeovu rovnici, což je rovnice druhého řádu, převádí na rovnici prvního řádu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že úlohu budeme schopni vyřešit. V některých případech je však přechod k nové rovnici nevýhodný, jak uvidíme na příkladech uvedených níže.

(iii) Přestože je výsledná rovnice prvního řádu, při jejím odvození se používala

podmínka $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$. Využití nové metody proto opět vyžaduje předchozí aplikaci Věty o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6).

(iv) Této metodě se ve fyzice často říká metoda hledání prvního integrálu.

Příklad 13.3.13. (i) V případě výše zmíněné úlohy o nejkratší spojnici dvojice bodů jsme pracovali s funkcioálem

$$F(y) = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2(x)} \, dx.$$

Protože $f_{zz}(y, y') = \frac{1}{(1+y'^2(x))^{\frac{3}{2}}} > 0$, můžeme díky Větě o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6) používat jak standardní Euler–Lagrangeovu rovnici, která nám dala podmínku

$$\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2(x)}} = C,$$

tak alternativní rovnici

$$f(y, y') - y' f_z(y, y') = \sqrt{1 + y'^2} - \frac{y'^2}{\sqrt{1 + y'^2(x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2(x)}} \equiv C,$$

ze které je snáze vidět, že y' musí být konstantní.

(ii) Uvažujme funkcioál

$$F(y) = \int_a^b \frac{1 + y^2}{y'^2} \, dx.$$

Protože $f_{zz} = 6 \frac{1+y^2}{y'^4}$, případná extrémála patří do $C^2([a, b])$, bude-li mít nenulovou derivaci. Euler–Lagrangeova rovnice zde má tvar

$$\begin{aligned} 0 &= f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = \frac{2y}{y'^2} + 2 \frac{d}{dx} \left(\frac{1 + y^2}{y'^3} \right) \\ &= \frac{2y}{y'^2} + 2 \frac{2yy'^2 - 3(1 + y^2)y''}{y'^4} = \frac{6}{y'^4} (yy'^2 - (1 + y^2)y''). \end{aligned}$$

Závorka úplně napravo dává

$$yy'^2 - (1 + y^2)y'' = 0,$$

což není žádný ze základních typů diferenciálních rovnic, které umíme řešit. Na druhou stranu, Tvrzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvrzení 13.3.11) nám dává rovnici

$$C \equiv f(y, y') - y' f_z(y, y') = \frac{1 + y^2}{y'^2} + 2y' \frac{1 + y^2}{y'^3} = 3 \frac{1 + y^2}{y'^2}.$$

To mohou řešit jen funkce splňující

$$y' = K \sqrt{1 + y^2}, \quad K \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

a máme řešitelnou rovnici se separovanými proměnnými (integrace povede na funkci $\operatorname{argsinh}$). Všimněme si, že $y' \neq 0$.

(iii) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_a^b (y'^2 - yy' + y^2) dx.$$

Protože $f_{zz} = 2$, případná extrémála patří do $C^2([a, b])$. Euler–Lagrangeova rovnice zde má tvar

$$\begin{aligned} 0 &= f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = -y' + 2y - \frac{d}{dx}(2y' - y) \\ &= -y' + 2y - (2y'' - y') = -2(y'' - y). \end{aligned}$$

Extremálami proto jsou funkce tvaru

$$y_0 = Ce^x + De^{-x}.$$

Přístup využívající Tvrzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvrzení 13.3.11) nám dává rovnici

$$C \equiv f(y, y') - y' f_z(y, y') = y'^2 - yy' + y^2 - y'(2y' - y) = -y'^2 + y^2 = -y'^2 + y^2.$$

Tato rovnice rozhodně není řešitelnější než výše uvedený standardní tvar Euler–Lagrangeovy rovnice. Navíc tato rovnice není ekvivalentní s Euler–Lagrangeovou rovnicí, neboť připouští kupříkladu všechna konstantní řešení.

(iv) V případě, že f závisí jen na poslední proměnné z , Euler–Lagrangeova rovnice okamžitě dává

$$f_z(y') = C.$$

Naproti tomu Tvrzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvrzení 13.3.11) jednak vyžaduje vyšší regularitu extrémály a navíc dává tvar

$$f(y') - y' f_z(y') = C,$$

který bývá často složitější a navíc obecně není ekvivalentní s Euler–Lagrangeovou rovnicí.

13.3.3 Nutné a postačující podmínky existence extrémálů funkcionálů reprezentovaných integrálem

Nyní se budeme zabývat podmínkami odvozenými od chování druhého diferenciálu.

Věta 13.3.14 (Lagrangeova nutná podmínka pro integrální funkcionál). *Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je bodem lokálního minima funkcionálu F . Pak*

$$f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x)) \geq 0 \quad \text{na } [a, b].$$

Důkaz. Pokud by existovalo $x_0 \in (a, b)$ takové, že

$$-A := f_{zz}(x, y_0(x_0), y_0'(x_0)) < 0,$$

pro $\varepsilon > 0$ dostatečně malé bychom z volby

$$h = \begin{cases} \varepsilon \cos^2\left(\frac{x-x_0}{\varepsilon}\right) & \text{pro } |x - x_0| \leq \frac{\pi}{2}\varepsilon \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

dostali pomocí Lemmatu o tvaru $\delta\Phi(u; h)$ a $\delta^2\Phi(u; h, h)$ (Lemma 13.3.1) a předpokladů $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in C^1([a, b])$ (na konci výpočtu používáme ještě jednoduchou substituci)

$$\begin{aligned} \delta^2\Phi(u_0; h, h) &= \int_a^b (f_{yy}(x, y_0, y_0')h^2 + 2f_{yz}(x, y_0, y_0')hh' + f_{zz}(x, y_0, y_0')h'^2) dx \\ &\leq \int_{x_0 - \frac{\pi\varepsilon}{2}}^{x_0 + \frac{\pi\varepsilon}{2}} \left(Ch^2 + C|h||h'| - \frac{A}{2}h'^2 \right) dx \\ &\leq \int_{x_0 - \frac{\pi\varepsilon}{2}}^{x_0 + \frac{\pi\varepsilon}{2}} (C\varepsilon^2 + C\varepsilon) dx - \int_{x_0 - \frac{\pi\varepsilon}{2}}^{x_0 + \frac{\pi\varepsilon}{2}} \frac{A}{2} \sin^2\left(2\frac{x-x_0}{\varepsilon}\right) dx \\ &= \pi\varepsilon(C\varepsilon^2 + C\varepsilon) - \frac{A}{2}\varepsilon \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t) dt < 0. \end{aligned}$$

To je spor s Lagrangeovou nutnou podmínkou z abstraktního případu, tedy s Větou 13.2.12. Celkově proto máme

$$f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x)) \geq 0 \quad \text{na } (a, b).$$

Navíc levá strana předchozí nerovnosti je díky předpokladům spojitá na $[a, b]$, a proto dokazovaná nerovnost platí na celém $[a, b]$. \square

Věta 13.3.15 (Legendreova postačující podmínka). *Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F . Jestliže existují $\alpha, \delta > 0$ taková, že*

$$\delta^2\Phi(u_0; h, h) \geq \alpha \|h\|_{C^1([a, b])}^2 \quad \text{pro všechna } h \in X \text{ splňující } \|h\|_{C^1([a, b])} \leq \delta,$$

pak F má v bodě y_0 ostré lokální minimum.

Důkaz. Zafixujme $h \in X$ splňující $0 < \|h\|_{C^1([a, b])} \leq \delta$ a definujme

$$\varphi(t) := F(y_0 + th) \quad \text{pro } t \in \mathbb{R}.$$

Pak z Taylorova rozvoje máme (v následujícím výpočtu číslo $\theta \in (0, 1)$ závisí na t a h)

$$\begin{aligned} F(y_0 + th) - F(y_0) &= \varphi(t) - \varphi(0) = \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta t) \\ &= 0 + \frac{1}{2}\varphi''(0) + \frac{1}{2}(\varphi''(\theta t) - \varphi''(0)) \\ &\geq \frac{\alpha}{2} \|h\|_{C^1([a, b])}^2 + \frac{1}{2}(\varphi''(\theta t) - \varphi''(0)). \end{aligned}$$

Dokazovaný výsledek proto plyne z následujícího odhadu platného pro $|t|$ dostatečně malé ($|t| \leq t_0$, kde t_0 nezávisí na volbě h ; používáme Lemma o tvaru $\delta\Phi(u; h)$ a $\delta^2\Phi(u; h, h)$), tedy Lemma 13.3.1, a stejnoměrnou spojitost druhých parciálních derivací funkce f na kompaktech)

$$\begin{aligned} |\varphi''(\theta t) - \varphi''(0)| &\leq \int_a^b \left[|f_{yy}(x, y_0 + \theta th, y'_0 + \theta th') - f_{yy}(x, y_0, y'_0)| h^2 \right. \\ &\quad + 2|f_{yz}(x, y_0 + \theta th, y'_0 + \theta th') - f_{yz}(x, y_0, y'_0)| |h| |h'| \\ &\quad \left. + |f_{zz}(x, y_0 + \theta th, y'_0 + \theta th') - f_{zz}(x, y_0, y'_0)| h'^2 \right] dx \\ &\leq \frac{\alpha}{2} \|h\|_{C^1([a,b])}^2. \end{aligned}$$

□

Věta 13.3.16 (Lagrangeova postačující podmínka pro integrální funkcionál).
Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F . Jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $h \in X$ splňující $\|h\|_{C^1([a,b])} \leq \delta$ má funkce

$$\varphi(t) := F(y_0 + th)$$

vlastnost

$$\varphi''(t) \geq 0 \quad \text{pro } t \in (0, 1),$$

pak F má v bodě y_0 lokální minimum. V případě, že předchozí vlastnost platí s ostrou nerovností, jedná se o ostré lokální minimum.

Důkaz. Podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce (Věta 6.3.3) máme

$$F(y_0 + h) - F(y_0) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\xi) = \varphi'(\xi) - \varphi'(0) = \varphi''(\theta\xi)\xi,$$

z čehož vše plyne. □

13.3.4 Konjugované body a Jacobiho rovnice

Nyní si představíme jemnější přístup založený na dalším vyšetření chování druhého Gâteauxova diferenciálu $\delta^2\Phi(u_0; h, h)$.

Nechť $f \in C^3([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$ je stacionárním bodem funkcionálu F a je splněna podmínka (zesílení Lagrangeovy nutné podmínky)

$$P(x) := f_{zz}(x, y_0(x), y'_0(x)) > 0 \quad \text{na } [a, b].$$

Označme ještě

$$Q(x) := f_{yy}(x, y_0(x), y'_0(x)) - \frac{d}{dx}(f_{yz}(x, y_0(x), y'_0(x))).$$

Pak máme

$$\begin{aligned} \delta^2\Phi(u_0; h, h) &= \int_a^b (f_{yy}(x, y_0, y'_0)h^2 + 2f_{yz}(x, y_0, y'_0)hh' + f_{zz}(x, y_0, y'_0)h'^2) dx \\ &= \int_a^b (Ph'^2 + Qh^2) dx, \end{aligned}$$

neboť integrace per partes dává (připomeňme $h(a) = h(b) = 0$)

$$\begin{aligned} \int_a^b 2f_{yz}(x, y_0, y'_0)hh' dx &= \int_a^b f_{yz}(x, y_0, y'_0)(h^2)' dx \\ &= - \int_a^b \left(f_{yz}(x, y_0, y'_0)\right)' h^2 dx. \end{aligned}$$

V dalším budeme pracovat s následujícími pojmy.

Definice 13.3.17 (Jacobiho rovnice, konjugovaný bod). Diferenciální rovnici

$$-(Ph')' + Qh = 0$$

nazýváme *Jacobiho pomocnou rovnici* odpovídající funkcionálu $h \mapsto \delta^2\Phi(u_0; h, h)$. Bod $x \in (a, b]$ se nazývá *konjugovaný* k bodu a , jestliže existuje netriviální řešení Jacobiho rovnice splňující $h(a) = h(x) = 0$.

Poznámka 13.3.18. (i) Jacobiho pomocná rovnice je Euler–Lagrangeovou rovnicí funkcionálu $h \mapsto \delta^2\Phi(u_0; h, h)$.

(ii) Body $x_1, x_2 \in [a, b]$ se nazývají konjugované, jestliže existuje netriviální řešení Jacobiho rovnice splňující $h(x_1) = h(x_2) = 0$.

(iii) Všimněme si, že Jacobiho rovnice má tvar

$$-(Ph')' + Qh = 0,$$

kde $P = P(x)$, $Q = Q(x)$ jsou dané funkce, přičemž funkce P nemění znaménko. Z hlediska naší terminologie jde o lineární obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu. Pokud jde o počáteční podmínku, uvažujeme předepsanou hodnotu $h(a) = 0$ a ptáme se, zda existuje netriviální řešení splňující v nějakém jiném bodě $h(x) = 0$. Triviální, tedy identicky nulové řešení zjevně existuje. To, že je hodnota zadána v krajním bodě intervalu, nehraje žádnou roli (naopak, v jistém smyslu pro fyzikální úlohu, kde roli nezávisle proměnné hraje čas, je tato situace přirozenější než to, když se Cauchyova data zadávají uprostřed intervalu a důkaz existenčních vět funguje bez potíží i v tomto případě), na druhou stranu druhá podmínka je zadána v jiném bodě, jedná se tedy o okrajovou úlohu, které jsme v kapitole o obyčejných diferenciálních rovnicích nestudovali. Na naši úlohu se ale můžeme dívat také tak, že nalezneme obecné řešení rovnice a poté zkoumáme, zda lze splnit obě podmínky tak, že výsledné řešení je netriviální. V takovém případě jsme v situaci, kdy námi dokázaná teorie poskytuje dostatek informací, problém je ale nalézt obecné řešení, protože to v případě, kdy koeficienty závisí na x , obecně neumíme.

Hlavním výsledkem je následující věta, v jejímž důkazu využijeme několik hlubších výsledků z teorie obyčejných diferenciálních rovnic, které jsou i s důkazy uvedeny na konci kapitoly.

Věta 13.3.19 (Jacobiho věta). *Nechť $f \in C^3([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$ je stacionárním bodem funkcionálu F , platí*

$$f_{zz}(x, y_0(x), y'_0(x)) > 0 \quad \text{na } [a, b]$$

a, P, Q jsou jako výše.

(i) Necht' na intervalu $(a, b]$ neexistuje konjugovaný bod k bodu a . Pak y_0 je bodem lokálního minima funkcionálu F na M .

(ii) Necht' y_0 je bodem lokálního minima funkcionálu F na M . Pak na intervalu (a, b) neexistuje konjugovaný bod k bodu a .

Poznámka 13.3.20. Povšimněte si, že pokud je jediným konjugovaným bodem z intervalu $(a, b]$ bod b , Jacobiho věta neposkytuje žádnou informaci.

Důkaz první části Jacobiho věty (Věta 13.3.19). Důkaz provedeme v několika krocích.

Krok 1: nepřítomnost konjugovaných bodů v $(a, b]$ zaručuje, že pro každé netriviální $h \in X$ platí $\delta^2\Phi(u_0; h, h) > 0$.

Jacobiho rovnici si přepíšme do tvaru

$$-Ph'' - P'h' + Qh = 0.$$

Protože $P > 0$ na $[a, b]$, můžeme aplikovat naši teorii lineárních rovnic druhého řádu a dostáváme funkce $u_1, u_2 \in C^2([a, b])$ řešící Jacobiho rovnici s počátečními podmínkami

$$u_1(a) = 0, \quad u_1'(a) = 1, \quad u_2(a) = 1, \quad u_2'(a) = 0$$

(rozmyslete si, že Picard–Lindelöfova věta, tedy Věta 8.3.5, zůstává v platnosti, když pracujeme jen na pravém okolí bodu se zadanou počáteční podmínkou, a platí i jednostranná verze Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu, tedy Věta 8.5.1). Díky neexistenci konjugovaného bodu v $(a, b]$ a počátečním podmínkám zřejmě máme

$$u_1 > 0 \quad \text{na } (a, b].$$

Dále díky spojitosti funkce u_2 a $u_2(a) = 1$ existuje $c \in (a, b]$ takové, že $u_2 > \frac{1}{2}$ na $[a, c]$. Definujme

$$m_1 := \min_{[c, b]} u_1 > 0 \quad \text{a} \quad m_2 := \min_{[c, b]} u_2 \in \mathbb{R}.$$

Pak na $[a, b]$ platí

$$u := \frac{1 + 2|m_2|}{2m_1} u_1 + u_2 \geq \frac{1}{2}.$$

Zároveň je právě zavedená funkce řešením Jacobiho rovnice. Definujme $w := -P\frac{u'}{u}$ na $[a, b]$. Proto

$$w' = \frac{(-Pu')'u + Pu'^2}{u^2} = \frac{(-Qu)u + Pu'^2}{u^2} = -Q + \frac{w^2}{P}.$$

Tento výsledek spolu s identitou (připomeňme $h(a) = h(b) = 0$)

$$\int_a^b (wh^2)' dx = w(b)h^2(b) - w(a)h^2(a) = 0$$

dává

$$\begin{aligned}\delta^2\Phi(u_0; h, h) &= \int_a^b (Ph'^2 + Qh^2) dx = \int_a^b (Ph'^2 + Qh^2 + (wh^2)') dx \\ &= \int_a^b (Ph'^2 + Qh^2 + w'h^2 + 2whh') dx \\ &= \int_a^b P\left(h' + \frac{w}{P}h\right)^2 dx + \int_a^b \left(w' + Q - \frac{w^2}{P}\right)h^2 dx \\ &= \int_a^b P\left(h' + \frac{w}{P}h\right)^2 dx.\end{aligned}$$

Nyní ještě ukážeme, že poslední integrál nemůže být nulový pro netriviální funkci h . V takovém případě by h muselo řešit diferenciální rovnici (lineární diferenciální rovnice prvního řádu)

$$h' + \frac{w}{P}h = 0 \quad \text{na } [a, b].$$

Tato rovnice má však jednoznačné řešení

$$h(x) = h(a)e^{-\int_a^x \frac{w(t)}{P(t)} dt}.$$

To nám dává na prostoru X (zde $h(a) = h(b) = 0$) jednoznačné řešení $h \equiv 0$. Celkově máme

$$h \in X \setminus \{0\} \implies \int_a^b P\left(h' + \frac{w}{P}h\right)^2 dx > 0 \implies \delta^2\Phi(u_0; h, h) > 0.$$

Krok 2: zesílení výsledku perturbací diferenciální rovnice.

Je-li $\alpha > 0$ dostatečně malé, máme $P - \alpha > 0$ na $[a, b]$ a rovnice

$$-((P - \alpha)h')' + Qh = 0$$

s počáteční podmínkou $h(a) = 0$, $h'(a) = 1$ má opět kladné řešení u . To plyne z Důsledku o spojitě závislosti řešení ODR na datech úlohy II (Důsledek 13.6.4) a z toho, že na malém okolí bodu a je řešení kladné díky počáteční podmínce. Analogickým postupem jako výše (všude píšeme $P - \alpha$ namísto P) dostáváme, že funkce $w = -(P - \alpha)\frac{u'}{u}$ řeší rovnici

$$w' + Q - \frac{w^2}{P - \alpha} = 0 \quad \text{na } [a, b]$$

a odtud pro každé $h \in X$ máme

$$\begin{aligned}
& \int_a^b ((P - \alpha)h'^2 + Qh^2) \, dx \\
&= \int_a^b ((P - \alpha)h'^2 + Qh^2 + (wh^2)') \, dx \\
&= \int_a^b ((P - \alpha)h'^2 + Qh^2 + w'h^2 + 2whh') \, dx \\
&= \int_a^b (P - \alpha) \left(h' + \frac{w}{P - \alpha} h \right)^2 \, dx + \int_a^b \left(w' + Q - \frac{w^2}{P - \alpha} \right) h^2 \, dx \\
&= \int_a^b (P - \alpha) \left(h' + \frac{w}{P - \alpha} h \right)^2 \, dx \geq 0.
\end{aligned}$$

Proto

$$\delta^2 \Phi(u_0; h, h) = \int_a^b (Ph'^2 + Qh^2) \, dx \geq \alpha \int_a^b h'^2 \, dx.$$

Krok 3: Ověření Lagrangeovy postačující podmínky.
Zvolme $h \in X \setminus \{0\}$. Definujme

$$\varphi(t) := F(y_0 + th) \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Pak díky tomu, že $f \in C^3([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, má f lipschitzovské druhé parciální derivace na kompaktech, a proto pro $t \in (0, 1)$

$$\begin{aligned}
|\varphi''(t) - \varphi''(0)| &\leq \int_a^b \left(|f_{yy}(x, y_0 + th, y'_0 + th') - f_{yy}(x, y_0, y'_0)| h^2 \right. \\
&\quad + 2|f_{yz}(x, y_0 + th, y'_0 + th') - f_{yz}(x, y_0, y'_0)| |h| |h'| \\
&\quad \left. + |f_{zz}(x, y_0 + th, y'_0 + th') - f_{zz}(x, y_0, y'_0)| h'^2 \right) \, dx \\
&\leq \int_a^b \left[C|t| \left(\max_{[a,b]} |h| + \max_{[a,b]} |h'| \right) h^2 + C|t| \left(\max_{[a,b]} |h| + \max_{[a,b]} |h'| \right) |h| |h'| \right. \\
&\quad \left. + C|t| \left(\max_{[a,b]} |h| + \max_{[a,b]} |h'| \right) h'^2 \right] \, dx \\
&\leq C|t| \|h\|_{C^1([a,b])} \int_a^b (h^2 + |h| |h'| + h'^2) \, dx.
\end{aligned}$$

Díky Youngově nerovnosti máme $|h| |h'| \leq \frac{h^2 + h'^2}{2}$ a pro všechna $x \in (a, b)$ platí (ve

střední části následujícího výpočtu uvažujeme jen netriviální případ $\int_a^x h'^2 ds > 0$)

$$\begin{aligned} |h(x)| &= |h(x) - 0| = |h(x) - h(a)| = \left| \int_a^x h' dt \right| \\ &= \left(\int_a^x h'^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^x 1^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \left| \int_a^x \frac{h'}{\left(\int_a^x h'^2 ds \right)^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{\left(\int_a^x 1^2 ds \right)^{\frac{1}{2}}} dt \right| \\ &\leq \left(\int_a^x h'^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^x 1 ds \right)^{\frac{1}{2}} \int_a^x \left[\frac{1}{2} \left(\frac{h'}{\left(\int_a^x h'^2 ds \right)^{\frac{1}{2}}} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\left(\int_a^x 1^2 ds \right)^{\frac{1}{2}}} \right)^2 \right] dt \\ &= \left(\int_a^x h'^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^x 1 ds \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\int_a^b h'^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} (b-a)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

což implikuje

$$\int_a^b h^2 dx \leq \int_a^b \left((b-a) \int_a^b h'^2 ds \right) dt = (b-a)^2 \int_a^b h'^2 ds = C \int_a^b h'^2 dx.$$

Proto máme celkově

$$\varphi''(t) \geq \varphi''(0) - |\varphi''(t) - \varphi''(0)| \geq \varphi''(0) - C|t| \int_a^b h'^2 ds.$$

Konečně, využijeme-li výsledek druhého kroku, pro $\|h\|_{C^1([a,b])} \leq \delta$, kde $\delta > 0$ je dostatečně malé, dostáváme

$$\begin{aligned} \varphi''(t) &\geq \varphi''(0) - C\delta \int_a^b h'^2 dx \\ &= \int_a^b (Ph'^2 + Qh^2) dx - C\delta \int_a^b h'^2 dx \\ &\geq \alpha \int_a^b h'^2 dx - C\delta \int_a^b h'^2 dx \geq \frac{\alpha}{2} \int_a^b h'^2 dx > 0 \end{aligned}$$

pro $h \not\equiv 0$, Lagrangeova postačující podmínka (Věta 13.2.14) je tedy splněna (všimněte si, že fakt, že kladnost druhých diferenciálů jsme dokázali jen pro malá h , nehraje roli) a F má proto v bodě y_0 lokální minimum. \square

Před důkazem druhé části Jacobiho věty (Věta t 12.10) si odvodíme ještě jeden pomocný výsledek.

Lemma 13.3.21. *Nechť u je takové řešení Jacobiho rovnice, že existuje $c \in [a, b]$ splňující $u(c) = u'(c) = 0$. Pak $u \equiv 0$ na $[a, b]$.*

Důkaz. Jacobiho rovnice má vždy triviální řešení. Navíc toto řešení splňuje počáteční podmínky uvedené ve znění lemmatu. Dále z Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu (Věta 8.5.1) plyne, že při zadaných počátečních podmínkách je řešení jednoznačné (v případě, že $c = a$ nebo $c = b$ opět používáme jednostrannou verzi této věty). \square

Důkaz druhé části Jacobiho věty (Věta 13.3.19). Důkaz si rozdělíme do několika kroků. Nechť $y_0 = u_0 + v$ je stacionárním bodem F na M . Budeme předpokládat, že $x_0 \in (a, b)$ je konjugovaným bodem k bodu a a budeme se snažit dospět ke sporu.

Krok 1: konstrukce pomocných funkcionalů K_μ .

Pro každé $\mu \in \mathbb{R}$ definujeme funkcional

$$K_\mu(h) := \mu \delta^2 \Phi(u_0; h, h) + (1 - \mu)G(h),$$

kde

$$G(h) := \int_a^b h'^2 dx.$$

Protože y_0 je bodem lokálního minima funkcionalu F , podle Lagrangeovy nutné podmínky (Věta 13.2.12) platí

$$\delta^2 \Phi(u_0; h, h) \geq 0 \quad \text{pro všechna } h \in X.$$

Proto z definice funkcionalu G okamžitě plyne

$$\mu \in [0, 1) \quad \implies \quad K_\mu(h) > 0 \quad \text{pro všechna } h \in X \setminus \{0\}.$$

Krok 2: Jacobiho rovnice pro funkcionaly K_μ .

Funkcionalům K_μ odpovídá Jacobiho rovnice

$$-((\mu P + (1 - \mu))h')' + \mu Qh = 0.$$

Nechť $x_0 \in (a, b)$ (konjugovaný bod k bodu a pro původní funkcional) a jemu odpovídá funkce $x \mapsto u(x, 1)$ (netriviální řešení Jacobiho rovnice s $\mu = 1$ splňující $u(a, 1) = u(x_0, 1) = 0$). Předchozí lemma navíc zaručuje, že $\frac{du}{dx}(x_0, 1) \neq 0$.

Dále díky tomu, že

$$0 < \min_{[a, b]} P \leq \max_{[a, b]} P < \infty$$

(funkce $x \mapsto f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x))$ je na $[a, b]$ spojitá a kladná), lze najít $\theta > 0$ takové, že platí

$$\mu P + (1 - \mu) > 0 \quad \text{pro každé } \mu \in [-\theta, 1 + \theta] \text{ a } x \in [a, b].$$

Tato vlastnost a hladká závislost koeficientů Jacobiho rovnice pro funkcional K_μ na $\mu \in [-\theta, 1 + \theta]$ zaručují, že pro každé $\mu \in (-\theta, 1 + \theta)$ existuje takové netriviální řešení $x \mapsto u(x, \mu)$ Jacobiho rovnice s parametrem μ , že $u(a, \mu) = 0$ a navíc $\frac{\partial u}{\partial \mu} u(x, \mu)$ je spojitá na $[a, b] \times (-\theta, 1 + \theta)$. Tato řešení zkonstruujeme pomocí Důsledku o diferencovatelnosti řešení ODR podle parametru II (Důsledek 13.6.8) tak, že položíme $\frac{\partial u}{\partial x}(a, \mu) = \frac{\partial u}{\partial x}(a, 1)$ a řešíme příslušnou Cauchyovu úlohu.

Zjistili jsme, že funkce $u: (x, \mu) \mapsto u(x, \mu)$ má spojitě parciální derivace na $[a, b] \times (-\theta, 1 + \theta)$, platí $u(x_0, 1) = 0$ a

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, 1) \neq 0.$$

Můžeme proto aplikovat Větu o implicitní funkci (Věta 12.4.13) a dostáváme $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $\mu \in (1 - \delta, 1 + \delta)$ existuje $x =: \varphi(\mu) \in (x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$ splňující

$$u(\varphi(\mu), \mu) = 0.$$

Navíc $\varphi \in C^1((1 - \delta, 1 + \delta))$ a

$$\varphi'(\mu) = -\frac{\frac{\partial u}{\partial \mu}(\varphi(\mu), \mu)}{\frac{\partial u}{\partial x}(\varphi(\mu), \mu)} \quad \text{na } (1 - \delta, 1 + \delta).$$

Krok 3: Prodlužování funkce φ doleva.

Protože funkce u má stejnoměrně spojité parciální derivace na $[x_0 - \Delta, x_0 + \Delta] \times [1 - \delta, 1 + \delta]$, z předpisu pro $\varphi'(\mu)$ plyne, že funkce φ je lipschitzovská na $(1 - \delta, 1 + \delta)$. Odtud snadno obdržíme, že existuje $\lim_{\mu \rightarrow (1 - \delta)_+} \varphi(\mu)$ (stejně zdůvodnění jako v důkazu Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu, tedy Věty 8.5.1, z jejího důkazu budeme nyní používat i další myšlenky, sepíšeme je jen stručně). Dodefinujeme-li funkci φ v bodě $1 - \delta$ touto limitou, z hladkosti u v bodě $(\lim_{\mu \rightarrow (1 - \delta)_+} \varphi(\mu), 1 - \delta)$ zjistíme, že

$$u\left(\lim_{\mu \rightarrow (1 - \delta)_+} \varphi(\mu), 1 - \delta\right) = 0.$$

V tomto bodě můžeme tedy opět aplikovat Větu o implicitní funkci (Věta 12.4.13) (v tomto bodě je $\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0$ podle předchozího lemmatu aplikovaného na Jacobiho rovnici odpovídající $\mu = 1 - \delta$) a tím funkci φ prodloužit doleva. V prodlužování postupně pokračujeme. Snadno se nahlédne, že proces prodlužování se může zastavit v nějakém bodě $\mu_0 \in [-\theta, 1 - \delta]$ pouze v následujících třech případech

$$\lim_{\mu \rightarrow \mu_{0+}} \varphi(\mu) = a, \quad \lim_{\mu \rightarrow \mu_{0+}} \varphi(\mu) = b \quad \text{a} \quad \mu_0 < 0.$$

Krok 4: vyloučení případu $\lim_{\mu \rightarrow \mu_{0+}} \varphi(\mu) = a$.

Připomeňme, že funkce u splňuje $u(a, \mu) = 0$ (společná počáteční podmínka pro všechny Jacobiho rovnice). To má v našem případě za následek porušení jednoznačnosti ve Větě o implicitní funkci (Věta 12.4.13) na pravém okolí bodu μ_0 . Porušena může být jen podmínka $\frac{\partial u}{\partial x}(a, \mu_0) \neq 0$, ale její porušení by podle předchozího lemmatu znamenalo, že pro $\mu = \mu_0$ pracujeme s triviálním řešením Jacobiho rovnice.

Krok 5: vyloučení případu $\mu_0 < 0$.

V tomto případě je funkce φ definovaná v počátku, tedy $u(\varphi(0), 0) = 0$, zároveň $\varphi(0) \in (a, b)$ a díky jednoznačnosti plynoucí z Věty o implicitní funkci (Věta 12.4.13) máme informaci, že $u(x, 0) \neq 0$ pro x z jistého prstencového okolí bodu $\varphi(0)$. To znamená, že máme netriviální řešení Jacobiho rovnice pro $\mu = 0$, tedy

$$h'' = 0,$$

kteřé splňuje $h(a) = h(\varphi(0)) = 0$, $\varphi(0) \neq 0$. To ale není možné, neboť uvedenou rovnici řeší pouze afinní funkce.

Krok 6: vyloučení případu $\lim_{\mu \rightarrow \mu_{0+}} \varphi(\mu) = b$ pro $\mu \in [0, 1)$.

Pokud by nastala uvedená situace, existovala by netriviální funkce h splňující $h(a) = h(b) = 0$ a

$$-((\mu_0 P + (1 - \mu_0))h')' + \mu_0 Qh = 0.$$

Využijeme toho, že h řeší zmíněnou Jacobiho rovnici, pak integrací per partes (spolu s $h(a) = h(b) = 0$) dostáváme

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b \left(-((\mu_0 P + (1 - \mu_0))h')' + \mu_0 Qh \right) h \, dx \\ &= \int_a^b \left(-((\mu_0 P + (1 - \mu_0))h')' h + \mu_0 Qh^2 \right) dx \\ &= \int_a^b (\mu_0 P + (1 - \mu_0))h'^2 \, dx - [(\mu_0 P + (1 - \mu_0))h'h]_a^b + \int_a^b \mu_0 Qh^2 \, dx \\ &= \int_a^b [(\mu_0 P + (1 - \mu_0))h'^2 + \mu_0 Qh^2] \, dx = K_\mu(h). \end{aligned}$$

To je ve sporu s výsledkem získaným na konci prvního kroku.

V krocích 4 až 6 jsme ukázali, že nenastal žádný z možných případů. Máme tedy spor, a proto bod $x_0 \in (a, b)$ nemůže být konjugovaný k a . \square

Příklad 13.3.22. (i) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_0^1 xy^2(x) \, dx \quad \text{s okrajovými podmínkami } y(0) = 0 \text{ a } y(1) = 0.$$

V první části Příkladu 13.3.8 jsme ukázali, že jedinou extrémálou je funkce $y_0 \equiv 0$. Pokusme se sestavit Jacobiho rovnici. Dostáváme

$$P = f_{zz}(x, y_0, y_0') = 0.$$

Není tedy splněna podmínka $P > 0$ a teorii okolo Jacobiho rovnice zde proto nemáme k dispozici.

(ii) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_a^b y'^2 \, dx.$$

Ve druhé části Příkladu 13.3.8 jsme ukázali, že extrémálami jsou funkce $y_0 = Cx + D$ (konstanty C, D jsou jednoznačně určeny okrajovými podmínkami). Pokusme se sestavit a vyřešit Jacobiho rovnici. Dostáváme

$$P = f_{zz}(x, y_0, y_0') = 2 > 0$$

a

$$Q = f_{yy}(x, y_0, y_0') - \frac{d}{dx} \left(f_{yz}(x, y_0, y_0') \right) = 0.$$

Jacobiho rovnice pak má tvar

$$0 = -(Ph')' + Qh = -2h''.$$

Jejími řešeními jsou funkce tvaru

$$h = C_1x + C_2.$$

Protože žádná netriviální afinní funkce nemá více než jeden nulový bod, v intervalu $(a, b]$ neleží konjugovaný bod k bodu a , a proto má F v námi nalezené extrémále lokální minimum.

(iii) Uvažujme funkcionál

$$F(y) = \int_a^b y'(1 + x^2 y') dx.$$

Tento funkcionál splňuje $f_{zz}(x, y, y') = 2x^2$. Proto je Jacobiho věta (Věta 13.3.19) aplikovatelná jen v případě, že $0 \notin [a, b]$. V dalším se proto budeme zabývat jen tímto případem. Ve třetí části Příkladu 13.3.8 jsme ukázali, že extrémalami jsou funkce $y_0 = \frac{C}{x} + D$. Pokusme se sestavit a vyřešit Jacobiho rovnici. Dostáváme

$$P = f_{zz}(x, y_0, y'_0) = 2x^2 > 0$$

a

$$Q = f_{yy}(x, y_0, y'_0) - \frac{d}{dx} (f_{yz}(x, y_0, y'_0)) = 0.$$

Jacobiho rovnice pak má tvar

$$0 = -(Ph')' + Qh = -(2x^2 h')'.$$

Snadno spočítáme, že jejími řešeními jsou funkce tvaru

$$h = \frac{C_1}{x} + C_2.$$

Protože žádná netriviální funkce tohoto typu nemá více než jeden nulový bod, v intervalu $(a, b]$ neleží konjugovaný bod k bodu a , a proto má F v námi nalezené extrémále lokální minimum.

(iv) V Příkladu 13.3.10 jsme pracovali s funkcionálem

$$F(y) = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

a ukázali, že jeho extrémalami jsou jen afinní funkce. Pokusme se sestavit a vyřešit Jacobiho rovnici. Dostáváme

$$P = f_{zz}(x, y_0, y'_0) = \frac{1}{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}} = C > 0$$

a

$$Q = f_{yy}(x, y_0, y'_0) - \frac{d}{dx} (f_{yz}(x, y_0, y'_0)) = 0.$$

Jacobiho rovnice pak má tvar

$$0 = -(Ph')' + Qh = -(Ch')'.$$

Protože žádná netriviální afinní funkce nemá více než jeden nulový bod, v intervalu $(a, b]$ neleží konjugovaný bod k bodu a , a proto má F v námi nalezené extrémále lokální minimum.

(v) Ve třetí části Příkladu 13.3.13 jsme pracovali s funkcí

$$F(y) = \int_a^b (y'^2 - yy' + y^2) dx.$$

Ukázali jsme, že extrémalami jsou funkce tvaru

$$y_0 = Ce^x + De^{-x}.$$

Pokusme se sestavit a vyřešit Jacobiho rovnici. Dostáváme

$$P = f_{zz}(x, y_0, y'_0) = 2 > 0$$

a

$$Q = f_{yy}(x, y_0, y'_0) - \frac{d}{dx}(f_{yz}(x, y_0, y'_0)) = 2 - (-1)' = 2.$$

Jacobiho rovnice pak má tvar

$$0 = -(Ph')' + Qh = -(2h')' + 2h = -2(h'' - h).$$

Snadno spočítáme, že jejími řešeními jsou funkce tvaru (konstanty jsou jednoznačně určeny okrajovými podmínkami)

$$h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

Opět se dá ukázat, že žádná netriviální funkce tohoto typu nemá více než jeden nulový bod. V intervalu $(a, b]$ proto neleží konjugovaný bod k bodu a , a proto má F v námi nalezené extrémále lokální minimum.

(vi) Uvažujme funkcí

$$F(y) = \int_0^l (y'^2 - y^2) dx \quad \text{s okrajovými podmínkami } y(0) = 0 \text{ a } y(l) = 0.$$

Pak má Euler–Lagrangeova rovnice tvar

$$f_y(x, y, y') - \frac{d}{dx} f_z(x, y, y') = -2y - \frac{d}{dx}(2y') = 0 \quad \text{na } [0, l].$$

Protože $f_{zz}(x, y, y') = 2$, můžeme použít Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6) a dostáváme díky ní

$$0 = -2y - 2y'' = -2(y'' + y).$$

Extrémalami proto jsou funkce tvaru

$$y_0 = C \cos x + D \sin x.$$

S ohledem na okrajové podmínky dostáváme, že $C = 0$ a l musí být násobkem čísla π , aby vůbec nějaká extrémála existovala. V dalším tedy předpokládejme, že $l = k\pi$, kde $k \in \mathbb{N}$, a $y_0 = D \sin x$, kde $D \in \mathbb{R}$. Pokusme se sestavit a vyřešit Jacobiho rovnici. Dostáváme

$$P = f_{zz}(x, y_0, y'_0) = 2 > 0$$

a

$$Q = f_{yy}(x, y_0, y'_0) - \frac{d}{dx} \left(f_{yz}(x, y_0, y'_0) \right) = -2.$$

Jacobiho rovnice pak má tvar

$$0 = -(Ph')' - Qh = -(2h')' - 2h = -2(h'' + h)$$

a řešení

$$h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Zkoumejme, zda existuje bod $x_0 > 0$ konjugovaný k počátku. Počáteční podmínka $h(0) = 0$ znamená, že pracujeme jen s řešeními tvaru $h = C_2 \sin x$. Okamžitě vidíme, že každý bod tvaru $m\pi$, kde $m \in \mathbb{N}$, je konjugovaný bod k počátku. Jacobiho věta (Věta 13.3.19) nám pak dává, že pokud $l = k\pi$, kde $k \geq 2$, nalezené extrémály nejsou body lokálního minima. Pro $k = 1$ Jacobiho věta nedokáže rozhodnout.

Poznámka 13.3.23. Povšimněme si, že kdykoliv $f_{zz} > 0$ a f nezávisí na y , pak Jacobiho rovnice rovnice má tvar

$$(f_{zz}h')' = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f_{zz}h' \equiv C \quad \Longleftrightarrow \quad h' = \frac{C}{f_{zz}}.$$

Pokud je nyní $C = 0$, dostáváme konstantní řešení (nepřipouští žádné konjugované body k a). Pokud je $C \neq 0$, dostáváme ryze monotonní řešení, která opět nepřipouštějí konjugované body k a .

13.3.5 Vázané extrémy

Nyní si zobecníme výsledky o vázaných extrémech z kapitoly o funkcích více proměnných na nekonečnědimenzionální případ. Funkcionál Ψ se získá z funkcionálu G analogicky jako Φ z F , tedy přičtením vhodné afinní funkce, aby se získaly homogenní (tedy nulové) okrajové podmínky.

Věta 13.3.24 (O Lagrangeových multiplikatorech). *Nechť $f, g \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $\gamma \in \mathbb{R}$ a $y_0 \in M$ je minimizérem funkcionálu*

$$F(y) = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx$$

vzhledem k množině $\{y \in M : G(y) = \gamma\}$, kde

$$G(y) = \int_a^b g(x, y(x), y'(x)) dx.$$

Nechť $d\Psi(y_0) \neq 0$ (existuje $h \in X$ splňující $d\Psi(y_0)(h) \neq 0$). Pak existuje $\lambda \in \mathbb{R}$ takové, že

$$d\Phi(y_0)(h) - \lambda d\Psi(y_0)(h) = 0 \quad \text{pro všechna } h \in X,$$

neboli na $[a, b]$ platí

$$f_y(x, y_0(x), y_0'(x)) - \lambda g_y(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx} \left(f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) - \lambda g_z(x, y_0(x), y_0'(x)) \right) = 0$$

(výraz na posledním řádku lze rozderivovat pomocí řetězového pravidla opět až při dodatečném předpokladu $y \in C^2((a, b))$).

Důkaz. Podle předpokladu existuje funkce $\psi \in X$ taková, že $\delta\Psi(y_0; \psi) = 1$. Zafixujeme ještě libovolné $\varphi \in X$. Definujme pomocné funkce $U, V: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$U(s, t) = \Phi(y_0 + s\varphi + t\psi) \quad \text{a} \quad V(s, t) = \Psi(y_0 + s\varphi + t\psi) - \Psi(y_0).$$

Protože $V(0, 0) = 0$, $V \in C^2(\mathbb{R}^2)$ a

$$V_t(0, 0) = \delta G(y_0; \psi) = 1,$$

můžeme použít Větu o implicitní funkci (Věta 12.4.13) a dostáváme $\delta, \Delta > 0$ taková, že pro každé $s \in (-\delta, \delta)$ existuje právě jedno $t =: \eta(s) \in (-\Delta, \Delta)$ splňující $V(s, \eta(s)) = 0$ a $\eta \in C^2((-\delta, \delta))$. Navíc

$$\eta'(0) = -\frac{V_s(0, 0)}{V_t(0, 0)} = -V_s(0, 0).$$

Na druhou stranu, protože funkce $y_0 + s\varphi + \eta(s)\psi$ splňuje požadované okrajové podmínky a vazební podmínku z naší minimalizační úlohy a zřejmě (připomeňme $\eta(0) = 0$ a $\eta \in C^2((-\delta, \delta))$)

$$\|(y_0 + s\varphi + \eta(s)\psi) - y_0\|_{C^1([a, b])} \rightarrow 0 \quad \text{pro } s \rightarrow 0,$$

pro s dostatečně blízko k nule musí platit

$$U(0, 0) \leq U(s, \eta(s)).$$

Odtud (využíváme $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$)

$$0 = \frac{d}{ds} U(s, \eta(s))|_{s=0} = U_s(0, 0) + U_t(0, 0)\eta'(0) = U_s(0, 0) - U_t(0, 0)V_s(0, 0).$$

Pokud položíme

$$\lambda = U_t(0, 0)$$

(λ nezávisí na volbě φ), máme

$$0 = U_s(0, 0) - \lambda V_s(0, 0) = \delta\Phi(y_0; \varphi) - \lambda\delta\Psi(y_0; \varphi).$$

Protože $\varphi \in X$ bylo libovolné, dokázali jsme požadovanou identitu pro Gâteauxovy derivace. Přepis do diferenciální rovnice dostaneme standardním způsobem kombinujícím integraci per partes a du Bois-Reymondovo lemma (Lemma 13.3.2), jako se získala Euler–Lagrangeova rovnice. \square

Typickými aplikacemi právě získaného výsledku jsou úloha o zavěšeném řetězu a problém princezny Dido, kterými se budeme zabývat později.

13.3.6 Postačující podmínka pro globální extrém

Představíme si alespoň jednu postačující podmínku pro globální extrém pracující s vlastnostmi funkce f . Hlavní úlohu zde sehraje konvexita funkcí více proměnných.

Lemma 13.3.25 (O charakterizaci konvexity funkcí více proměnných). *Nechť $g \in C^1(G)$, kde $G \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená konvexní množina. Pak jsou následující podmínky ekvivalentní:*

- (i) g je konvexní na G
- (ii) $g(y) - g(x) \geq \nabla g(x) \cdot (y - x)$ pro všechna $x, y \in G$
- (iii) $(\nabla g(y) - \nabla g(x)) \cdot (y - x) \geq 0$ pro všechna $x, y \in G$.

Důkaz. „(i) \Rightarrow (ii)“ Nechť $x, y \in G \subset \mathbb{R}^N$ a $g \in C^1(G)$ je konvexní. Nechť $t \in (0, 1]$. Pak podle Věty o střední hodnotě (Věta 12.1.23) existuje $\theta > 0$ takové, že

$$g(x + t(y - x)) = g(x) + t\nabla g(x + \theta t(y - x)) \cdot (y - x).$$

Na druhou stranu díky konvexitě máme

$$g(x + t(y - x)) = g((1 - t)x + ty) \leq (1 - t)g(x) + tg(y).$$

Porovnáním obou formulí dostáváme

$$g(y) - g(x) \geq \nabla g(x + \theta t(y - x)) \cdot (y - x).$$

Limitní přechod $t \rightarrow 0_+$ dává (připomeňme $g \in C^1(G)$)

$$g(y) - g(x) \geq \nabla g(x) \cdot (y - x).$$

„(ii) \Rightarrow (iii)“ Pokud platí (ii), prohozením rolí x a y dostáváme

$$g(x) - g(y) \geq \nabla g(y) \cdot (x - y) \quad \iff \quad g(y) - g(x) \leq \nabla g(y) \cdot (y - x).$$

Tento výsledek spolu s (ii) dává

$$\nabla g(x) \cdot (y - x) \leq g(y) - g(x) \leq \nabla g(y) \cdot (y - x).$$

Odtud máme

$$0 \leq (\nabla g(y) - \nabla g(x)) \cdot (y - x),$$

což je (iii).

„(iii) \Rightarrow (i)“ Předpokládejme (iii). Zafixujme $x, y \in G$. Pak existuje $\delta > 0$, pro které má smysl definovat

$$\varphi(t) = g(x + t(y - x)) \quad \text{pro } t \in (-\delta, 1 + \delta).$$

Pro každé $-\delta \leq \alpha < \beta \leq 1 + \delta$ pak máme díky definici φ a (iii)

$$\begin{aligned}\varphi'(\alpha) - \varphi'(\beta) &= \nabla g(x + \alpha(y - x)) \cdot (y - x) - \nabla g(x + \beta(y - x)) \cdot (y - x) \\ &= \left(\nabla g(x + \alpha(y - x)) - \nabla g(x + \beta(y - x)) \right) \cdot (y - x) \\ &= \frac{1}{\alpha - \beta} \left(\nabla g(x + \alpha(y - x)) - \nabla g(x + \beta(y - x)) \right) \times \\ &\quad \times \left((x + \alpha(y - x)) - (x + \beta(y - x)) \right) \geq 0.\end{aligned}$$

Proto je φ' neklesající na $(-\delta, 1 + \delta)$, a díky tomu je zde φ konvexní. To ale znamená, že pro každé $\lambda \in [0, 1]$ platí

$$\varphi(\lambda) = \varphi((1 - \lambda) \cdot 0 + \lambda \cdot 1) \leq (1 - \lambda)\varphi(0) + \lambda\varphi(1).$$

Díky definici funkce φ předchozí nerovnost znamená

$$g(x + \lambda(y - x)) \leq (1 - \lambda)g(x) + \lambda g(y),$$

čímž jsme ověřili konvexitu funkce g . □

Věta 13.3.26 (O postačující podmínce globálního minima). *Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ je pro každé $x \in [a, b]$ konvexní v poslední dvojici proměnných a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F . Pak má F v bodě y_0 globální minimum.*

Důkaz. Nechť $y_0 \in M$ splňuje Euler–Lagrangeovu rovnici a $w \in M \setminus \{y_0\}$. Pak nerovnost (ii) z předchozího lemmatu a integrace per partes dávají

$$\begin{aligned}F(w) - F(y_0) &= \int_a^b (f(x, w, w') - f(x, y_0, y_0')) dx \\ &\geq \int_a^b ((w - y_0)f_y(x, y_0, y_0') + (w' - y_0')f_z(x, y_0, y_0')) dx \\ &= \int_a^b ((w - y_0)f_y(x, y_0, y_0') - (w - y_0)(f_z(x, y_0, y_0'))') dx = 0.\end{aligned}$$

Tím je důkaz dokončen. □

Zabývejme se ještě otázkou, jak konvexitu v poslední dvojici proměnných ověřovat.

Věta 13.3.27 (O postačující podmínce pro konvexitu funkcí více proměnných). *Nechť $g \in C^2(G)$, kde $G \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená konvexní množina. Pak g je konvexní na G právě tehdy, když má všude na G pozitivně semidefinitní Hessovu matici.*

Důkaz. Důkaz bude založen na Taylorově rozvoji

$$g(y) = g(x) + \nabla g(x) \cdot (y - x) + \frac{1}{2} d^2 g(x + \theta(y - x))(y - x, y - x).$$

„ \Leftarrow “ Je-li Hessova matice ve všech bodech pozitivně semidefinitní, předchozí Taylorův rozvoj dává

$$g(y) - g(x) \geq \nabla g(x) \cdot (y - x) \quad \text{pro všechna } x, y \in G,$$

což je charakterizace konvexity.

„ \Rightarrow “ Pokud v nějakém bodě $x \in G$ není Hessova matice pozitivně semidefinitní, existuje $h \in \mathbb{R}^N$ takové, že

$$d^2g(x)(h, h) < 0.$$

Z toho, že $g \in C^2(G)$, pak plyne, že $d^2g(z)(h, h) < 0$ pro každé z dostatečně blízké x . Pro $y := x + \alpha h$, kde $\alpha > 0$ je dostatečně malé, proto díky výše uvedenému Taylorovu rozvoji dostáváme

$$g(y) < g(x) + \nabla g(x) \cdot (y - x).$$

Tím jsme vyvrátili nerovnost charakterizující konvexitu. Proto g nemůže být konvexní na G . \square

Tvrzení 13.3.28. *Nechť $N = 2$, potom pozitivní semidefinitnost Hessovy matice H_g na $G \subset \mathbb{R}^2$ je ekvivalentní podmínce*

$$g_{xx} \geq 0 \quad \wedge \quad g_{yy} \geq 0 \quad \wedge \quad g_{xx}g_{yy} - g_{xy}^2 \geq 0 \quad \text{na } G.$$

Důkaz. Pozitivní semidefinitnost implikuje nezápornost determinantu (tedy třetí z výše uvedených podmínek) a navíc musí platit

$$0 \leq d^2g(x)((h_1, 0), (h_1, 0)) = g_{xx}h_1^2 \quad \text{a} \quad 0 \leq d^2g(x)((0, h_2), (0, h_2)) = g_{yy}h_2^2.$$

Na druhou stranu, trojice podmínek uvedených výše zaručuje pro $h = (h_1, 0)$

$$d^2g(x)(h, h) = g_{xx}h_1^2 \geq 0$$

a pokud pro $h = (h_1, h_2)$, kde $h_2 \neq 0$, položíme $\alpha := \frac{h_1}{h_2}$, dostáváme

$$\begin{aligned} d^2g(x)(h, h) &= g_{xx}h_1^2 + g_{yy}h_2^2 + 2g_{xy}h_1h_2 \\ &\geq h_2^2(g_{xx}\alpha^2 + g_{yy}\alpha - 2g_{xy}) \geq 0, \end{aligned}$$

kde poslední nerovnost plyne ze nekladnosti diskriminantu $(2g_{xy})^2 - 4g_{xx}g_{yy}$. \square

Příklad 13.3.29. (i) Uvažujme funkcionál

$$\int_a^b \sqrt{1 + y^2} \, dx.$$

V první části Příkladu 13.3.13 jsme si ukázali, že jedinými extrémálními jsou afinní funkce. Zkusme ukázat, že integrand je konvexní v poslední dvojici proměnných a tím dokázat, že v každé z těchto extrémál má funkcionál F při odpovídajících

okrajových podmínkách globální minimum. Podle předchozího kritéria potřebujeme

$$f_{yy} \geq 0, \quad f_{zz} \geq 0 \quad \text{a} \quad f_{yy}f_{zz} - f_{yz}^2 \geq 0 \quad \text{na } (a, b) \times \mathbb{R}^2.$$

To skutečně platí, neboť

$$f_{zz}(x, y, y') = \frac{1}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} > 0, \quad f_{yy}(x, y, y') \equiv 0 \quad \text{a} \quad f_{yz}(x, y, y') \equiv 0.$$

(ii) Uvažujme funkcionál

$$\int_a^b (y'^2 - yy' + y^2) dx.$$

Ve třetí části Příkladu 13.3.13 jsme vyřešením Euler–Lagrangeovy rovnice zjistili, že extrémálními jsou funkce tvaru $y_0 = Ce^x + De^{-x}$ (koeficienty C, D jsou jednoznačně určeny okrajovými podmínkami). Metody založené na studiu Jacobiho rovnice nám v páté části Příkladu 13.3.22 dále prozradily, že v získaných extrémálních má F lokální minima. Pokusme se ještě ověřit konvexitu v poslední dvojici proměnných. Máme

$$f_{zz}(x, y, y') \equiv 2 \geq 0, \quad f_{yy}(x, y, y') \equiv 2 \geq 0$$

a

$$f_{yy}(x, y, y')f_{zz}(x, y, y') - f_{yz}^2(x, y, y') = 2 \cdot 2 - 1^2 \geq 0.$$

Proto se podle Věty o postačující podmínce pro globální minimum (Věta 13.3.26) jedná dokonce o globální minimum.

Poznámka 13.3.30. Náš existenční výsledek požadující konvexitu v posledních dvou proměnných je poměrně slabý a v mnoha úlohách nepoužitelný. V odborné literatuře se dají nalézt silnější výsledky kombinující konvexitu v poslední proměnné a vhodné růstové podmínky pro funkci f . Pro získání takovéhoto výsledku však naše C^1 -teorie není vhodná.

Poznámka 13.3.31. (i) Věta o postačující podmínce globálního minima také plyne z Věty o postačující podmínce pro konvexní funkcionál (Věta 13.2.19), neboť konvexita integrandu v poslední dvojici proměnných implikuje konvexitu funkcionálu. To je snadno vidět z výpočtu

$$\begin{aligned} & \lambda F(u) + (1 - \lambda)F(v) - F(\lambda u + (1 - \lambda)v) \\ &= \int_a^b \left[\lambda f(x, u, u') + (1 - \lambda)f(x, v, v') - f(x, \lambda u + (1 - \lambda)v, \lambda u' + (1 - \lambda)v') \right] dx \\ &= \int_a^b \left[\lambda f(x, u, u') + (1 - \lambda)f(x, v, v') - f(x, \lambda(u, u') + (1 - \lambda)(v, v')) \right] dx \\ &\geq \int_a^b \left[\lambda f(x, u, u') + (1 - \lambda)f(x, v, v') - \left(\lambda f(x, u, u') + (1 - \lambda)f(x, v, v') \right) \right] dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

Přínos této části textu tedy spočívá v získání metody pro ověřování konvexity, kterou jsme si představili v Tvzení 13.3.28.

(ii) Na druhou stranu existují konvexní funkcionály, které nemají integrand konvexní v poslední dvojici proměnných. Typickým příkladem je funkcionál

$$F(y) = \int_a^b (y'^2 - \varepsilon y^2) dx,$$

kde $\varepsilon > 0$ je malé číslo. Pak totiž $f_{yy} = -2\varepsilon < 0$, díky čemuž funkce f nemůže být konvexní v poslední dvojici proměnných. Na druhou stranu

$$\begin{aligned} & \lambda F(u) + (1 - \lambda)F(v) - F(\lambda u + (1 - \lambda)v) \\ &= \int_a^b \left[\lambda u'^2 + (1 - \lambda)v'^2 - (\lambda u' + (1 - \lambda)v')^2 \right. \\ & \quad \left. - \varepsilon \left(\lambda u^2 + (1 - \lambda)v^2 - (\lambda u + (1 - \lambda)v)^2 \right) \right] dx \\ &= (\lambda - \lambda^2) \int_a^b \left[u'^2 + v'^2 - 2u'v' - \varepsilon(u^2 + v^2 - 2uv) \right] dx \\ &= (\lambda - \lambda^2) \int_a^b \left[(u' - v')^2 - \varepsilon(u - v)^2 \right] dx. \end{aligned}$$

Ve druhé části důkazu Jacobiho věty (Věta 13.3.19) jsme si ukázali, že pro každé $h \in X$ platí

$$\int_a^b h^2 dx \leq C \int_a^b h'^2 dx,$$

kde C závisí na délce intervalu $[a, b]$. Díky tomuto odhadu předchozí výpočet dává konvexitu funkcionálu F , kdykoliv je $\varepsilon > 0$ dostatečně malé.

13.4 Klasické úlohy variačního počtu

13.4.1 Nejkratší spojnice v rovině

Jednou ze základních úloh variačního počtu je hledání nejkratší spojnice dvou bodů v rovině. Tuto úlohu jsme uspokojivě vyřešili v Příkladu 13.3.10.

13.4.2 Problém princezny Dido

Podle pověsti bylo město Kartágo založeno fénickou princeznou Dido prchající před úklady svého bratra Pygmaliona do severní Afriky. Místní vládce nabídl Dido pouze území, které pokryje volská kůže. Mazaná princezna volskou kůží rozřezala na tenké proužky, ty svázala do více než čtyřkilometrového pramene a využila jej spolu s pobřežím k ohrazení území budoucího Kartága. Přestože se legenda o využití variačního počtu nezmiňuje, pokusme se úvahy princezny Dido alespoň částečně zrekonstruovat.

Nechť $L > 0$ je zadaná délka pramene volské kůže. V dalším pro nás bude x -ová osa představovat pobřeží na severu Afriky a budeme hledat nekladnou C^1 -funkci, která splňuje okrajové podmínky $y(-b) = y(b) = 0$, pro nějaké $b \in (0, \frac{L}{2}]$ (na konci výpočtu ještě provedeme diskusi ohledně nejvýhodnější volby konstanty b), vazební podmínku

$$G(y) := \int_{-b}^b \sqrt{1 + y'^2} \, dx = L,$$

a která minimalizuje funkcionál (plocha je absolutní hodnota následujícího nekladného integrálu)

$$F(y) = \int_{-b}^b y \, dx.$$

Použijme Větu o Lagrangeových multiplikatorech (Věta 13.3.24). Protože (Ψ se získá z G stejně jako Φ z F)

$$\delta\Psi(y; h) = \int_{-b}^b (g_y(x, y, y')h + g_z(x, y, y')h') \, dx = \int_{-b}^b \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} h' \, dx,$$

podmínka o netriviálnosti $h \mapsto \delta\Psi(y_0; h)$ může být podle du Bois-Reymondova lemmatu (Lemma 13.3.2) porušena jen pokud

$$\frac{y'_0}{\sqrt{1 + y'^2_0}} \equiv C \quad \text{na } [-b, b].$$

Ukažme, že uvedenou rovnici řeší jen konstantní funkce (s přihlédnutím k okrajovým podmínkám). Pokud $C = 0$, je to zřejmé. Pokud $C \neq 0$, pak dostáváme

$$\frac{y'^2_0}{1 + y'^2_0} = C^2 \quad \iff \quad y'^2_0 = C^2(1 + y'^2_0).$$

Pro $C = \pm 1$ rovnice nemá řešení, pro ostatní případy dostáváme $y' \equiv 0$. Konstantní řešení (odpovídá situaci $b = \frac{L}{2}$) dává nulovou plochu ohraničeného území a jistě se nejedná o hledané minimum.

Zbylé extremály získáme z Euler–Lagrangeovy rovnice pro funkcionál $F - \lambda G$ (tentokrát je výhodnější použít standardní tvar Euler–Lagrangeovy rovnice než Tvrzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu, tedy Tvrzení 13.3.11, které by vedlo na $C \equiv y_0 - \frac{\lambda}{\sqrt{1 + y'^2_0}}$). Máme

$$0 = f_y - \lambda g_y - (f_z - \lambda g_z)' = 1 + \lambda \left(\frac{y'_0}{\sqrt{1 + y'^2_0}} \right)'.$$

Odtud máme (výše vidíme, že $\lambda \neq 0$)

$$\frac{y'_0}{\sqrt{1 + y'^2_0}} = -\frac{1}{\lambda}x + C$$

a to implikuje

$$\frac{y_0'^2}{1+y_0'^2} = \left(-\frac{1}{\lambda}x + C\right)^2 \iff y_0'^2 = \frac{\left(-\frac{1}{\lambda}x + C\right)^2}{1 - \left(-\frac{1}{\lambda}x + C\right)^2}.$$

Proto máme

$$y_0' = \pm \frac{-\frac{1}{\lambda}x + C}{\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{\lambda}x + C\right)^2}}$$

a po integraci dostáváme

$$y_0(x) = \pm \lambda \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{\lambda}x + C\right)^2} + D = \pm \operatorname{sign}(\lambda) \sqrt{\lambda^2 - (-x + C\lambda)^2} + D.$$

Přesněji, dostali jsme dvě funkce, které řeší Euler–Lagrangeovu rovnici. Ještě by teoreticky jako minimizéry mohly připadat v úvahu funkce získané splením takovýchto funkcí (pokud bychom na některých podintervalech $(-b, b)$ ve vyjádření y_0' uvažovali znaménko $+$ a na jiných znaménko $-$). Protože však výsledkem musí být C^1 -funkce, k přechodu k opačnému znaménku by mohlo dojít jen v bodě s nulovou derivací, tedy v bodě $x_0 = \lambda C$. Navíc podle Věty o regularitě minimizéru, tedy Věty 13.3.6 (zde $f_{zz} - \lambda g_{zz} = 0 - \lambda \frac{1}{(1+z^2)^{\frac{3}{2}}} \neq 0$, neboť už jsme vyloučili případ $\lambda \neq 0$), jsou extrémály třídy C^2 . Přířímým výpočtem se získá $y_0''(x_0) = \mp \frac{1}{|\lambda|}$, slepovat tedy nemůžeme ani v bodě x_0 a Euler–Lagrangeova rovnice má pouze výše uvedená řešení.

Dále splnění okrajových podmínek $y(-b) = y(b) = 0$ vyžaduje $C = 0$, $|\lambda| \geq b$ a $D = \mp \operatorname{sign}(\lambda) \sqrt{\lambda^2 - b^2}$. Tyto informace nám pro každou přípustnou hodnotu čísla λ připouštějí jen dvě funkce a minimum může ovlivnit jen ta nekladná

$$y_0(x) = -\sqrt{\lambda^2 - x^2} + \sqrt{\lambda^2 - b^2}.$$

Výše získaná podmínka $\frac{y_0'}{\sqrt{1+y_0'^2}} = -\frac{1}{\lambda}x$ navíc zaručuje, že $\lambda < 0$. Proto celkově $\lambda \in (-\infty, -b]$. Toto číslo spočteme z vazební podmínky. Máme

$$\begin{aligned} L &= \int_{-b}^b \sqrt{1+y_0'^2} \, dx = \int_{-b}^b \sqrt{1 + \frac{\left(-\frac{1}{\lambda}x\right)^2}{1 - \left(-\frac{1}{\lambda}x\right)^2}} \, dx = \int_{-b}^b \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{\lambda^2}}} \\ &= \left[\lambda \arcsin\left(\frac{x}{\lambda}\right) \right]_{-b}^b = 2\lambda \arcsin\left(\frac{b}{\lambda}\right). \end{aligned}$$

Zde vystupující funkce $\psi: \lambda \mapsto 2\lambda \arcsin\left(\frac{b}{\lambda}\right)$ spojitě a ryze monotonně zobrazuje interval $(-\infty, -b]$ na $(2b, \pi b]$ (při ověření položíme $\frac{b}{\lambda} = -\sin z$, čímž přejdeme k funkci $z \mapsto 2b \frac{z}{\sin z}$ na $(0, \frac{\pi}{2})$ a pro tu máme $\left(\frac{z}{\sin z}\right)' = \frac{\sin z - z \cos z}{\sin^2 z} > 0$, kde jsme využili $\sin 0 - 0 \cdot \cos 0 = 0$ a $(\sin z - z \cos z)' = z \sin z > 0$).

Pokud $b \in [0, \frac{L}{\pi})$, extrémála neexistuje. Případ $b > \frac{L}{2}$ postrádá smysl. V případě $b = \frac{L}{2}$ jsme dostali nezajímavý výsledek s nulovou plochou. Pro $b \in [\frac{L}{\pi}, \frac{L}{2})$ máme jednoznačně určené λ a jemu odpovídající extrémálu.

Ukažme si, že se jedná o globální minimum (při pevně zvolených L a b). Uvažme pomocný funkcionál

$$H(y) = \int_{-b}^b h(x, y, y') dx := \int_{-b}^b (y - \lambda \sqrt{1 + y'^2}) dx - L,$$

kde konstanta λ je právě tou konstantou z intervalu $(-\infty, -b]$, kterou nám dala metoda Lagrangeových multiplikátorů. Pak y_0 je extrémou funkcionálu H a navíc

$$h_{yy} = 0, \quad h_{zz} = -\lambda \frac{1}{(1 + z^2)^{\frac{3}{2}}} > 0 \quad \text{a} \quad h_{yy}h_{zz} - h_{yz}^2 = 0 - 0^2 = 0.$$

Díky tomu je h konvexní v poslední dvojici proměnných, a proto funkcionál H nabývá v bodě y_0 globálního minima. Navíc funkcionály F a H mají shodné hodnoty na množině, kde $\int_{-b}^b \sqrt{1 + y'^2} dx = L$. Proto je y_0 globálním minimem také pro úlohu s vázaným extrémem funkcionálu F .

Zkusme ještě mezi $b \in [\frac{L}{\pi}, \frac{L}{2})$ najít nejvýhodnější volbu. Nejprve ukážeme, že

$$F(y_0) = \int_{-b}^b (-\sqrt{\lambda^2 - x^2} + \sqrt{\lambda^2 - b^2}) dx = b\sqrt{\lambda^2 - b^2} + \lambda^2 \arcsin\left(\frac{b}{\lambda}\right).$$

To plyne z $\int_{-b}^b \sqrt{\lambda^2 - x^2} dx = 2b\sqrt{\lambda^2 - b^2}$ a výpočtu (píšeme $x = -\lambda \sin t$)

$$\begin{aligned} \int_{-b}^b -\sqrt{\lambda^2 - x^2} dx &= -2 \int_0^{-\arcsin(\frac{b}{\lambda})} \lambda^2 \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt \\ &= -2 \int_0^{-\arcsin(\frac{b}{\lambda})} \lambda^2 \cos^2 t dt = - \int_0^{-\arcsin(\frac{b}{\lambda})} \lambda^2 (\cos(2t) + 1) dt \\ &= -\lambda^2 \left[\frac{\sin(2t)}{2} + t \right]_0^{-\arcsin(\frac{b}{\lambda})} = -\lambda^2 \left[\sin t \cos t + t \right]_0^{-\arcsin(\frac{b}{\lambda})} \\ &= -\lambda^2 \left[\sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} + t \right]_0^{-\arcsin(\frac{b}{\lambda})} = \lambda^2 \left(\frac{b}{\lambda} \sqrt{1 - \frac{b^2}{\lambda^2}} + \arcsin\left(\frac{b}{\lambda}\right) \right) \\ &= -b\sqrt{\lambda^2 - b^2} + \lambda^2 \arcsin\left(\frac{b}{\lambda}\right). \end{aligned}$$

Pokud nyní použijeme vztah $L = 2\lambda \arcsin(\frac{b}{\lambda})$ (neboli $b = \lambda \sin(\frac{L}{2\lambda})$), dostáváme pro $\lambda \in (-\infty, \frac{-L}{\pi}]$ (připomeňme, že $b \in [\frac{L}{\pi}, \frac{L}{2})$ a $\lambda \in (-\infty, -b]$)

$$\begin{aligned} F(y_0) &= \lambda \sin\left(\frac{L}{2\lambda}\right) \sqrt{\lambda^2 - \lambda^2 \sin^2\left(\frac{L}{2\lambda}\right)} + \frac{\lambda L}{2} = -\lambda^2 \sin\left(\frac{L}{2\lambda}\right) \cos\left(\frac{L}{2\lambda}\right) + \frac{\lambda L}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(-\lambda^2 \sin\left(\frac{L}{\lambda}\right) + \lambda L \right). \end{aligned}$$

Položme $\lambda = -tL$. Pak vyšetřujeme

$$F(y_0) = -\frac{1}{2} L^2 \left(-t^2 \sin\left(\frac{1}{t}\right) + t \right) \quad \text{pro } t \in \left[\frac{1}{\pi}, \infty\right).$$

V dalším ukážeme, že funkce $\psi(t) = t - t^2 \sin\left(\frac{1}{t}\right)$ uvažovaná na intervalu $\left[\frac{1}{\pi}, \infty\right)$ má maximum v bodě $\frac{1}{\pi}$. K tomu stačí ukázat, že

$$\psi'(t) = 1 - 2t \sin\left(\frac{1}{t}\right) + \cos\left(\frac{1}{t}\right) < 0 \quad \text{pro } t \in \left(\frac{1}{\pi}, \infty\right).$$

To je ekvivalentní výroku (pokládáme $\frac{1}{t} = 2s$)

$$0 > 1 - \frac{\sin(2s)}{s} + \cos(2s) = 2 \cos^2 s - \frac{2 \sin s \cos s}{s} = 2 \cos s \left(\cos s - \frac{\sin s}{s} \right)$$

pro $s \in (0, \frac{\pi}{2})$. Stačí tedy ukázat, že $\eta(s) := s \cos s - \sin s < 0$ na $(0, \frac{\pi}{2})$. To plyne z $\eta(0) = 0$ a $\eta'(s) = -s \sin s$.

Celkově jsme ukázali, že z námi uvažovaných případů největší plochu získáme volbou $\lambda = -\frac{L}{\pi}$. Tomu odpovídá

$$b = \lambda \sin\left(\frac{L}{2\lambda}\right) = -\frac{L}{\pi} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{L}{\pi} = -\lambda$$

a funkce

$$y_0(x) = -\sqrt{\lambda^2 - x^2} + \sqrt{\lambda^2 - b^2} = \sqrt{b^2 - x^2}.$$

Geometricky se jedná o půlkružnici.

13.4.3 Úloha o minimální radiálně symetrické ploše

Nechť $a < b$ a $A, B \geq 0$. Hledáme funkci $y \in C^1([a, b])$ takovou, že $y(a) = A$, $y(b) = B$ a plocha získaná rotací grafu funkce y kolem x -ové osy je minimální. To odpovídá hledání minima funkcionalu

$$F(y) = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + y'^2} \, dx.$$

V tomto typu úloh bývá zvykem uvažovat také degenerovanou plochu tvořenou dvěma kruhy s poloměry A a B , středy v bodech $(a, 0)$ a $(b, 0)$ a ležící v rovinách kolmých k x -ové ose. V tomto případě je celkový povrch roven $\pi(A^2 + B^2)$ a zřejmě není možné dosáhnout lepšího výsledku pomocí žádné funkce, která nabývá nulové hodnoty. Proto se zabývejme hledáním kladných extrémů, tedy případem

$$A > 0, \quad B > 0 \quad \text{a} \quad F(y) = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} \, dx,$$

kde $y > 0$ na $[a, b]$. Rádi bychom použili Tvrzení o nutné podmínce řešení Euler-Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvrzení 13.3.11). Zkusme aplikovat Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6). Klíčová je podmínka

$$0 \neq f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y'_0(x_0)) = \frac{y(x_0)}{(1 + y'^2(x_0))^{\frac{3}{2}}}.$$

Ta je díky úvahám uvedeným výše splněna všude na (a, b) . Proto hledané extrémaly splňují

$$C \equiv f(y_0, y'_0) - y'_0 f_z(y_0, y'_0) = y_0 \sqrt{1 + y_0'^2} - y_0 \frac{y_0'^2}{\sqrt{1 + y_0'^2}} = y_0 \frac{1}{\sqrt{1 + y_0'^2}}.$$

Zřejmě musí být $C > 0$ a máme

$$1 + y_0'^2 = \left(\frac{y_0}{C}\right)^2.$$

Odtud

$$y_0' = \pm \sqrt{\left(\frac{y_0}{C}\right)^2 - 1},$$

což je rovnice se separovanými proměnnými. Tu řeší jednak $y_0 \equiv C$. Nicméně konstanty neřeší Euler–Lagrangeovu rovnici

$$0 = f_y - (f_z)' = \sqrt{1 + y_0'^2} - \left(\frac{y_0 y_0'}{\sqrt{1 + y_0'^2}}\right)'$$

Standardním postupem získáme ještě řešení

$$C \operatorname{sign}(y_0) \operatorname{argcosh}\left(\frac{|y_0|}{C}\right) = \int \frac{dy_0}{\sqrt{\left(\frac{y_0}{C}\right)^2 - 1}} = \pm \int 1 dx = \pm x + D.$$

Celkově dostáváme

$$y_0 = \pm C \cosh\left(\frac{\pm x + D}{C}\right).$$

Díky skutečnosti, že hledáme lokální minimum, a sudosti funkce \cosh stačí uvažovat jen $(D \in \mathbb{R}$ je obecné)

$$y_0 = C \cosh\left(\frac{x + D}{C}\right).$$

Tyto funkce Euler–Lagrangeovu rovnici řeší, neboť s využitím výše získané identity $y_0 \frac{1}{\sqrt{1 + y_0'^2}} = C$ pro ně máme

$$\begin{aligned} f_y - (f_z)' &= \sqrt{1 + y_0'^2} - \left(\frac{y_0 y_0'}{\sqrt{1 + y_0'^2}}\right)' = \frac{y_0}{C} - \left(\frac{y_0 y_0'}{C}\right)' \\ &= \frac{y_0}{C} - (C y_0')' = \cosh\left(\frac{x + D}{C}\right) - \cosh\left(\frac{x + D}{C}\right) = 0. \end{aligned}$$

Parametry C, D jsou určeny okrajovými podmínkami (ovšem nikoliv jednoznačně). Dá se nahlédnout, že v určitých situacích je získaný výsledek horší než výše zmíněný obsah dvou kruhů.

Poznámka 13.4.1. Pokud bychom chtěli aplikovat Jacobiho větu (Věta 13.3.19), měli bychom (nejprve vše zjednodušíme s využitím vztahu $\sqrt{1 + y_0'^2} = \frac{y_0}{C}$)

$$P = f_{zz}(x, y_0, y_0') = \frac{y_0}{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{C^3}{y_0^2} > 0$$

a

$$\begin{aligned} Q &= f_{yy}(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx}(f_{yz}(x, y_0(x), y_0'(x))) \\ &= 0 - \frac{d}{dx} \frac{y_0'}{(1 + y_0'^2)^{\frac{1}{2}}} = -\frac{d}{dx} \frac{C y_0'}{y_0}. \end{aligned}$$

Jacobiho rovnice má tvar

$$0 = (Ph')' - Qh = Ph'' + P'h' - Qh = \frac{C^3}{y_0^2} h'' - \frac{2C^3 y_0'}{y_0^3} h' + \frac{C y_0'' y_0 - C y_0'^2}{y_0^2} h.$$

To je ekvivalentní rovnici

$$\begin{aligned} 0 &= h'' - 2 \frac{y_0'}{y_0} h' + \frac{y_0'' y_0 - y_0'^2}{C^2} h \\ &= h'' - 2 \frac{\sinh(\frac{x+D}{C})}{C \cosh(\frac{x+D}{C})} h' + \frac{\cosh^2(\frac{x+D}{C}) - \sinh^2(\frac{x+D}{C})}{C^2} h \\ &= h'' - 2 \frac{\sinh(\frac{x+D}{C})}{C \cosh(\frac{x+D}{C})} h' + \frac{1}{C^2} h. \end{aligned}$$

Uvedenou rovnici řeší $h_1 = \sinh(\frac{x+D}{C})$ (získáno uhodnutím). Díky vlastnostem wronskiánu můžeme získat i druhé řešení předpisem

$$\begin{aligned} h_2(x) &= h_1(x) \int_0^x \frac{1}{h_1^2(t)} e^{2 \int_{-D}^t \frac{\sinh(\frac{s+D}{C})}{C \cosh(\frac{s+D}{C})} ds} dt \\ &= h_1(x) \int_0^x \frac{1}{h_1^2(t)} e^{2[\log(\cosh(\frac{s+D}{C}))]_{-D}^t} dt \\ &= \sinh\left(\frac{x+D}{C}\right) \int_0^x \frac{\cosh^2(\frac{t+D}{C})}{\sinh^2(\frac{t+D}{C})} dt \\ &= \sinh\left(\frac{x+D}{C}\right) \int_0^x 1 + \frac{1}{\sinh^2(\frac{t+D}{C})} dt \\ &= \sinh\left(\frac{x+D}{C}\right) \left(x - C \frac{\cosh(\frac{x+D}{C})}{\sinh(\frac{x+D}{C})} + C \frac{\cosh(\frac{D}{C})}{\sinh(\frac{D}{C})} \right) \\ &= \left(x + C \frac{\cosh(\frac{D}{C})}{\sinh(\frac{D}{C})} \right) \sinh\left(\frac{x+D}{C}\right) - C \cosh\left(\frac{x+D}{C}\right). \end{aligned}$$

Obecným řešením Jacobiho rovnice proto je

$$h(x) = \alpha \sinh\left(\frac{x+D}{C}\right) + \beta x \sinh\left(\frac{x+D}{C}\right) - C\beta \cosh\left(\frac{x+D}{C}\right),$$

kde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Podrobné studium chování získaných funkcí je komplikované a nebudeme ho provádět.

13.4.4 Úloha o zavěšeném řetězu

Budeme se zabývat úlohou, kterou formuloval Galileo roku 1638. Máme najít tvar velice tenkého těžkého neroztažitelného řetězu upevněného na svých koncích. Řešení našli nezávisle na sobě Jacob a Johann Bernoulliové, Huygens a Leibniz v letech 1690 až 1692.

Nechť $a < b$ a řetěz je upevněn v bodech (a, A) a (b, B) . Předpokládejme, že řetěz je geometricky reprezentován grafem funkce $y \in C^1([a, b])$. Potenciální energie je popsána funkcí

$$F(y) = \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

zatímco neroztažitelnost řetězu vede k vazební podmínce

$$G(y) := \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx = L.$$

Předpokládejme, že $L > \sqrt{(b-a)^2 + (B-A)^2}$. V případě opačné nerovnosti by řešení samozřejmě neexistovalo, v případě rovnosti by jediné možné zavěšení (a tudíž optimální) bylo popsáno afinní funkcí. Tvar řetězu v rovnovážné poloze bude popsán minimizérem funkcionálu F na množině $C^1([a, b])$ s dodatečnými podmínkami

$$G(y) = L, \quad y(a) = A \quad \text{a} \quad y(b) = B.$$

Použijme Větu o Lagrangeových multiplikatorech (Věta 13.3.24). Protože $(\Psi$ se opět získá z G jako Φ z F)

$$\delta\Psi(y; h) = \int_a^b (g_y(x, y, y')h + g_z(x, y, y')h') dx = \int_a^b \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} h' dx,$$

podmínka o netriviálnosti $h \mapsto \delta\Psi(y_0; h)$ může být podle du Bois-Reymonda lemmatu (Lemma 13.3.2) porušena jen pokud

$$\frac{y'_0}{\sqrt{1 + y_0'^2}} \equiv C \quad \text{na } [a, b].$$

Ukažme, že uvedenou rovnici řeší jen afinní funkce. Máme

$$\frac{y_0'^2}{1 + y_0'^2} = C^2 \quad \iff \quad y_0'^2 = C^2(1 + y_0'^2).$$

Pro $|C| \geq 1$ rovnice nemá řešení, pro ostatní případy dostáváme $y' \equiv \frac{|C|}{\sqrt{1-C^2}}$. Zbylé extremály získáme z Euler–Lagrangeovy rovnice pro funkcionál $F - \lambda G$.

Zabývejme se nejprve případem extrémál z $C^2([a, b])$. Pro ně můžeme použít Tvzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvzení 13.3.11) a dostáváme

$$\begin{aligned} C &\equiv f(y_0, y'_0) - y'_0 f_z(y_0, y'_0) - \lambda \left(g(y_0, y'_0) - y'_0 g_z(y_0, y'_0) \right) \\ &\equiv y_0 \sqrt{1 + y'_0{}^2} - y_0 \frac{y'_0{}^2}{\sqrt{1 + y'_0{}^2}} - \lambda \left(\sqrt{1 + y'_0{}^2} - \frac{y'_0{}^2}{\sqrt{1 + y'_0{}^2}} \right) \\ &\equiv (y_0 - \lambda) \frac{1}{\sqrt{1 + y'_0{}^2}}. \end{aligned}$$

Pro $C = 0$ tuto rovnici řeší konstantní funkce $y_0 \equiv \lambda$. V opačném případě máme

$$1 + y'_0{}^2 = \left(\frac{y_0 - \lambda}{C} \right)^2.$$

Odtud

$$y'_0 = \pm \sqrt{\left(\frac{y_0 - \lambda}{C} \right)^2 - 1},$$

což je rovnice se separovanými proměnnými (konstantní řešení jsme již odhalili a dále se o ně nestaráme) a tu vyřešíme standardním postupem

$$C \operatorname{sign}\left(\frac{y_0 - \lambda}{C}\right) \operatorname{argcosh}\left(\left|\frac{y_0 - \lambda}{C}\right|\right) = \int \frac{dy_0}{\sqrt{\left(\frac{y_0 - \lambda}{C}\right)^2 - 1}} = \pm \int 1 \, dx = \pm x + D.$$

Proto

$$y_0 = \lambda \pm C \cosh\left(\frac{\pm x + D}{C}\right).$$

Dále vzhledem k povaze úlohy vybíráme jen případ, kdy je řetěz prověřen dolů

$$y_0 = \lambda + C \cosh\left(\frac{\pm x + D}{C}\right),$$

což ještě díky sudosti funkce \cosh a skutečnosti, že $D \in \mathbb{R}$ je obecné, můžeme zjednodušit na

$$y_0 = \lambda + C \cosh\left(\frac{x + D}{C}\right). \quad (13.4.1)$$

Řešení, která nejsou z $C^2([a, b])$, musí alespoň splňovat Větu o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6). Klíčová je podmínka

$$\begin{aligned} 0 \neq f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y'_0(x_0)) - \lambda g_{zz}(x_0, y_0(x_0), y'_0(x_0)) &= \frac{y_0}{(1 + y'_0{}^2)^{\frac{3}{2}}} - \lambda \frac{1}{(1 + y'_0{}^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{y_0 - \lambda}{(1 + y'_0{}^2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

Nekonstantní řešení, které by tuto podmínku v nějakém bodě nesplňovalo, existovat nemůže. Skutečně, takové řešení by díky nekonstantnosti mělo v definičním

oboru bod, kde $y_0 \neq \lambda$. Pak by na okolí tohoto bodu mělo tvar popsaný v (13.4.1). Uvedená funkce nikdy nenabývá hodnoty λ a její definiční obor je možné postupně prodloužit na $[a, b]$. Konstantní řešení naopak nesplňuje Euler–Lagrangeovu rovnici funkcionálu $F - \lambda G$, která má tvar

$$0 = f_y - \lambda g_y - (f_z - \lambda g_z)' = \sqrt{1 + y_0'^2} - \left(\frac{(y_0 - \lambda)y_0'}{\sqrt{1 + y_0'^2}} \right)'$$

Celkově máme, že lokálního minima se může nabývat prostřednictvím afinní funkce, která je ale vyloučena díky podmínce na délku řetězu (toto řešení nevzešlo z právě připomenuté Euler–Lagrangeovy rovnice, nýbrž z případu $\delta G(y_0) \equiv 0$) a pro funkce tvaru popsaného v (13.4.1), kde se λ, C, D určí ze vstupních dat. Více informací nám naše teorie nenabízí.

Poznámka 13.4.2. I v případě úlohy o zavěšeném řetězu se dají další informace získat studiem chování pomocného funkcionálu $F - \lambda G$, jak jsme činili při řešení problému princezny Dido. Tentokrát se dá nahlédnout, že pro pomocný funkcionál není funkce $f - \lambda g$ konvexní v poslední dvojici proměnných. Na druhou stranu, v případě extrémál tvaru

$$y_0 = \lambda + C \cosh\left(\frac{x+D}{C}\right)$$

se můžeme pokusit aplikovat Jacobiho větu (Věta 13.3.19). Využijeme vztah

$$\sqrt{1 + y_0'^2} = \frac{y_0 - \lambda}{C},$$

který jsme získali při hledání extrémál, a dostáváme

$$\begin{aligned} P &= f_{zz}(x, y_0, y_0') - \lambda g_{zz}(x, y_0, y_0') = \frac{y_0}{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{\lambda}{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{y_0 - \lambda}{\left(\frac{y_0 - \lambda}{C}\right)^3} = \frac{C^3}{(y_0 - \lambda)^2} = \frac{C}{\cosh^2\left(\frac{x+D}{C}\right)} > 0 \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} Q &= f_{yy}(x, y_0, y_0') - \lambda g_{yy}(x, y_0, y_0') - \frac{d}{dx} \left(f_{yz}(x, y_0, y_0') - \lambda g_{yz}(x, y_0, y_0') \right) \\ &= 0 - \frac{d}{dx} \left(\frac{y_0'}{(1 + y_0'^2)^{\frac{1}{2}}} \right) = - \frac{d}{dx} \left(\frac{C y_0'}{y_0 - \lambda} \right) = - \frac{C y_0''(y_0 - \lambda) - C y_0'^2}{(y_0 - \lambda)^2} \\ &= - \frac{C \cosh^2\left(\frac{x+D}{C}\right) - C \sinh^2\left(\frac{x+D}{C}\right)}{C^2 \cosh^2\left(\frac{x+D}{C}\right)} = - \frac{1}{C \cosh^2\left(\frac{x+D}{C}\right)}. \end{aligned}$$

Jacobiho rovnice má tvar

$$\begin{aligned} 0 &= (Ph')' - Qh = Ph'' + P'h' - Qh \\ &= \frac{C}{\cosh^2\left(\frac{x+D}{C}\right)} h'' - 2 \frac{\sinh\left(\frac{x+D}{C}\right)}{\cosh^3\left(\frac{x+D}{C}\right)} h' + \frac{1}{C \cosh^2\left(\frac{x+D}{C}\right)} h. \end{aligned}$$

To je ekvivalentní rovnici

$$0 = h'' - 2 \frac{\sinh(\frac{x+D}{C})}{C \cosh(\frac{x+D}{C})} h' + \frac{1}{C^2} h,$$

se kterou jsme se setkali při řešení úlohy o minimální radiální symetrické ploše (získanou diferenciální rovnici dokonce umíme vyřešit, problémy dělá až určení chování získaných řešení).

13.4.5 Úloha o brachystochroně

Roku 1638 Galileo formuloval problém nalezení křivky spojující dva body (a, A) , $(b, B) \in \mathbb{R}^2$, kde $a < b$ a $A > B$, po níž se hmotný bod přesune (bez tření) vlivem gravitace nejrychleji z bodu (a, A) do bodu (b, B) . Galileo mylně tvrdil, že řešením je část kružnice. Správné řešení našel Johann Bernoulli roku 1697. Minimalizovaný funkcionál zde má tvar (podrobné odvození je v Příkladu 13.1.1, multiplikativní konstantu vynecháváme)

$$F(y) = \int_a^b \sqrt{\frac{1+y'^2}{A-y}} dx.$$

Protože

$$f_{zz} = \frac{1}{\sqrt{A-y}} \frac{1}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}},$$

na (a, b) můžeme podle Věty o regularitě minimizéru (Věta 13.3.6) použít Tvrzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvrzení 13.3.11) a dostáváme

$$C \equiv f(y_0, y'_0) - y'_0 f_z(y_0, y'_0) = \frac{1}{\sqrt{A-y_0}} \sqrt{1+y_0'^2} - \frac{1}{\sqrt{A-y_0}} \frac{y_0'^2}{(1+y_0'^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

Odtud máme

$$C^2(1+y_0'^2)(A-y_0) = 1,$$

což dává

$$y_0'^2 = \frac{\frac{1}{C^2} - A + y_0}{A - y_0}.$$

Po odmocnění (zde je nutná značná opatrnost, neboť y nemusí být klesající) se sice bude jednat o rovnici se separovanými proměnnými, ale po případné integraci dostaneme řešení zadané implicitně pomocí příliš složitých formule. Ukažme si, jak se naleznou alespoň některé extrémály.

Budeme předpokládat, že řešením je parametricky zadaná funkce prostřednictvím rostoucí funkce $x \in C^1([0, T])$, kde $x(0) = a$, $x(T) = b$, $T \in (0, \pi]$, a

$$y(t) = A - k(1 - \cos(t - a))$$

(uvažujeme řešení splňující $y < A$ na $(a, b]$ a které je buď nerostoucí na $[a, b]$, nebo $[a, b]$ je rozdělené na dva podintervaly, kde řešení je nejprve nerostoucí a pak neklesající). V tomto případě máme

$$\left(\frac{k \sin(t-a)}{\frac{dx(t)}{dt}} \right)^2 = \left(\frac{\frac{dy(t)}{dt}}{\frac{dx(t)}{dt}} \right)^2 = y_0'^2 = \frac{\frac{1}{C^2} - A + y_0}{A - y_0} = \frac{\frac{1}{C^2} - k(1 - \cos(t-a))}{k(1 - \cos(t-a))}.$$

V případě, že $\frac{1}{C^2} = 2k$, dostáváme

$$\frac{k^2(1 - \cos^2(t-a))}{\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2} = \frac{1 + \cos(t-a)}{1 - \cos(t-a)}.$$

Odtud

$$\frac{dx(t)}{dt} = k(1 - \cos(t-a)) \quad \implies \quad x(t) = k((t-a) - \sin(t-a)) + A.$$

Parametry k, T navíc musí být takové, aby platilo $x(T) = b$ a $y(T) = B$. Získaná křivka (graf hledané funkce) se nazývá *cykloida*. Výsledná funkce splňuje Euler–Lagrangeovu rovnici. Skutečně, z důkazu Tvzení o nutné podmínce řešení Euler–Lagrangeovy rovnice pro autonomní úlohu (Tvzení 13.3.11) je vidět, že nutná podmínka je ekvivalentní Euler–Lagrangeově rovnici ve všech bodech, kde $y_0' \neq 0$. Brachystochrona má bod s nulovou derivací nejvýše jeden a i v něm je Euler–Lagrangeova rovnice splněna díky Větě o limitě derivací (Věta 6.3.9) a spojitosti funkcí vystupujících v Euler–Lagrangeově rovnici.

13.5 Aplikace variačního počtu v klasické mechanice

V dalším budeme pracovat v třírozměrném prostoru, přičemž t bude značit čas a $\{x_i\}_{i=1}^{3N}$ jsou polohy N hmotných bodů. Zde x_1, x_2, x_3 je poloha prvního hmotného bodu, x_4, x_5, x_6 poloha druhého hmotnému bodu atd. Předpokládáme, že $m_1 = m_2 = m_3, m_4 = m_5 = m_6$ atd. Dále tečka nad funkcí značí derivaci dané funkce podle času. Toto značení budeme ale kombinovat i se standardním značením časové derivace. Nejprve se podívejme na jeden výsledek, který je základním kamenem celé klasické mechaniky. Funkce L definovaná ve větě se v mechanice nazývá lagrangian.

Věta 13.5.1 (Lagrangeovy rovnice). *Pohyb systému N hmotných bodů v potenciálním poli $U = U(\{x_i\}_{i=1}^{3N})$ se shoduje s extrémami funkcionálu akce*

$$E(\{x_i\}_{i=1}^{3N}) = \int_{t_1}^{t_2} L(\{x_i\}_{i=1}^{3N}, \{\dot{x}_i\}_{i=1}^{3N}) dt,$$

kde $L = T - U$, $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{x}_i^2$ je kinetická energie a $U(\{x_i\}_{i=1}^{3N})$ je potenciální energie, přičemž $U \in C^2(\mathbb{R}^{3N})$. Pohyb je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu

$$\frac{d}{dt}(m_i \dot{x}_i) = -\frac{\partial U}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, 3N.$$

Důkaz. Lagrangián $L = L(\{x_i\}_{i=1}^{3N}, \{\dot{x}_i\}_{i=1}^{3N})$ je funkcí $6N$ proměnných, příslušný Gâteauxův diferenciál má tedy tvar

$$\delta E(\{x_i\}_{i=1}^{3N}; \{h_i\}_{i=1}^{3N}) = \sum_{i=1}^{3N} \int_{t_1}^{t_2} \left(-\frac{\partial U}{\partial x_i} h_i + m_i \dot{x}_i h_i \right) dt = 0,$$

kde $h_i \in C^1([t_1, t_2])$, $h_i(t_1) = h_i(t_2) = 0$, $i = 1, 2, \dots, 3N$. Použitím integrace per partes, podobně jako ve skalárním případě, dostáváme

$$\delta E(\{x_i\}_{i=1}^{3N}; \{h_i\}_{i=1}^{3N}) = \sum_{i=1}^{3N} \int_{t_1}^{t_2} \left(-\frac{\partial U}{\partial x_i} - \frac{d}{dt}(m_i \dot{x}_i) \right) h_i dt = 0.$$

Protože jednotlivé funkce h_i jsou nezávislé, dostáváme příslušný systém Euler–Lagrangeových rovnic

$$\frac{d}{dt}(m_i \dot{x}_i) = -\frac{\partial U}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, 3N.$$

□

Poznámka 13.5.2. Předpokládali jsme, že $U \in C^2(\mathbb{R}^{3N})$. Pokud navíc předpokládáme, že hmotnosti jsou konstanty nezávislé na pohybu, dostáváme, že $x_i \in C^2([t_1, t_2])$.

Poznámka 13.5.3. Obecně, má-li lagrangián tvar $L = L(t, \{q_i\}_{i=1}^{3N}, \{\dot{q}_i\}_{i=1}^{3N})$, kde q_i jsou zobecněné souřadnice bodů a \dot{q}_i zobecněné rychlosti, příslušný systém Euler–Lagrangeových rovnic (nazývaný v mechanice rovnicemi Lagrangeovými) má tvar

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, 3N.$$

Dostali jsme tedy Lagrangeovy rovnice klasické mechaniky. Nyní se pokusme dospět k rovnicím Hamiltonovým. Z matematického hlediska jde o přechod od $3N$ rovnic druhého řádu k $6N$ rovnicím prvního řádu pomocí Legendreovy transformace.

Představíme si nyní Legendreovu transformaci. Pro jednoduchost se nejprve omezme na skalární případ. Nechť funkce $f \in C^2(\mathbb{R})$ je ryze konvexní (tedy $f'' \geq 0$ a f' je rostoucí funkce). Potom Legendreova transformace je přechod od $f(x)$ k $g(p)$, kde

$$g(p) = px(p) - f(x(p)),$$

přičemž $x(p) = \operatorname{argmax}_x (px - f(x)) = \operatorname{argmax}_x F(x, p)$. Tedy $\frac{\partial F}{\partial x}(x, p) = 0$, což dává $p = f'(x)$.

Příklad 13.5.4. (i) Máme-li $f(x) = x^2$, pak je $F(x, p) = px - x^2$. Podmínka maxima dává $p - 2x(p) = 0$, tedy $x(p) = \frac{p}{2}$. Proto

$$g(p) = p \left(\frac{p}{2} \right) - \left(\frac{p}{2} \right)^2 = \frac{p^2}{4}.$$

(ii) Máme-li $f(x) = \frac{1}{2}mx^2$, kde $m > 0$, pak je $F(x, p) = px - \frac{mx^2}{2}$. Podmínka maxima dává $p - mx(p) = 0$, tedy $x(p) = \frac{p}{m}$. Proto

$$g(p) = p\left(\frac{p}{m}\right) - \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 = \frac{p^2}{2m}.$$

(iii) Máme-li $f(x) = \frac{x^\alpha}{\alpha}$, $\alpha > 1$, kde $x \in \mathbb{R}^+$, pak je $F(x, p) = px - \frac{x^\alpha}{\alpha}$. Podmínka maxima dává $p - x^{\alpha-1}(p) = 0$, tedy $x(p) = p^{\frac{1}{\alpha-1}}$. Proto

$$g(p) = pp^{\frac{1}{\alpha-1}} - \frac{p^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}{\alpha} = p^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{p^\beta}{\beta},$$

kde $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$.

Platí

Lemma 13.5.5. *Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f'' > 0$ na \mathbb{R} . Potom její Legendreova transformace je konvexní funkce na \mathbb{R} , přičemž dvakrát provedená Legendreova transformace na f je opět f .*

Důkaz. Protože $p = f'(x)$ a f' je na \mathbb{R} rostoucí, zřejmě je $x = x(p)$ dobře definováno. Počítejme

$$g'(p) = x(p) + p \frac{dx(p)}{dp} - f'(x(p)) \frac{dx(p)}{dp}.$$

Platí $p = f'(x)$, tedy $g'(p) = x(p)$; proto též $g''(p) = x'(p) = \frac{1}{f''(x)}|_{x=x(p)} > 0$ a $g(p)$ je tedy konvexní funkce. Vzhledem k symetrii ($g'(p) = x(p)$, $f'(x(p)) = p$) nás znovu provedená Legendreova transformace přivádí zpět k funkci $f(x)$. \square

Nyní se podívejme na vektorový případ, tedy $f: \mathbb{R}^N \mapsto \mathbb{R}$, $f \in C^2(\mathbb{R}^N)$, konvexní (pro jednoduchost $d^2f(\vec{x}; \vec{h}, \vec{h}) > 0$ pro všechna $\vec{x} \in \mathbb{R}^N$, $\vec{h} \in \mathbb{R}^N$, $\vec{h} \neq 0$). Opět definujeme Legendreovu transformaci $f(\vec{x}) \mapsto g(\vec{p})$, přičemž $g(\vec{p}) = \vec{p} \cdot \vec{x}(\vec{p}) - f(\vec{x}(\vec{p}))$ a $\vec{x}(\vec{p}) = \operatorname{argmax}(\vec{p} \cdot \vec{x} - f(\vec{x}))$. Proto $\vec{p} = \nabla f(\vec{x})$ a $g(\vec{p}) = \max_{\vec{x}}(\vec{p} \cdot \vec{x} - f(\vec{x}))$.

Opět máme

Lemma 13.5.6. *Nechť $\sum_{i,j=1}^N \frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j$ je pozitivně definitní kvadratická forma pro všechna $\vec{x} \in \mathbb{R}^N$. Nechť $f \in C^2(\mathbb{R}^N)$. Potom její Legendreova transformace je konvexní funkce na \mathbb{R}^N , přičemž dvakrát provedená Legendreova transformace na f je opět f .*

Důkaz. Postupujeme stejně jako o skalárního případu. Protože $p_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x})$, je podmínka řešitelnosti této soustavy rovnic díky Globální verzi věty o inverzi (Věta 12.8.7) ekvivalentní tomu, že hessián f je regulární matice pro všechna $\vec{x} \in \mathbb{R}^N$. To je ale důsledkem předpokladu o pozitivní definitnosti příslušné kvadratické formy. Podobně jako ve skalárním případě máme

$$\frac{\partial g(\vec{p})}{\partial p_i} = x_i + \sum_{j=1}^N p_j \frac{\partial x_j(\vec{p})}{\partial p_i} - \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{x}(\vec{p})) \frac{\partial x_j(\vec{p})}{\partial p_i} = x_i.$$

Protože navíc pro $g(\vec{p}^i) = \vec{x}^i$, kde $i = 1, 2$, máme

$$0 \leq (\nabla f(\vec{x}^1) - \nabla f(\vec{x}^2)) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^2) = (\vec{p}^1 - \vec{p}^2) \cdot (\nabla g(\vec{p}^1) - \nabla g(\vec{p}^2)),$$

dle Lemmatu 13.3.25 je $g(\vec{p})$ konvexní. Stejně jako výše pak dostáváme, že druhá Legendreova transformace převádí \vec{p} na \vec{x} a $g(\vec{p})$ na $f(\vec{x})$. \square

Nyní tento postup aplikujeme na lagrangián, u kterého předpokládáme, že závisí na čase, zobecněných souřadnicích \vec{q} a zobecněných rychlostech $\dot{\vec{q}}$. Nechť tedy $L: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ je konvexní v posledních n proměnných, tedy v zobecněných rychlostech. Nechť

$$\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 L(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}})}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} h_i h_j > 0 \quad \forall \vec{h} \in \mathbb{R}^n, \quad \vec{h} \neq \vec{0}.$$

Předpokládejme, že funkce \vec{q} a $\dot{\vec{q}}$ řeší Lagrangeovy rovnice

$$-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) + \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Proveďme Legendreovu transformaci vzhledem k posledním n proměnným

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

a definujme (hamiltonián)

$$H(t, \vec{q}, \vec{p}) = \vec{p} \cdot \dot{\vec{q}} - L(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}}).$$

Pokud uvažujeme, že se pohybujeme po extrémále, tedy po řešení Lagrangeových rovnic, máme

$$\dot{p}_i = \frac{dp_i}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Dostáváme následující výsledek

Věta 13.5.7 (Hamiltonovy rovnice). *Za daných předpokladů, tedy pro $L(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}})$ třídy $C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, konvexní v posledních n proměnných, jsou Lagrangeovy rovnice ekvivalentní s Hamiltonovými rovnicemi*

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \\ \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}, \end{aligned}$$

kde $i = 1, 2, \dots, n$ a hamiltonián je dán předpisem

$$H(t, \vec{p}, \vec{q}) = \vec{p} \cdot \dot{\vec{q}} - L(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}}),$$

přičemž $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$.

Důkaz. „ \Rightarrow “ Necht' jsou splněny Lagrangeovy rovnice. Vezměme t a \vec{q} za parametry, položme

$$L(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \mathcal{L}_{t, \vec{q}}(\dot{\vec{q}})$$

a aplikujme Legendreovu transformaci

$$\mathcal{H}_{t, \vec{q}}(\vec{p}) = \max_{\dot{\vec{q}}} (\vec{p} \cdot \dot{\vec{q}} - \mathcal{L}_{t, \vec{q}}(\dot{\vec{q}})),$$

tedy

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}}).$$

Protože se pohybujeme podél řešení Lagrangeových rovnic

$$-\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

dostáváme

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Označme $H(t, \vec{q}, \vec{p}) = \mathcal{H}_{t, \vec{q}}(\vec{p}) = \max_{\dot{\vec{q}}} (\vec{p} \cdot \dot{\vec{q}} - \mathcal{L}_{t, \vec{q}}(\dot{\vec{q}}))$. Potom

$$\begin{aligned} \nabla H(t, \vec{q}, \vec{p}) &= \left(\frac{\partial H}{\partial t}, \frac{\partial H}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial q_n}, \frac{\partial H}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial p_n} \right) \\ &= \left(-\frac{\partial L}{\partial t}, -\frac{\partial L}{\partial q_1}, \dots, -\frac{\partial L}{\partial q_n}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n \right), \end{aligned}$$

neboť pro $\dot{\vec{q}} = \dot{\vec{q}}(\vec{p}, \vec{q})$ máme

$$\frac{\partial H}{\partial q_j} = \sum_{k=1}^n p_k \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial q_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} - \sum_{k=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial q_j} = -\frac{\partial L}{\partial q_j}$$

a

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = \dot{q}_j + \sum_{k=1}^n p_k \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial p_j} - \sum_{k=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial p_j} = \dot{q}_j.$$

Proto

$$\frac{\partial H}{\partial q_j} = -\frac{\partial L}{\partial q_j} = -\dot{p}_j, \quad \frac{\partial H}{\partial p_j} = \dot{q}_j,$$

$j = 1, 2, \dots, n$, platí tedy Hamiltonovy rovnice.

„ \Leftarrow “ Protože díky Lemmatu 13.5.6 druhá Legendreova transformace převádí hamiltonián na lagranián, proměnné \vec{p} na $\dot{\vec{q}}$, dostáváme pro $L(t, \vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \vec{p} \cdot \dot{\vec{q}} - H(t, \vec{q}, \vec{p})$, přičemž $\vec{p} = \vec{p}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$ a $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$. Proto

$$\begin{aligned} -\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial q_i} &= -\frac{d}{dt} \left(p_i + \sum_{j=1}^n \frac{\partial p_j}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial p_j}{\partial \dot{q}_i} \right) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \frac{\partial p_j}{\partial q_i} \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n \frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial p_j}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0, \end{aligned}$$

díky platnosti Hamiltonových rovnic. \square

Poznámka 13.5.8. (i) Platí

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t},$$

tedy pokud hamiltonián nezávisí explicitně na čase, platí zákon zachování hamiltoniánu. Totiž

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial H}{\partial p_k} \dot{p}_k + \sum_{k=1}^n \frac{\partial H}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial H}{\partial p_k} \left(-\frac{\partial H}{\partial q_k} \right) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial H}{\partial q_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}. \end{aligned}$$

(ii) Je-li $L = T - U$, kde $T = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(t, \vec{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j$ (kde bez újmy na obecnosti díky záměnnosti pořadí \dot{q}_i a \dot{q}_j předpokládáme symetrii $a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, \dots, n$) a $U = U(t, \vec{q})$, potom $H = T + U$. Platí totiž $H = \vec{p} \cdot \dot{\vec{q}} - L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$, kde $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$. Proto

$$\begin{aligned} H &= \sum_{k=1}^n \dot{q}_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - L = \sum_{k=1}^n \dot{q}_k \left(2 \sum_{l=1}^n a_{kl}(t, \vec{q}) \dot{q}_l \right) - L \\ &= 2T - (T - U) = T + U. \end{aligned}$$

Další informace a výsledky lze nalézt například v knize [Br CaVa] či učebnicích teoretické mechaniky, jako například [BrSaSo MeKo].

13.6 Dodatek: Spojitá závislost na datech a diferencovatelnost podle parametru řešení lineárních obyčejných diferenciálních rovnic

Cílem této části je prezentovat některé vybrané partie hlubší teorie obyčejných diferenciálních rovnic, které potřebujeme v této kapitole. Přestože je možné dokázat analogické výsledky pro mnohem obecnější typ rovnic, zůstaneme pouze u lineárních obyčejných diferenciálních rovnic, protože důkaz pro ně je obzvláště jednoduchý a přesně tyto výsledky nám stačí.

Začneme lemmatem, který zobecňuje naše odhady z důkazu Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu (Věta 8.5.1).

Lemma 13.6.1 (Gronwallova nerovnost). *Nechť $v: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ je diferencovatelná funkce na $[a, b]$, která pro každé $x \in [a, b]$ splňuje*

$$\frac{dv}{dx}(x) \leq h(x)v(x) + g(x) \quad (13.6.1)$$

pro jisté funkce $h, g \in C([a, b])$. Potom pro všechna $x \in [a, b]$ platí

$$v(x) \leq \left(v(a) + \int_a^x g(s) e^{-\int_a^s h(\tau) d\tau} ds \right) e^{\int_a^x h(s) ds}. \quad (13.6.2)$$

Důkaz. Vynásobme (13.6.1) výrazem $e^{-\int_a^x h(s) ds}$, který je dobře definovaný na $[a, b]$. Dostáváme

$$\frac{d}{dx} \left(v(x) e^{-\int_a^x h(s) ds} \right) \leq g(x) e^{-\int_a^x h(s) ds}.$$

Proto

$$v(x) e^{-\int_a^x h(s) ds} \leq v(a) + \int_a^x g(s) e^{-\int_a^s h(\tau) d\tau} ds,$$

což vede na

$$v(x) \leq v(a) e^{\int_a^x h(s) ds} + \left(\int_a^x g(s) e^{-\int_a^s h(\tau) d\tau} ds \right) e^{\int_a^x h(s) ds}.$$

□

V dalším si zformulujeme základní větu o existenci a jednoznačnosti pro systémy lineárních rovnic prvního řádu, která úzce souvisí s Větou o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu (Věta 8.5.1). V následujícím textu budeme eukleidovskou normu vektoru $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^n$ či matice $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ značit jako $|\mathbf{F}|$ a $|\mathbb{A}|$. Pro vektorové pole $\mathbf{F}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ používáme značení

$$\|\mathbf{F}\|_{C([a,b])} = \max_{x \in [a,b]} |\mathbf{F}(x)|.$$

Podobně pro zobrazení $\mathbb{A}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$.

Zformulujme nyní základní větu pro systémy rovnic prvního řádu přesně.

Věta 13.6.2 (Globální existence a jednoznačnost řešení systému prvního řádu). *Nechť $\mathbb{A}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{F}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ jsou z $C([a, b]; \mathbb{R}^{n \times n})$ resp. z $C([a, b]; \mathbb{R}^n)$ a $\mathbf{u}_0 \in \mathbb{R}^n$. Potom existuje právě jedna funkce $\mathbf{u} \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$ splňující*

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{u}}{dx}(x) &= \mathbb{A}(x)\mathbf{u}(x) + \mathbf{F}(x), \\ \mathbf{u}(a) &= \mathbf{u}_0, \end{aligned} \tag{13.6.3}$$

Navíc $\|\mathbf{u}\|_{C([a,b])} \leq C$, kde C závisí na datech úlohy, tedy na n , $b - a$, $\|\mathbb{A}\|_{C([a,b])}$, $\|\mathbf{F}\|_{C([a,b])}$ a $|\mathbf{u}_0|$.

Důkaz. Přestože hlavním výsledkem Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu (Věta 8.5.1) byla příslušná teorie pro skalární rovnici n -tého řádu, její důkaz probíhal tak, že jsme si nejprve rovnici n -tého řádu přepsali na systém rovnic prvního řádu, pro něj jsme tvrzení o globální existenci a jednoznačnosti dokázali (přičemž nehrála roli speciální struktura tohoto systému, která byla důsledkem přepisu rovnice n -tého řádu) a pak jsme se vrátili opět ke skalární rovnici n -tého řádu. Proto je důkaz naší věty jen lehce pozměněnou verzí důkazu Věty 8.5.1. Odhad $\|\mathbf{u}\|_{C([a,b])} \leq C$ získáme postupem z prvního kroku důkazu Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n -tého řádu (Věta 8.5.1). □

Lemma 13.6.3 (Spojitá závislost řešení ODR na datech úlohy). *Nechť $\mathbf{u}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ řeší systém lineárních ODR 1. řádu v $[a, b]$ (13.6.3), kde \mathbb{A} , \mathbf{F} a \mathbf{u}_0 splňují předpoklady Věty o globální existenci a jednoznačnosti řešení systému ODR 1. řádu (Věta 13.6.2). Potom \mathbf{u} závisí spojitě na datech úlohy, tedy na \mathbb{A} , \mathbf{F} a \mathbf{u}_0 . Přesněji, nechť \mathbf{u}^i řeší (13.6.3) s $\mathbb{A} = \mathbb{A}^i$, $\mathbf{F} = \mathbf{F}^i$ a $\mathbf{u}_0 = \mathbf{u}_0^i$, $i = 1, 2$. Pak existuje C závislé na datech úlohy tak, že*

$$\|\mathbf{u}^1 - \mathbf{u}^2\|_{C([a,b])} \leq C(\|\mathbb{A}^1 - \mathbb{A}^2\|_{C([a,b])} + \|\mathbf{F}^1 - \mathbf{F}^2\|_{C([a,b])} + |\mathbf{u}_0^1 - \mathbf{u}_0^2|). \quad (13.6.4)$$

Důkaz. Označme $\mathbf{v} = \mathbf{u}^1 - \mathbf{u}^2$ a předpokládejme, že \mathbf{v} je netriviální. Vektorová funkce \mathbf{v} splňuje pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} v_i(x) &= \sum_{j=1}^n A_{ij}^1(x) v_j(x) + \sum_{j=1}^n (A_{ij}^1(x) - A_{ij}^2(x)) u_j^2(x) + F_i^1(x) - F_i^2(x) \\ v_i(a) &= (u_0^1)_i - (u_0^2)_i. \end{aligned} \quad (13.6.5)$$

Povšimněme si, že díky jednoznačnosti řešení uvedené rovnice se \mathbf{v} nerovná nule nikde na $[a, b]$. Násobme i -tou rovnicí v (13.6.5) funkcí v_i . Po sečtení přes i máme díky Cauchy–Schwarzově nerovnosti (Věta 11.1.12)

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dx} |\mathbf{v}(x)|^2 \leq |\mathbb{A}^1(x)| |\mathbf{v}(x)|^2 + |\mathbb{A}^1(x) - \mathbb{A}^2(x)| |\mathbf{u}^2(x)| |\mathbf{v}(x)| + |\mathbf{F}^1(x) - \mathbf{F}^2(x)| |\mathbf{v}(x)|.$$

Proto

$$\frac{d}{dx} |\mathbf{v}(x)| \leq |\mathbb{A}^1(x)| |\mathbf{v}(x)| + |\mathbb{A}^1(x) - \mathbb{A}^2(x)| |\mathbf{u}^2(x)| + |\mathbf{F}^1(x) - \mathbf{F}^2(x)|.$$

Aplikací Gronwallovy nerovnosti (13.6.2) z Lemmatu 13.6.1 dostáváme

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}(x)| &\leq \left(|\mathbf{u}_0^1 - \mathbf{u}_0^2| \right. \\ &\left. + \int_a^x (|\mathbb{A}^1(s) - \mathbb{A}^2(s)| |\mathbf{u}^2(s)| + |\mathbf{F}^1(s) - \mathbf{F}^2(s)|) e^{-\int_a^s |\mathbb{A}^1(\tau)| d\tau} ds \right) e^{\int_a^x |\mathbb{A}^1(\tau)| d\tau}. \end{aligned}$$

Odtud již (13.6.4) plyne díky definici $\|\mathbf{v}\|_{C([a,b])}$ a díky tomu, že každé řešení (13.6.3) je omezené konstantou, která závisí jen na datech úlohy, což dává poslední část Věty o globální existenci a jednoznačnosti řešení systému prvního řádu (Věta 13.6.2). \square

Výsledek předchozího lemmatu lze jednoduše převést na lineární rovnici n -tého řádu.

Důsledek 13.6.4 (Spojitá závislost řešení ODR na datech úlohy II). *Nechť u řeší Cauchyovu úlohu pro rovnici n -tého řádu*

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i(x) u^{(i)}(x) &= f(x), \\ u^{(i)}(a) &= u_0^i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (13.6.6)$$

Nechť $a_i \in C([a, b])$, $i = 0, \dots, n$, $f \in C([a, b])$, $u_0^i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, n-1$ a $a_n \neq 0$ na $[a, b]$. Potom u závisí spojitě na datech úlohy. Přesněji, nechť u^1, u^2 jsou řešení úlohy (13.6.6) s daty a_i^1, f^1 a $(u_0^j)^1$, respektive a_i^2, f^2 a $(u_0^j)^2$, $i = 0, \dots, n$ a $j = 0, \dots, n-1$. Potom existuje konstanta C , závislá na a, b a na výše uvedených datech úlohy tak, že

$$\|u^1 - u^2\|_{C^{n-1}([a, b])} \leq C(\|f^1 - f^2\|_{C([a, b])} + \sum_{i=0}^n \|a_i^1 - a_i^2\|_{C([a, b])} + \sum_{j=0}^{n-1} |(u_0^1)^j - (u_0^2)^j|). \quad (13.6.7)$$

Důkaz. Protože každou úlohu typu (13.6.6) lze přepsat na úlohu typu (13.6.3), kde $\mathbb{A}(x)$ lze vyjádřit pomocí $a_i(x)$, $i = 0, \dots, n$, $\mathbf{F}(x)$ pomocí $f(x)$ a $a_n(x)$, \mathbf{u}_0 pomocí u_0^i , $i = 0, \dots, n-1$ a $v_i = u^{(i-1)}$, $i = 1, \dots, n$, plyne (13.6.7) z (13.6.4). \square

Na závěr si ukažme, že pokud data úlohy závisí na jistém reálném parametru μ , přičemž jsou podle tohoto parametru diferencovatelná, pak totéž platí i pro řešení. Nejprve si zavedme nový pojem. Budeme říkat, že funkce $G(x; \mu)$ je diferencovatelná dle μ v bodě μ_0 stejnoměrně vzhledem k $x \in [a, b]$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro každé $\mu \in \mathcal{P}_\delta(\mu_0)$ a $x \in [a, b]$ je

$$\left| \frac{G(x; \mu) - G(x; \mu_0)}{\mu - \mu_0} - \frac{\partial G}{\partial \mu}(x; \mu_0) \right| < \varepsilon.$$

Lemma 13.6.5 (Diferencovatelnost řešení ODR podle parametru I). *Nechť \mathbf{u} řeší (13.6.3), přičemž \mathbb{A} , \mathbf{F} a \mathbf{u}_0 závisí na parametru $\mu \in \mathbb{R}$ tak, že $x \mapsto \frac{\partial \mathbb{A}}{\partial \mu}(x; \mu)$, $x \mapsto \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mu}(x; \mu)$ jsou spojitě funkce na $[a, b]$, funkce $\mathbb{A}(x; \mu)$ a $\mathbf{F}(x; \mu)$ jsou diferencovatelné dle μ v bodě μ_0 stejnoměrně vzhledem k $x \in [a, b]$ a derivace $\frac{d\mathbf{u}_0}{d\mu}(\mu_0)$ existuje. Potom též \mathbf{u} je diferencovatelná dle μ v bodě μ_0 . Jsou-li data úlohy spojitě diferencovatelná dle μ na nějakém intervalu $I \subset \mathbb{R}$ (stejněměrně vzhledem k $x \in [a, b]$ pro \mathbb{A} a \mathbf{F}), pak též \mathbf{u} je spojitě diferencovatelná dle μ na tomto intervalu.*

Důkaz. Dokažme nejprve, že naše řešení je diferencovatelné dle μ v bodě μ_0 . Pro μ ležící v jistém okolí bodu μ_0 označme $\mathbf{u}(x; \mu)$ řešení odpovídající datům $\mathbb{A}(x; \mu)$, $\mathbf{F}(x; \mu)$ a $\mathbf{u}_0(x; \mu)$. Díky Lemmatu o spojitě závislosti řešení ODR na datech úlohy I (Lemma 13.6.3) víme, že $\mathbf{u}(x; \mu)$ je v bodě μ_0 spojitá dle parametru μ , protože data úlohy jsou v tomto bodě též spojitá dle μ . Dále pro μ ležící v jistém prstencovém okolí bodu μ_0 označme

$$\mathbf{h}(x; \mu) = \frac{\mathbf{u}(x; \mu) - \mathbf{u}(x; \mu_0)}{\mu - \mu_0} - \mathbf{w}(x),$$

kde $\mathbf{w}(x)$ řeší úlohu

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{w}(x)}{dx} &= \mathbb{A}(x; \mu_0)\mathbf{w}(x) + \frac{\partial \mathbb{A}}{\partial \mu}(x; \mu_0)\mathbf{u}(x; \mu_0) + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mu}(x; \mu_0) \\ \mathbf{w}(a) &= \frac{d\mathbf{u}_0}{d\mu}(\mu_0). \end{aligned}$$

Toto řešení zjevně existuje a je jednoznačné, díky předpokladům lemmatu a Větě o globální existenci a jednoznačnosti řešení systému prvního řádu (Věta 13.6.2). Potom naše funkce $\mathbf{h}(\mathbf{x}; \mu)$ řeší pro $\mu \in \mathcal{P}_\delta(\mu_0)$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{h}}{dx}(x; \mu) &= \frac{\mathbb{A}(x; \mu) - \mathbb{A}(x; \mu_0)}{\mu - \mu_0} \mathbf{u}(x; \mu) - \frac{\partial \mathbb{A}}{\partial \mu}(x; \mu_0) \mathbf{u}(x; \mu_0) \\ &\quad + \mathbb{A}(x; \mu_0) \mathbf{h}(x; \mu) + \frac{\mathbf{F}(x; \mu) - \mathbf{F}(x; \mu_0)}{\mu - \mu_0} - \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mu}(x; \mu_0), \quad (13.6.8) \\ \mathbf{h}(a; \mu) &= \frac{\mathbf{u}_0(\mu) - \mathbf{u}_0(\mu_0)}{\mu - \mu_0} - \frac{d\mathbf{u}_0}{d\mu}(\mu_0). \end{aligned}$$

Použitím analogických úvah jako v Lemmatu o spojitě závislosti integrálu na parametru I (Lemma 13.6.3) dokážeme, že $\mathbf{h}(x; \mu)$ lze spojitě dodefinovat v bodě $\mu = \mu_0$, což by nám mohlo stačit, pokud by nás zajímala jen otázka existence derivace, neboť zřejmě

$$\mathbf{H}(x; \mu_0) := \lim_{\mu \rightarrow \mu_0} \mathbf{h}(x; \mu) = \frac{\partial \mathbf{u}(x; \mu_0)}{\partial \mu} - \mathbf{w}(x).$$

Ukažme ještě, že $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mu}(x; \mu_0) = \mathbf{w}(x)$, což budeme potřebovat k důkazu spojitosti derivace dle μ na $[a, b]$. Protože pravou stranu rovnice (13.6.8) lze spojitě dodefinovat v bodě $\mu = \mu_0$, totéž platí i pro $\frac{d\mathbf{h}}{dx}(x; \mu)$. Pokud bychom věděli, že můžeme prohodit derivaci a příslušnou limitu, dostáváme díky limitnímu přechodu na pravé straně rovnice (13.6.8), že

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{H}}{dx}(x) &= \mathbb{A}(x; \mu_0) \mathbf{H}(x) \\ \mathbf{H}(a) &= \mathbf{0}. \end{aligned} \quad (13.6.9)$$

Díky Větě o globální existenci a jednoznačnosti řešení systému prvního řádu (Věta 13.6.2) je řešení (13.6.9) jednoznačné, a proto nulové. Odsud dostáváme, že

$$\frac{\partial \mathbf{u}(x; \mu_0)}{\partial \mu} = \mathbf{w}(x).$$

Prohození limit respektive limity a integrálu lze zdůvodnit následovně. Přepišme soustavu diferenciálních rovnic na soustavu integrálních rovnic, podobně, jak jsme to dělali v důkazu Picard–Lindelöfovy existenční věty (Věty 11.11.1). Označme pravou stranu rovnice (13.6.8) jako $\mathbf{G}(x; \mu)$ a počáteční podmínku jako \mathbf{h}_0 . Dostáváme tedy

$$\mathbf{h}(x; \mu) = \mathbf{h}_0(\mu) + (\mathcal{R}) \int_a^x \mathbf{G}(s; \mu) ds.$$

Protože víme, že \mathbf{h} lze spojitě dodefinovat v bodě $\mu = \mu_0$, totéž platí o funkci $\mathbf{G}(x; \mu)$. Potřebujeme tedy dokázat, že můžeme prohodit limitu pro μ jdoucí k μ_0 a integrál. To vyžaduje stejnoměrnou limitu vzhledem k x , tedy to, že příslušná volba δ (velikost okolí μ_0) v definici limity, která závisí na volbě ε a také na obecně $x \in [a, b]$, ve skutečnosti na x nezávisí. Z tvaru pravé strany \mathbf{G} plyne,

že toto bude splněno, pokud příslušná volba δ v definici derivace \mathbb{A} a \mathbf{F} podle μ nezávisí na x , neboť z (13.6.4) plyne, že totéž platí jak pro $\mathbf{h}(x; \mu)$ tak i pro $\mathbf{u}(x; \mu)$. Potom zakončení důkazu první části plyne z Lemmatu o stejnoměrné spojitosti a integrálu (Lemma 13.6.6 níže). Spojitost derivace řešení podle parametru je potom důsledkem Lemmatu o spojitě závislosti řešení ODR na datech úlohu (Lemma 13.6.3) aplikované na formálně zderivovanou příslušnou rovnici dle parametru μ a důkaz je hotov. \square

Lemma 13.6.6 (Stejnomořná spojitost a integrál). *Nechť $\lim_{\mu \rightarrow \mu_0} \mathbf{G}(x; \mu) = \mathbf{G}(x; \mu_0)$ je stejnoměrná vůči $x \in [a, b]$, tedy pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta = \delta(\varepsilon)$ tak, že pro každé $x \in [a, b]$, $\mu \in \mathcal{U}_\delta(\mu_0)$ je $|\mathbf{G}(x; \mu) - \mathbf{G}(x; \mu_0)| \leq \varepsilon$. Nechť funkce $x \mapsto \mathbf{G}(x; \mu)$ je spojitá na $[a, b]$ pro všechna μ z $\mathcal{U}_\Delta(\mu_0)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Potom*

$$\lim_{\mu \rightarrow \mu_0} (\mathcal{R}) \int_a^b \mathbf{G}(x; \mu) dx = (\mathcal{R}) \int_a^b \mathbf{G}(x; \mu_0) dx.$$

Důkaz. Protože $x \mapsto \mathbf{G}(x; \mu)$ je spojitá na $\mathcal{U}_\Delta(\mu_0)$, výrazy nalevo i napravo výše mají smysl. Dále $\lim_{\mu \rightarrow \mu_0} \mathbf{G}(x; \mu) = \mathbf{G}(x; \mu_0)$ stejnoměrně vzhledem k x . Zvolme $\varepsilon_0 > 0$. Potom díky předpokladu o stejnoměrnosti $\lim_{\mu \rightarrow \mu_0} \mathbf{G}(x; \mu)$ existuje $0 < \delta_0 \leq \Delta$ tak, že pro každé $x \in [a, b]$ a pro každé $\mu \in \mathcal{U}_{\delta_0}(\mu_0)$ je $|\mathbf{G}(x; \mu) - \mathbf{G}(x; \mu_0)| < \frac{\varepsilon_0}{b-a}$. Proto pro taková μ máme

$$\begin{aligned} \left| (\mathcal{R}) \int_a^b (\mathbf{G}(x; \mu) - \mathbf{G}(x; \mu_0)) dx \right| &\leq (\mathcal{R}) \int_a^b |\mathbf{G}(x; \mu) - \mathbf{G}(x; \mu_0)| dx \\ &< \frac{\varepsilon_0(b-a)}{b-a} = \varepsilon_0, \end{aligned}$$

odkud plyne tvrzení lemmatu. \square

Poznámka 13.6.7. Poznamenejme ještě, že stačilo předpokládat, že $x \mapsto \mathbf{G}(x; \mu)$ je spojitá na $[a, b]$ pro $\mu \in \mathcal{P}_\delta(\mu_0)$ pro nějaké $\delta > 0$. To spolu s předpokladem o stejnoměrné limitě implikuje spojitost $\mathbf{G}(x; \mu_0)$ v x na $[a, b]$. Protože se budeme věnovat podrobněji této teorii v dalším dílu skript a předpoklady Lemmatu 13.6.6 máme v našem případě splněny, nebudeme je teď zeslabovat.

Analogicky jako v případě Lemmatu o spojitě závislosti řešení ODR na datech úlohy I (Lemma 13.6.3) plyne z Lemmatu o diferencovatelnosti řešení ODR podle parametru I (Lemma 13.6.5) analogický výsledek pro skalární rovnici n -tého řádu.

Důsledek 13.6.8 (Diferencovatelnost řešení ODR podle parametru II). *Nechť $a_i(x; \mu)$, $i = 0, \dots, n$, $f(x, \mu)$ jsou spojitě v x na $[a, b]$ pro $\mu \in \mathcal{U}_\delta(\mu_0)$ a $a_n(x; \mu)$ je nenulové na $[a, b] \times \mathcal{U}_\delta(\mu_0)$. Nechť u řeší Cauchyovu úlohu pro rovnici n -tého řádu*

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i(x; \mu) u^{(i)}(x; \mu) &= f(x; \mu), \\ u^{(i)}(a; \mu) &= u_0^i(\mu), \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned} \tag{13.6.10}$$

příčemž $a_i(x; \mu)$, $i = 0, \dots, n$, $f(x; \mu)$ jsou diferencovatelné dle μ v bodě μ_0 (stejněměrně vzhledem k $x \in [a, b]$, analogicky jako v Lemmatu 13.6.5) a příslušné derivace jsou spojité dle x na $[a, b]$, $u_0^i(\mu)$, $i = 0, \dots, n - 1$ jsou diferencovatelné dle μ v bodě μ_0 .

Potom u je též diferencovatelné dle μ v bodě $\mu = \mu_0$. Jsou-li data úlohy spojitě diferencovatelná dle μ na intervalu $I \subset \mathbb{R}$ (stejněměrně vzhledem k $x \in [a, b]$) a příslušné derivace jsou spojité dle x na $[a, b]$, potom též u je spojitě diferencovatelné dle μ na intervalu I .

Literatura

- [AmEs An] AMMAN, H. a ESCHER, J.: *Analysis I,II,III*. Birkhäuser Verlag, Basel, 2005.
- [Ap MA] APOSTOL, T.M.: *Mathematical Analysis*. Narosa Publishing House, New Delhi, 1997 (16. reprint).
- [BaSt TeMno] BALCAR, B. a ŠTĚPÁNEK, P.: *Teorie množin*. Academia, Praha, 2005 (2. vydání).
- [Br CaVa] BRUNT, B. VAN: *The Calculus of Variations*. Springer Verlag, New York, 2004.
- [BrSaSo MeKo] BRDIČKA, M., SAMEK, L. a SOPKO B.: *Mechanika kontinua*. Academia, Praha, 2000.
- [De] DĚMIDOVICH B.P.: *Sbírka a cvičení z matematické analýzy*. Fragment, Praha, 2003.
- [Di An] DIEDONNÉ, J.: *Foundation of Modern Analysis*. Academic Press, New York–London, 1960.
- [Ja DPI] JARNÍK, V.: *Diferenciální počet I*. Academia, Praha, 1976 (3. vydání).
- [Ja DPII] JARNÍK, V.: *Diferenciální počet II*. Academia, Praha, 1976 (3. vydání).
- [Ja IPI] JARNÍK, V.: *Integrální počet I*. Academia, Praha, 1976 (3. vydání).
- [Ja IPII] JARNÍK, V.: *Integrální počet II*. Academia, Praha, 1976 (3. vydání).
- [Ko MA I] KOPÁČEK, J.: *Matematická analýza pro fyziky I*. Matfyzpress, Praha, 2002.
- [Ko MA II] KOPÁČEK, J.: *Matematická analýza pro fyziky II*. Matfyzpress, Praha, 2002.
- [Ko MA III] KOPÁČEK, J.: *Matematická analýza pro fyziky III*. Matfyzpress, Praha, 2003.
- [Ko MA IV] KOPÁČEK, J.: *Matematická analýza pro fyziky IV*. Matfyzpress, Praha, 2003.

- [Ci MA V] ČIHÁK, P. a kol. : *Matematická analýza pro fyziky V*. Matfyzpress, Praha, 2001.
- [Ko Pr I] KOPÁČEK, J. a kol.: *Příklady z matematiky pro fyziky I*. Matfyzpress, Praha, 2002.
- [Ko Pr II] KOPÁČEK, J. a kol.: *Příklady z matematiky pro fyziky II*. Matfyzpress, Praha, 2003.
- [Ko Pr III] KOPÁČEK, J. a kol.: *Příklady z matematiky pro fyziky III*. Matfyzpress, Praha, 2003.
- [Ko Pr IV] KOPÁČEK, J. a kol.: *Příklady z matematiky pro fyziky IV*. Matfyzpress, Praha, 2003.
- [Ko Pr V] KOPÁČEK, J. a kol.: *Příklady z matematiky pro fyziky V*. Matfyzpress, Praha, 2003.
- [StSa AnI] STEIN, E.M. a SHAKARCHI, R.: *Fourier analysis. An introduction*. Princeton Lecture Notes in Analysis I, Princeton University Press, Princeton, New York, 2003.
- [StSa AnII] STEIN, E.M. a SHAKARCHI, R.: *Complex analysis*. Princeton Lecture Notes in Analysis II, Princeton University Press, Princeton, New York, 2003.
- [StSa AnIII] STEIN, E.M. a SHAKARCHI, R.: *Real analysis. Measure theory, integration and Hilbert spaces*. Princeton Lecture Notes in Analysis III, Princeton University Press, Princeton, New York, 2005.

Příloha A

Významní matematici 2

Tato příloha obsahuje základní informace o některých matematicích a fyzicích, jejichž výsledky se týkají druhého dílu skript. Pro čtenářovu pohodlnost jsme ponechali i ta jména, která se týkají pouze předchozího dílu.

Niels Henryk Abel (1802 Frindøe, ostrov Finnøy–1829 Arendal)

Vystudoval univerzitu v Oslo, poté díky finanční podpoře jednoho z profesorů mohl pobývat v Kodani. Vládní stipendium mu později umožnilo strávit dva roky v Berlíně, Freiburgu a Paříži, finanční problémy ho ale donutily vrátit se zpět. Nakazil se tuberkulózou a zemřel dva dny předtím, než přišel dopis oznamující získání profesorského místa v Berlíně. Věnoval se řešení algebraických rovnic (dokázal, že rovnice vyšších než čtvrtého stupně nelze řešit přesně pomocí algebraických operací), objevil teorii grup a věnoval se eliptickým integrálům. Jeho jméno je také spojeno s kritériem pro neabsolutně konvergentní řady a integrály. Je po něm také pojmenována nejprestižnější matematická cena (Abelova cena).

Aristoteles ze Stageiry (384 př.n.l. Stageira–322 př.n.l. Chalkida)

Aristoteles je považován za zakladatele logiky jako vědy. Navázal především na svého učitele Platóna a jeho učitele Sokrata. Studoval v Platónově Akademii, později tam i vyučoval. Filip Makedonský ho povolal na svůj dvůr, aby se stal vychovatelem Alexandra Makedonského. Po Filipově smrti pak v Aténách založil vlastní filozofickou školu. Pokusil se obsáhnout celé tehdejší vědecké poznání a k tomu potřeboval mít přesně formulováno, jak správně uvažovat. Hlavním dílem je *Organon*, česky *Nástroj*.

Cesare Arzelà (1847 Santo Stefano di Magra–1912 Santo Stefano di Magra)

Studoval na Scuola Normale Superiore v Pise. Po dokončení studií učil na střední škole, ale vrátil se zpět do Pisy a pokračoval ve studiích. Působil krátce na Insti-

tuto Tecnico ve Florencii, na univerzitě v Palermu a v roce 1880 se přestěhoval do Bologně, kde působil po zbytek své kariéry. Je známý především svým zobecněním Ascoliho věty týkající se vztahu stejné spojitosti a stejnoměrné konvergence posloupnosti funkcí.

Giulio Ascoli (1843 Terst–1896 Milán)

Studoval na Scuola Normale Superiore v Pise. Poté působil celý život v Miláně. Věnoval se teorii reálných funkcí a Fourierovým řadám, zavedl pojem stejné spojitosti a byl autorem první verze tzv. Arzelà–Ascoliho věty týkající se stejnoměrné konvergence posloupnosti funkcí, kterou později zobecnil C. Arzelà.

Stefan Banach (1892 Krakov–1945 Lvov)

Nejslavnější polský matematik, vůdčí osobnost lvovské matematické školy, zakladatel funkcionální analýzy. Matka po jeho narození zmizela, otec ho příliš nepodporoval. Vychovával ho nejprve babička, poté Franciszka Płowa. Studoval na technice ve Lvově, teprve po setkání s H. Steinhausem se zaměřil na matematiku. Jeho doktorská práce obsahovala definici úplného normovaného prostoru, který se díky Fréchetovi nazývá prostorem Banachovým. Poté působil na univerzitě ve Lvově. Za sovětské okupace si díky dobrým vztahům se sovětskými matematiky zachoval své místo, za německé okupace byl vězněn a poté se živil mimo jiné krmením vší svou vlastní krví v německém výzkumném ústavu. Po skončení války se vrátil na univerzitu, setkal se se Sobolevem, ale brzy umírá na rakovinu plic. Jeho hlavním přínosem bylo systematické vybudování funkcionální analýzy. Kromě Banachových prostorů jsou po něm pojmenovány Banachovy algebry, Hahn–Banachova věta, Banach–Steinhausova věta, Banach–Alaogluova věta, Banach–Tarského věta či Banachova věta o pevném bodu.

Jacob Bernoulli (1655 Basilej–1705 Basilej)

Byl vynikajícím matematikem, profesorem na basilejské univerzitě, členem francouzské Královské akademie věd a berlínské Pruské akademie věd. Pocházel z rodiny bohatého obchodníka, proti vůli otce se místo teologie věnoval matematice a fyzice. Studoval infinitezimální počet z Leibnizova článku a později se Leibnize zastával ve sporu s Newtonem. Byl také učitelem svého mladšího bratra Johanna (a také svého synovce Nikolause), ale později se s ním rozešel a na vědeckém poli vedli četné spory. Věnoval se nekonečným řadám, diferenciálním rovnicím (je mimo jiné autorem metody separace proměnných a našel způsob řešení tzv. Bernoulliho rovnice), při studiu spojitého úročení dospěl k číslu e , formuloval důkaz pomocí matematické indukce, rozvinul variační počet (problém brachystrony a izoperimetrický problém) a je pokládán za jednoho ze zakladatelů teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Johann Bernoulli (1667 Basilej–1740 Basilej)

Mladší bratr Jacoba, též jeho žák, ale později se s ním rozešel a vedl s ním četné vědecké spory. V Paříži se seznámil s markýzem de l'Hospitalem, kterého vyučoval Leibnizově pojetí diferenciálního počtu a který ve své knize publikoval Johannovy výsledky; mimo jiné i slavné tzv. l'Hospitalovo pravidlo. Nastoupil na místo profesora matematiky do Groningenu a po bratrově smrti pak na jeho místo do Basileje. Ve sporu s Newtonem podporoval Leibnize, což ale vedlo k odmítání všech Newtonových myšlenek. Stal se členem akademií v Paříži, Berlíně, Londýně, Petrohradě a Bologni. Byl učitelem mladého Eulera. Věnoval se diferenciálním rovnicím, variačnímu počtu, ale i praktickým problémům jako je matematický popis pohybu plachetnic či optika. Napsal jednu z prvních učebnic hydrodynamiky, současně se svým synem Danielem, na kterého ale žárlil a i s ním se dostal do sporu.

Felix Bernstein (1878 Halle–1956 Curych)

Německý matematik židovského původu. Působil na univerzitě v Göttingenu, po nástupu Hitlera k moci emigroval do USA. Po 2. světové válce se vrátil do Evropy, žil v Římě a Freiburgu. Jeho hlavním výsledkem je tzv. Cantor–Bernsteinova věta (též nazývána Schröder–Bernsteinova věta) z teorie množin. Věnoval se i matematickým základům genetiky.

Bernard Bolzano (1781 Praha–1848 Praha)

Český, ale německy mluvící matematik. Jeho otec pocházel z Itálie, matka byla Němka. Studoval soukromě matematiku a filozofii, na pražské univerzitě vystudoval teologii. Neuspěl ve snaze získat profesorskou pozici po Vydrovi, poté byl vysvěcen na kněze a na pražské univerzitě přednášel filozofii náboženství a byl univerzitním kazatelem v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Pro své radikální názory byl v roce 1819 suspendován a odešel z Prahy. Zůstal však členem Královské české společnosti nauk, pro kterou pracoval i jako sekretář. Byl filozofem i matematikem současně, zabýval se problémy základů matematiky (logiky i matematické analýzy). Dokázal mnohé výsledky, které se dnes učí v základních kurzech analýzy, sestrojil dokonce spojitou funkci, která nemá derivaci v žádném bodě. Jako jeden z prvních si uvědomil, že všechny výsledky je třeba dokazovat a ne je brát jako zřejmé. Bohužel, kvůli problémům s publikováním jeho výsledky nebyly v matematické komunitě příliš známé a byly oceněny až po roce 1930, kdy byly vydány pod názvem *Functionenlehre*. Svou posmrtně vydanou prací *Paradoxien des Unendlichen* ovlivnil mimo jiné G. Cantora.

Émile Borel (1871 Saint-Affrique–1956 Paříž)

Francouzský matematik a politik, jeden ze zakladatelů teorie míry. Vystudoval na École Normale Supérieure v Paříži, jeho učitelem byl G. Darboux. Tři roky působil v Lille, poté na École Normale Supérieure a od roku 1909 se stal profesorem na pařížské Sorbonně. V letech 1924–1936 byl poslancem francouzského parlamentu a 1925–1940 ministrem námořnictva. V době vichistického režimu byl vězněn, poté

se zapojil do hnutí odporu proti německé okupaci. Spolu s Henri Lebesguem je zakladatelem teorie míry, věnoval se její aplikaci v teorii pravděpodobnosti. Přispěl také k teorii her a věnoval se propojení geometrie a obecné teorie relativity. Jeho jméno je spojeno s borelovskými mírami, borelovskými množinami či borelovskými σ -algebry.

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845 Petrohrad–1918 Halle)

Německý matematik a logik. Studoval v Curychu a Berlíně, působil na univerzitě v Halle. Věnoval se základům teorie množin, jako první si uvědomil, že je třeba rozlišovat mezi různými nekonečnými množinami. Ukázal, že nekonečné podmnožiny přirozených čísel jsou spočetné, ale reálná čísla jsou nespočetná. Zavedl pojmy kardinální a ordinální čísla, formuloval hypotézu kontinua, představil tzv. Cantorovo diskontinuum. Kvůli tomuto pojetí matematiky se dostal do ostrého sporu s L. Kroneckerem. Věnoval se také matematické analýze, například reprezentaci funkcí pomocí trigonometrických řad. Poslední léta jeho života byla poznamenána duševní chorobou.

Augustin Louis Cauchy (1789 Paříž–1857 Sceaux)

Jeden z nejvýznamnějších matematiků všech dob. Je autorem téměř 800 matematických článků, které se věnovaly různým oblastem matematiky a fyziky: mechanice kontinua, optice, teorii čísel, matematické analýze. Studoval na École Polytechnique a na École des Ponts et Chaussées. V knize *Cours d'Analyse* se mu podařilo rigorózně zformulovat základy matematické analýzy funkcí jedné reálné proměnné. Působil ale na pařížské polytechnice a spíše prakticky orientovaní studenti nebyli z takové výuky nadšeni. Navíc byl Cauchy poměrně konfliktní typ a i kvůli svému náboženskému zaměření musel nakonec místo opustit. Poté měl velké problémy sehnat místo, o to více se však věnoval vědecké práci. Zabýval se především funkcemi komplexní proměnné, kde dokázal mnohé fundamentální výsledky (Cauchyova věta pro křivkový integrál holomorfní funkce a příbuzné výsledky). Významné jsou též jeho práce z teorie parciálních diferenciálních rovnic (Cauchy–Kovalevská věta).

Ernesto Cesàro (1859 Neapol–1906 Torre Annunziata)

Studoval matematiku na École des Mines v Liège. Po návratu do Itálie působil nejprve v Palermu a poté na univerzitě v Neapoli. Věnoval se především geometrii (je po něm pojmenován popis křivek nezávislý na souřadném systému). S jeho jménem se pojí také sčítání řad pomocí limity aritmetických průměrů částečných součtů. Zahynul tragicky při záchraně syna, který se topil v moři.

Jean Baptiste le Rond d'Alembert (1717 Paříž–1783 Paříž)

Francouzský matematik, fyzik, mechanik, hudební teoretik a filozof, redaktor slavné Encyklopedie. Byl nemanželským synem markýzy de Tencin a dělostřeleckého důstojníka Louis-Camus Destouches. Matka ho po narození odložila na schody kostela Saint-Jean le Rond, odkud pochází jeho jméno. Jméno d'Alembert přijal

teprve později. Jeho otec ho finančně podporoval na studiích. Studoval v Paříži právo, ale vynikal především v matematice. Proslavil se dílem *Traité de dynamique* z roku 1743, které se věnovalo zákonům pohybu. Vyřešil jednorozměrnou vlnovou rovnici (řešící operátor nese jeho jméno, stejně jako diferenciální operátor z vlnové rovnice). Pracoval také na otázkách konvergence číselných řad (podílové, nebo-li d'Alembertovo kritérium). Věnoval se také teorii hudby. Od roku 1740 až do roztržky s D. Diderotem v roce 1757 působil jako jeden z editorů slavné Encyklopedie. Redigoval více než tisíc hesel. Byl členem francouzské, pruské a čestným členem Americké akademie umění a věd. Pruskou akademii věd odmítl po Eulerově odchodu do Petrohradu vést, pruský král mu ale vyplácel důchod. Odmítl se také stát vychovatelem dětí ruské carevny Kateřiny.

Jean-Gaston Darboux (1842 Nîmes–1917 Paříž)

Významný francouzský matematik, profesor pařížské Sorbonny. Věnoval se především diferenciální geometrii, matematické analýze a teorii diferenciálních rovnic. Je autorem ekvivalentního přístupu k definici Riemannova integrálu. Byl Poincarého životopiscem a uspořádal dílo J. Fouriera. Byl také vynikajícím učitelem a mezi jeho studenty patřili například É. Borel, É. Cartan či É. Picard.

Richard Dedekind (1831 Braunschweig–1916 Braunschweig)

Německý matematik, působil na univerzitě v Göttingenu, ETH v Curychu, ale většinu času strávil na univerzitě v rodném Braunschweigu. Je známým především díky konstrukci reálných čísel pomocí tzv. Dedekindových řezů, přispěl ale také k teorii množin a algebře. Přátelil se s G. Cantorem a podporoval ho ve sporu s L. Kroneckerem.

René Descartes (1596 La Haye, dnes Descartes–1650 Stockholm)

Francouzský matematik, fyzik a filozof. Je autorem analytické geometrie, čímž přispěl k propojení algebry a geometrie. Zavedl označení proměnných x , y a z a z latinského překladu jeho jména (Cartesius) pochází název kartézské souřadné soustavy. Byl ale především filozofem a bývá dokonce nazýván „otcem moderní filozofie“.

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 Düren–1859 Göttingen)

Německý matematik, jeho předkové pocházeli z Belgie, proto měl francouzsky znějící jméno. Vystudoval v Paříži, poté působil ve Vratislavi (tehdejší Breslau), Berlíně a Göttingenu. Jeho manželka byla sestrou hudebního skladatele F. Mendelssohna-Bartholdyho. Jeho jméno je spjato s mnoha oblastmi matematiky, kterým se věnoval. Především šlo o teorii čísel, v analýze patřil mezi první, kteří přesně definovali pojem funkce, a Dirichletova funkce byla první „exotická“ funkce, která byla matematiky přijata. Dále se věnoval konvergenci Fourierových řad (Dirichletovo jádro), parciálním diferenciálním rovnicím (Dirichletova okrajová podmínka), jeho jméno se objevuje spolu s Abelovým u konvergenčního kritéria ne-

absolutně konvergentních řad a integrálů. Významných výsledků dosáhl i v matematické fyzice a teorii pravděpodobnosti.

Paul David Gustav du Bois-Reymond (1831 Berlín–1889 Freiburg)

Německý matematik, jeho bratr Emil byl slavným lékařem a fyziologem. Vystudoval v Curychu a Königsbergu, poté učil na střední škole. Teprve později nastoupil do Heidelbergu a poté působil ve Freiburgu, Tübingenu a Berlíně. Věnoval se teorii funkcí, Fourierovým řadám a dokázal zjemnění fundamentálního lemmatu variačního počtu, se kterým se pojí jeho jméno. Publikoval příklad spojitě, nikde nediferencovatelné funkce. Objevil myšlenku důkazu známého jako Cantorův diagonální argument. Rozvíjel také teorii infinitezimálně malých veličin.

Leonhard Paul Euler (1707 Basilej–1783 Petrohrad)

Švýcarský matematik, jeden z nejvýznamnějších matematiků všech dob. Napsal téměř 900 publikací a učebnic. Jeho nejdůležitější výsledky se týkají diferenciálních rovnic (metoda variace konstant, Eulerova rovnice aj.) a teorie grafů (problém Königsberských mostů), ale i mechaniky (Eulerovy rovnice ideální tekutiny). Zavedl také pojem imaginární číslo a komplexní exponenciálu, zavedl Γ -funkci a věnoval se také problematice variačního počtu. Vystudoval na basilejské univerzitě, kde na něj měl velký vliv Johann Bernoulli. Působil v Petrohradu, v Berlíně a poté opět v Petrohradu, kde je i pohřben.

Maurice René Fréchet (1878 Maligny–1973 Paříž)

Francouzský matematik, žák Hadamardův. Vystudoval v Paříži, působil na různých francouzských univerzitách (Besançon, Nantes, Poitiers, Strasbourg) až nakonec zakotvil v Paříži. Věnoval se teorii metrických prostorů, které zavedl, topologii, statistice a funkcionální analýze. S jeho jménem se pojí totální diferenciál zobrazení nad Banachovými prostory.

Galileo Galilei (1564 Pisa–1642 Arcetri)

Toskánský astronom a fyzik. Studoval v Pise, z finančních důvodů studia nedokončil. Později ale působil na univerzitě v Pise a v Padově. Od roku 1610 byl na základě církevního procesu, který se týkal heliocentrického modelu, odsouzen k domácímu vězení, ve kterém zůstal až do konce života. Věnoval se astronomii, díky zdokonalení dalekohledu objevil 4 Jupiterovy měsíce, studoval sluneční skvrny a povrch měsíce. Věnoval se problémům kinematiky, studoval volný pád. Formuloval též několik problémů, které podnítily rozvoj variačního počtu.

René Eugène Gâteaux (1889 Vitry-le-François–1914 Rouvroy)

Francouzský matematik. Studoval v Reims a poté na École Normale Supérieure. Po dokončení studia učil na střední škole, začal se ale věnovat doktorátu. Získal stipendium a pobýval jeden rok v Římě, kde pracoval s V. Volterrou. Na za-

čátku první světové války narukoval do armády a poměrně brzy byl zabit. Díky J. Hadamardovi obdržel po smrti prestižní cenu Prix Francoeur. Věnoval se nekonečnědimenzionální integraci, na jeho výsledky navázal N. Wiener při své práci o Brownově pohybu. Jeho jméno je spojeno se směrovou derivací zobrazení mezi Banachovými prostory.

Johann Carl Friedrich Gauss (1777 Braunschweig–1855 Göttingen)

Významný německý matematik, fyzik a astronom, ředitel göttingenské hvězdárny. Vystudoval na univerzitě v Göttingenu. Věnoval se magnetismu, vynalezl magnetometr. Dokázal základní větu algebry, je považován za zakladatele teorie čísel, je autorem tzv. normálního (Gaussova) rozdělení, věnoval se i diferenciální geometrii a zabýval se myšlenkou neeukleidovských geometrií.

Kurt Gödel (1906 Brno–1978 Princeton)

Rakouský matematik a fyzik. Studoval fyziku a matematiku na vídeňské univerzitě, kde po doktorátu působil. Zde také publikoval své dvě hlavní věty o neúplnosti. Po anšlusu Rakouska se automaticky stal německým občanem, před nacismem uprchl do USA, kde působil na Institutu pokročilých studií v Princetonu. Zde se věnoval mimo jiné i obecné teorii relativity. V závěru života se věnoval filozofii.

Thomas Hakon Gronwall (1877 Dylta bruk–1932 New York)

Studoval v Uppsale a Stockholmu, poté opustil Švédsko a přes Německo odešel později do USA. Zpočátku pracoval v různých ocelárnách jako inženýr, teprve po desetiletém pobytu se vrátil k matematice. Nejprve působil v Princetonu, později pak na katedře fyziky na Columbia University v New Yorku. Patnáct let byl editorem prestižního časopisu *Annals of Mathematics*, kde také publikoval podstatnou část svých matematických prací. S jeho jménem se pojí Gronwallova nerovnost, používaná v teorii diferenciálních rovnic. Věnoval se ale také teorii Fourierových řad, teorii čísel, teorii funkcí komplexní proměnné a matematické fyzice.

William Rowan Hamilton (1805 Dublin–1865 Dublin)

Irský matematik, známý především objevem kvaternionů. Byl typem zázračného dítěte, v dětství uměl několik cizích jazyků. Později dal přednost matematice, ale často psal i poezii. Studoval na Trinity College v Dublinu, po dokončení doktorátu působil na Trinity College jako Královský irský astronom, i když se věnoval prakticky jen matematice. Kromě kvaternionů se věnoval přeformulování newtonovské mechaniky (dnes je známá jako hamiltonovská mechanika), optice i teorii elektromagnetismu. Jeho matematické výsledky hrály velkou roli v matematické formulaci kvantové teorie. Jeho jméno se také pojí s Cayley–Hamiltonovou větou.

Heinrich Eduard Heine (1821 Berlín–1881 Halle)

Studoval na univerzitách v Göttingenu a Berlíně. Působil v Königsbergu, Bonnu a Halle. Věnoval se matematické analýze, zejména speciálním funkcím. Známa je také jeho věta dávající do souvislosti limitu funkce a posloupností a jeho alternativní definice spojitosti.

Ludwig Otto Hesse (1811 Königsberg–1874 Mnichov)

Vystudoval na univerzitě v Königsbergu, učil na střední škole a později pod vedením C. Jacobiho obhájil doktorát. Působil pak v Königsbergu, Heidelbergu a Mnichově. Věnoval se teorii algebraických funkcí, algebraických invariantů a variačnímu počtu, kde rozšířil Jacobiho výsledky. Jeho jméno je spojeno s maticí druhých derivací funkce více proměnných.

Guillaume Feançois Antoine, Marquis de l'Hospital (1661 Paříž–1704 Paříž)

Francouzský matematik, markýz. Kvůli problémům se zrakem opustil vojenskou kariéru a věnoval se matematice, ke které měl zvláštní nadání. Jeho osobním učitelem byl Johann Bernoulli, který později souhlasil, že za roční poplatek 300 zlatých může l'Hospital publikovat Bernoulliho výsledky ve své knize *Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes*, která se stala první učebnicí diferenciálního počtu na světě. Mimo jiné v ní bylo uvedeno tzv. l'Hospitalovo pravidlo. Po markýzově smrti začal Bernoulli bojovat za to, aby byl uznán za autora tohoto pravidla, což se dnes přijímá jako velmi pravděpodobné.

Hérón Alexandrijský (Méchanikos) (10 n.l.–70 n.l.)

Řecký matematik a fyzik, působil v Múseiu v Alexandrii. Popsal iterační metodu určování druhé a třetí odmocniny. Jeho jméno je také spojeno se vzorcem na výpočet obsahu trojúhelníku (Hérónův vzorec), i když je pravděpodobné, že vzorec znal již Archimédés a Hérón ho pouze uvedl ve své knize *Metrika*. Ještě významnější jsou jeho vynálezy, například sestrojil pravděpodobně první parní stroj.

David Hilbert (1862 Wehlau, dnes Zamensk–1943 Göttingen)

Jeden z nejslavnějších matematiků všech dob. Vystudoval matematiku v Königsbergu, působil zde na počátku své kariéry, poté odešel do Göttingenu, kde pracoval na univerzitě až do své smrti. V Königsbergu se spřátelil s Hermannem Minkowskim. Jejich přátelství se odrazilo také v matematické práci obou velíkánu matematiky. Hilbert se věnoval algebře, funkcionální analýze (zavedl úplné nekonečně dimenzionální prostory se skalárním součinem, dnes nazývané Hilbertovy prostory), teorii čísel, ale také fyzice (obecné teorii relativity a matematické formulaci kvantové mechaniky). Na Mezinárodním matematickém kongresu v Paříži v roce 1900 ve své přednášce představil 23 zajímavých otevřených problémů, z nichž jsou některé otevřené dodnes. Ve dvacátých letech se snažil o formulování

matematiky na pevných a úplných logických základech, což bylo kvůli Gödelovým výsledkům o neúplnosti odsouzeno k nezdaru. Mezi jeho studenty (měl téměř sedmdesát doktorandů) patřili například později světoznámí matematici F. Bernstein, H. Weyl, R. Courant či H. Steinhaus.

Christiaan Huygens (1629 Haag–1695 Haag)

Nizozemský fyzik, astronom, mechanik a matematik. Studoval v Leidenu a Bredě. Velkou část života prožil v Paříži, stýkal se s nejslavnějšími vědci své doby (Descartes, Leibniz, Newton aj.). Díky zdokonalení dalekohledu objevil první Saturnův měsíc a Saturnovy prstence, sestrojil kyvadlové hodiny bez tlumení, věřil ve vlnový charakter světla (Huygensův princip). V matematice se především věnoval otázkám pohybu rotujících těles.

Carl Gustav Jacob Jacobi (1804 Postupim–1851 Berlín)

Německý matematik židovského původu. Studoval v Berlíně, kde také zahájil svou kariéru. Později se přesunul do Königsbergu, kde působil 15 let. Po zhroutilí z přepracování a návštěvě Itálie se přestěhoval do Berlína, kde žil jako královský penzista. Zemřel na neštovice. Věnoval se teorii čísel a jako první ji studoval pomocí eliptických funkcí. Věnoval se také analytické mechanice, variačnímu počtu a diferenciálním rovnicím. S jeho jménem se pojí Jacobiho determinant, Hamilton–Jacobiho rovnice, či Jacobiho rovnice ve variačním počtu. Znovu zavedl také značení ∂ pro parciální derivaci.

Johan Ludwig William Valdemar Jensen (1859 Nakskov–1925 Kodaň)

Dánský matematik, pracoval jako inženýr u kodaňské telefonní společnosti a matematice se věnoval ve svém volném čase. Je známý díky (Jensenově) nerovnosti pro konvexní funkce reálné proměnné a několika výsledkům v komplexní analýze (Jensenova formule a nerovnost).

Leopold Kronecker (1823 Liegnitz (dnes Legnica)–1891 Berlín)

Německý matematik a logik. Představitel finitismu, uznával jen to, co se dá dokázat konečným počtem kroků pomocí přirozených čísel, odmítal důkaz sporem. Proto odmítal používat iracionální čísla, ta transcendentální dokonce dle něj vůbec neexistovala. Odmítal také pojem limity, nepřijal Weierstrassovu konstrukci spojitě nikde nediferencovatelné funkce. Pocházel z bohaté židovské rodiny, jeho obchodní aktivity mu umožnily věnovat se matematice jako koníčku. Vystudoval v Berlíně, kde také po celý život působil. Věnoval se teorii čísel, eliptickým funkcím a vyšší algebře. Po odchodu svého učitele Kummera do důchodu nastoupil na jeho místo na berlínskou univerzitu. Zemřel pár měsíců po smrti své ženy. S jeho jménem se pojí několik vět v různých oblastech matematiky, ale také například Kroneckerovo delta.

Joseph-Louis Lagrange, comte de l'Empire (1736 Turín–1813 Paříž)

Francouzský matematik a fyzik italského původu. Vystudoval univerzitu v Turíně a na tamní univerzitě také působil. Na doporučení Eulera byl pozván do Berlína, kde působil 20 let. Na pozvání Ludvíka XVI. se přemístil do Paříže. Po francouzské revoluci přednášel na nově založených školách (École Normale Supérieure a École Polytechnique). Pohřben byl v Paříži v Panthéonu. Věnoval se především variačnímu počtu (Euler–Lagrangeovy rovnice) a je považován za jednoho z jejich zakladatelů. Jeho jméno nesou i Lagrangeovy multiplikátory (vázané extrémní funkcionálů). Dále se věnoval algebře (řešení polynomiálních rovnic vyšších stupňů), teorii čísel a nebeské mechanice.

Adrien-Marie Legendre (1752 Paříž–1833 Paříž)

Pocházel ze zámožné rodiny, studoval na pařížské univerzitě. Poté působil na École Militaire a od roku 1795 na École Normale Supérieure. Byl členem francouzské akademie věd, rok před smrtí se stal také čestným členem americké akademie věd. O svůj majetek přišel při francouzské revoluci. Z finančních problémů mu pomohl sňatek v roce 1793. V roce 1824 odmítl volit vládního kandidáta do Národního shromáždění a přišel o penzi. Zemřel v chudobě. Věnoval se eliptickým funkcím, jeho práce byla základem pro práci Abelovu. Zformuloval poprvé metodu nejmenších čtverců, kterou používal na výpočet drah komet. Zavedl Γ - a B -funkce, studoval teorii čísel i variační počet. S jeho jménem se pojí Legendreova transformace či Legendreovy polynomy.

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 Lipsko–1716 Hannover)

Německý filozof, matematik, fyzik a teolog, považovaný za posledního opravdu univerzálního vědce. Studoval v Lipsku a Jeně. Odmítl profesorské místo, aby mohl být nezávislý, a pracoval jako diplomat a knihovník. Zasloužil se o zřízení první německé společnosti věd v Prusku, která se později přejmenovala na Královskou akademii věd. Jeho zásadním matematickým výsledkem je zavedení diferenciálního a integrálního kalkulu, ke kterému dospěl nezávisle ve stejné době jako I. Newton. Na rozdíl od I. Newtona pracoval s infinitezimálně malými veličinami, které později z analýzy odstranil K. Weierstrass; zpět je pak v souvislosti s tak zvanou nestandardní analýzou vrátil ve druhé polovině 20. století A. Robinson. Další jeho matematické výsledky se týkaly například řešení soustav lineárních rovnic (v podstatě zavedl Gaussovu eliminaci), našel číselnou řadu, která má součet π , na jeho výsledky o samopodobnosti navázal B. Mandelbrot při výsledcích týkajících se fraktální geometrie. Zkonstruoval také první mechanickou kalkulačku.

Ernst Leonard Lindelöf (1870 Helsinky–1946 Helsinky)

Finský matematik, studoval i celý život působil na helsinské univerzitě. Jeho otec byl také matematik. Jeho jméno je spojeno s Picard–Lindelöfovou větou týkající se existence řešení pro obyčejné diferenciální rovnice. Věnoval se dále funkcím

komplexní proměnné (Phragmén–Lindelöfův princip) a topologii (Lindelöfovy prostory).

Rudolf Otto Sigismund Lipschitz (1832 Königsberg–1903 Bonn)

Německý matematik, studoval v Königsbergu, doktorát dokončil pod vedením L. Dirichleta v Berlíně. Působil v Berlíně, Vratislavi (Breslau), profesorské místo získal v Bonnu. Jeho studentem byl F. Klein. Věnoval se teorii čísel, Besselovým funkcím, Fourierovým řadám, obyčejným i parciálním diferenciálním rovnicím, nezávisle na Cliffordovi objevil Cliffordovu algebru. Jeho jméno je známé v souvislosti s lipschitzovsky spojitými funkcemi.

Nikolaj Ivanovič Lobačevskij (1792 Nižnij Novgorod–1856 Kazaň)

Slavný ruský matematik, zakladatel neeuklidovské geometrie. Vystudoval na univerzitě v Kazani, kde pak celý život působil. Zabýval se především geometrií, zejména otázkou nezávislosti pátého Euklidova postulátu. Toto studium vedlo k objevu tzv. hyperbolické geometrie. Jako první také definoval pojem funkce jako zobrazení mezi dvěma obory reálných čísel. Tuto definici pak zpopularizoval L. Dirichlet. Jeho jméno nese též kondenzační kritérium konvergence číselných řad.

Isaac Newton (1642 Woolsthorpe by Colsterworth–1727 Londýn)

Anglický fyzik, matematik, filozof a alchymista a teolog. Vystudoval na univerzitě v Cambridgi. V době, kdy byla uzavřena kvůli moru, na domácím statku přišel na teorii gravitace a vytvořil diferenciální počet. Jeho hlavní výsledky byly shrnuty v knize *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* vydané v roce 1687. Newtonovo jméno je také spojeno s numerickou metodou řešení nelineárních rovnic. Dále zobecnil binomickou větu na obecný (reálný) exponent. Jeho přínos fyzice je také obrovský, kromě teorie gravitace formuloval zákony mechaniky a věnoval se optice. Newton patřil nepochybně mezi ty vědce, kteří posunuli rozvoj vědy o největší krok kupředu.

Giuseppe Peano (1858 Spinetta–1932 Turín)

Italský matematik, zakladatel matematické logiky a teorie množin. Jeho dílo *Formulario Mathematico* výrazně ovlivnilo B. Russella a A. Whiteheada při psaní *Principia Mathematica*. Většinu svého profesního života (včetně studií) strávil na univerzitě v Turíně. Jeho jméno je spjato s axiomy přirozených čísel, s křivkou vyplňující čtverec, s existenční větou pro obyčejné diferenciální rovnice, se tvarem zbytku pro Taylorův rozvoj a se tvarem zbytku pro numerické kvadraturní vzorce.

Charles Émile Picard (1856 Paříž–1941 Paříž)

Významný francouzský matematik, jeho jméno nesou věty z teorie funkcí komplexní proměnné i existenční věta pro obyčejné diferenciální rovnice. Vystudoval na École Normale Supérieure, byl nejlepším studentem ve svém ročníku. Kromě

krátkého pobytu v Toulouse učil celý svůj život na různých pařížských univerzitách. Byl také členem Francouzské akademie věd.

Joseph Ludwig Raabe (1801 Brody–1859 Curych)

Vystudoval na vídeňské polytechnice, působil v Curychu. Jeho jméno je známé díky kritériu konvergence číselných řad.

Jacopo Francesco Riccati (1676 Benátky–1754 Treviso)

Benátský matematik a právník. Studoval v Brescii a Padově. Díky majetku se mohl věnovat matematice jako koníčku, odmítl nabídky z Petrohradu, Vídně i Padovy. Jeho jméno je spojeno s názvem obyčejné diferenciální rovnice, jejichž řešení se věnoval.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826 Breselenz–1866 Selasca)

Studoval v Göttingenu a Berlíně, působil v Göttingenu. Přispěl k mnoha oblastem matematiky. Je autorem neeukleidovské geometrie (tzv. Riemannova geometrie), výrazně ovlivnil komplexní analýzu (Cauchy–Riemannovy podmínky, Riemannova věta o konformním zobrazení), reálnou analýzu (Riemannův integrál), ale i teorii čísel (slavná Riemannova hypotéza). Zemřel poměrně mladý na tuberkulózu.

Michel Rolle (1652 Ambert–1719 Paříž)

Francouzský matematik, jeho jméno je spojeno s větou o střední hodnotě. Zpočátku vystupoval jako kritik infinitezimálního počtu, později jej přijal. Ve své knize *Traité d'Algèbre* poprvé v Evropě představil Gaussův eliminační algoritmus, zavedl označení $\sqrt[n]{}$ pro n -tou odmocninu a představil Eulerův algoritmus pro nalezení největšího společného dělitele dvou polynomů. Pracoval na Akademii věd jako „Pensionnaire Géometre“.

Karl Hermann Amandus Schwarz (1843 Hermsdorf, dnes Jerzmanowa–1921 Berlín)

Německý matematik, za manželku měl dceru jiného slavného matematika Kummera (oponent jeho doktorské práce). Vystudoval v Berlíně, působil v Halle, Curychu, Göttingenu a v Berlíně. Věnoval se převážně komplexní analýze, jeho jméno je také spjato se slavnou nerovností, dnes nazývanou Cauchy–Schwarzovou.

James Joseph Sylvester (1814 Londýn–1897 Londýn)

Anglický matematik židovského původu. Studoval v Londýně a Cambridgi, kvůli svému původu ale nemohl studia dokončit. Krátce působil v USA, pak se vrátil do Londýna a věnoval se pojišťovnictví. K matematice se vrátil po roce 1855, kdy se stal profesorem matematiky na Královské vojenské akademii ve Woolwichi. Byl

druhým prezidentem Londýnské matematické společnosti, byl zvolen i do francouzské Královské akademie věd. V roce 1877 přijal místo na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimore, kde založil první americký matematický časopis. Později nastoupil do Oxfordu a poslední roky života strávil v Londýně. Věnoval se především lineární algebře (Sylvestrovo kritérium), spolu s Cayleym je považován za zakladatele teorie invariantů. Výrazně přispěl i do teorie čísel a eliptických funkcí.

Brook Taylor (1685 Edмонтон–1731 Londýn)

Anglický matematik, člen a později sekretář Královské vědecké společnosti. Místo infinitezimálně malých veličin pracoval s konečnými veličinami, což je základem slavné Taylorově věty a Taylorových rozvojų. Byl také členem komise, která rozhodovala o prvenství Newtona či Leibnize při vytvoření diferenciálního počtu.

Alexandre-Théophile Vandermonde (1735 Paříž–1796 Paříž)

Francouzský hudebník, chemik a matematik. Byl houslistou, matematice se věnoval až později. S jeho jménem se pojí jeden determinant, zdá se ale, že to je spíše omylem. Byl členem Královské akademie věd, učil na École Normale Supérieure. Věnoval se kombinatorice a teorii determinantů.

François Viète (1540 Fontenay-le-Comte–1603 Paříž)

Francouzský matematik, autor algebraické notace, která se prakticky používá dodnes. Působil na francouzském dvoře jako poradce, věnoval se šifrování a prolomil tajný španělský kód.

Karl Theodor Wilhel Weierstrass (1815 Ostenfelde–1897 Berlín)

Německý matematik, měl velký vliv na formování matematické analýzy. Studoval na univerzitě v Bonnu (právo, finance a ekonomii), kvůli lásce k matematice studia nedokončil a vystudoval univerzitu v Münsteru. Poté několik let učil na střední škole, ale po publikování výsledků o abelovských funkcích obdržel čestný doktorát na univerzitě v Königsbergu a získal místo na univerzitě ve Vratislavi (Breslau). Poté působil na Gewerbeinstitutu (dnes Technická univerzita Berlín) a na Univerzitě Friedricha-Wilhelma (dnes Univerzita Humboldtova) v Berlíně. Zavedl tzv. ε - δ gymnastiku v definicích limit funkcí a spojitosti, čímž zmodernizoval výklad základů analýzy. Dokázal mnoho vět, které se dnes přednáší v základních kurzech analýzy funkcí jedné reálné proměnné (například větu o nabývání extrému spojitou funkcí na omezených uzavřených intervalech). Dále studoval stejnoměrnou konvergenci posloupností funkcí, analytické prodloužení funkcí i variační počet. Zkonstruoval také funkci, která je na celé reálné ose spojitá, ale není diferencovatelná v žádném bodě.

Jozéf-Maria Hoëné de Wroński (1776 Wolsztyn–1853 Neuilly-sur-Seine)

Polský filozof, matematik a fyzik, právník a ekonom. Jeho rodiče byli českého původu, i když žili v Polsku. Jako voják se zúčastnil Kościuszkova povstání, poté studoval na různých univerzitách v Německu a v Marseille. Působil na hvězdárně v Marseille, kterou musel opustit po publikaci svého díla, které se ukázalo být plně nesmyslné. To platí o mnohých jeho dílech, včetně toho, které obsahovalo determinant, který nese jeho jméno. Dnes je oceňována jeho metafyzika.

Max August Zorn (1906 Krefeld–1993 Bloomington)

Německo–americký matematik, věnoval se algebře, teorii grup a numerické analýze. Studoval v Hamburgu, působil v Halle, na univerzitě v Yale, na UCLA a v Bloomingtonu. Je po něm pojmenováno tvrzení ekvivalentní axiomu výběru (Zornovo lemma), které dokázal nezávisle na předchozím důkazu.

Antoni Zygmund (1900 Varšava–1992 Chicago)

Polsko–americký matematik, věnoval se především harmonické analýze. Studoval na univerzitě ve Varšavě, kde poté i působil, stejně jako na varšavské polytechnice. Po deseti letech ve Vilniusu se přestěhoval do USA, kde pracoval na univerzitě v Chicagu. Jeho kniha *Trigonometric series*, ač poprvé vyšla v roce 1935, stále patří mezi klasické knihy harmonické analýzy.

Rejstřík

A

Abelova parciální sumace, 76

B

bod

hraniční, 117
hromadný, 119
izolovaný, 119
konjugovaný, 229
kritický, 211
okolí
 \mathbb{R}^N , 2
sedlový, 191
stacionární, 188, 211
vnější, 117
vnitřní, 117

C

Cantorovo diskontinuum kladné délky,
 88
Cauchyova úloha, 7
Cauchyův vzorec pro součin řad, 83
cesarovská sčítatelnost, 85
Cramerovo pravidlo, 43

Č

číslo

π , 101

D

derivace

mocninná řada, 91
 podle komplexní proměnné, 102
parciální, 2, 149
parciální smíšená, 149
ve směru, 151

diferenciál

Fréchetův, 208

Gâteauxův, 208

Gâteauxův druhý, 211

totální, 153

 aritmetika, 157

 řádu k , 163

diferencovatelnost

 stejněměrná vůči proměnné, 264

E

extremála, 211

extrémy

 funkce

 lokální, 188

 vázané, 199

 funkcionálu

 lokální, 210

 vázané, 239

F

funkce

 Besselova 1. druhu, 98

 cos, 98

 exp, 99

 homogenní, 18

 lineární nezávislost, 37

 reálně analytická, 96

 sin, 98

 spojitost, 2

 složená funkce, 2

 funkcionál, 208

 konvexní, 213

G

gradient, 153

H

hamiltonián, 259

I

integrace mocninné řady, 92
 integrační faktor, 168
 interval, 130

J

jacobián, 202

K

kladná a záporná část čísla, 80
 kritérium konvergence číselné řady
 Abelovo, 76
 Cauchyovo odmocninové, 72, 90
 d'Alembertovo podílové, 72, 90
 Dirichletovo, 76, 90
 Gaussovo, 74
 integrální, 69
 Leibnizovo, 67
 limitní srovnávací, 69
 Lobačevského kondenzační, 85
 Raabeho, 74
 srovnávací I, 67
 srovnávací II, 68
 Kroneckerovo delta, 37
 kvadratická forma, 188
 klasifikace, 188

L

Lagrangeovy multiplikátory, 199
 lagrangián, 256
 Legendreova transformace, 257, 258
 lemma
 diferencovatelnost řešení ODR podle
 parametru, 264, 266
 du Bois-Reymondovo, 216
 fundamentální variačního počtu, 216
 o charakterizaci konvexity funkcí více
 proměnných, 241
 spojitá závislost řešení ODR na da-
 tech úlohy, 263

limita

aritmetika, 2
 funkce, 2
 složená, 2
 vzhledem k množině, 134
 zobrazení v metrických prostorech,
 133

aritmetika, 135

lokální Lipschitzova podmínka, 7

M

matice
 Hessova, 191
 Jacobiho, 202
 Wronského, 38, 43, 45
 metrika, 106
 ekvivalentní, 112
 eukleidovská, 1
 množina
 derivate, 119
 hranice, 117
 hustá, 121
 kompaktní, 126
 konvexní, 160
 omezená, 126
 otevřená, 2, 115
 pokrytí, 129
 souvislá, 165
 uzávěr, 117
 uzavřená, 115
 vnějšek, 117
 vnitřek, 117
 multiindex, 163
 výška, 163

N

nekonečný součin, 86
 nutná podmínka konvergence, 87
 nerovnost
 Cauchy–Schwarzova, 110
 Gronwallova, 261
 Minkowského, 106
 trojúhelníková, 105
 Youngova, 107
 norma, 108
 ekvivalentní, 112

O

oblast, 165
 obyčejná diferenciální rovnice, 3
 Bernoulliho, 29
 Besselova, 97
 Eulerova, 52

- homogenní, 18, 22
 - lineární 1. řádu, 26
 - lineární n -tého řádu, 34
 - homogenní, 34
 - homogenní: fundamentální systém, 38
 - konstantní koeficienty: fundamentální systém, 49
 - konstantní koeficienty: homogenní, 45
 - konstantní koeficienty: speciální pravá strana, 50
 - partikulární řešení, 42
 - partikulární řešení: variace konstant, 42
 - Riccatiova, 32
 - řešení, 3
 - maximální, 7
 - se separovanými proměnnými, 17
 - systém, 3
 - $y' = f(x)$, 10
 - $y' = f(x)g(y)$, 17
 - $y' = g(y)$, 11
 - $y^{(n)} = f(x)$, 55
 - $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n-1)})$, 58
 - $y^{(n)} = f(x, y^{(n-1)})$, 56
 - $y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{n-1})$, 59
 - $y^{(n)} = f(y^{(n-2)})$, 57
 - omezené částečné součty komplexní exponenciály, 78
- P**
- poloměr konvergence mocninné řady, 90
 - posloupnost
 - cauchyovská, 122
 - částečných součtů, 63
 - potenciál
 - rovnice, 181
 - vektorového pole, 164
 - prostor
 - Banachův, 124
 - Hilbertův, 124
 - metrický, 106
 - konvergence, 112
 - okolí, 115
 - separabilní, 121
 - úplný, 122
 - normovaný lineární, 108
 - unitární, 109
- R**
- rovnice
 - Euler–Lagrangeova, 217
 - Hamiltonovy, 257, 259
 - Jacobiho, 229
 - Lagrangeovy, 256
 - ve tvaru totálního diferenciálu, 181
 - rovnoběžníkové pravidlo, 111
- Ř**
- řada
 - Bolzano–Cauchyova podmínka konvergence, 65
 - částečný součet, 63
 - číselná, 63
 - divergentní, 63
 - geometrická, 64
 - harmonická, 64, 90
 - konvergentní, 63
 - absolutně, 66
 - neabsolutně, 66
 - mocninná, 89
 - oscilující, 63
 - přerovnání, 79
 - Taylorova, 94
 - aritmetika, 95
 - teleskopická, 64
 - zobecněná, 81
 - řetízkové pravidlo, 159
- S**
- skalární součin, 109
 - spojitost
 - vzhledem k množině, 134
 - zobrazení v metrických prostorech, 133
 - stejná omezenost, 145
 - stejná stejnoměrná spojitost, 145
 - Sylvestrovo kritérium, 189
- T**
- Taylorův vzorec, 163

U

úloha

- nejkratší spojnice v rovině, 223, 245
- o brachystochroně, 207, 255
- o minimální radiálně symetrické ploše, 249
- o zavěšeném řetězu, 252
- problém princezny Dido, 245

V

Vandermondův determinant, 46

věta

- Abelova, 96
- aritmetika řad, 66
- Arzelà–Ascoliho, 145
- Banachova o kontrakci, 131
- Bolzano–Cauchyova podmínka, 134
- Borelova pokrývací, 129
- Cantorova o průniku kompakťů, 128
- Cantorova o stejnoměrné spojitosti, 135
- Cauchyova o součinu řad, 82
- Eulerova nutná podmínka, 211
- globální existence a jednoznačnost řešení systému prvního řádu, 262
- Heineho, 134
- charakterizace hranice pomocí okolí, 118
- charakterizace hranice pomocí posloupností, 120
- charakterizace hromadných bodů pomocí posloupností, 119
- charakterizace kompaktnosti v konečné dimenzi, 127
- charakterizace uzávěru pomocí posloupností, 120
- charakterizace uzavřené množiny, 119
- charakterizace uzavřenosti pomocí posloupností, 120
- Jacobiho, 229
- kompaktnost implikuje separabilitu, 128
- Lagrangeova nutná podmínka, 211
- Lagrangeova nutná podmínka pro integrální funkcionál, 226

- Lagrangeova postačující podmínka, 212, 228
- Legendreova postačující podmínka, 227
- Lindelöfova pokrývací, 129
- nutná podmínka existence potenciálu, 165
- nutná podmínka konvergence řady, 65
- nutná podmínka pro integrační faktor, 169
- nutná podmínka pro lokální extrém, 188
- nutná podmínka řešení E.–L. rovnice pro autonomní úlohu, 224
- o derivaci implicitní funkce základní verze, 172
- o dvou strážnících, 135
- o ekvivalentních normách v konečné dimenzi, 114
- o globální existenci a jednoznačnosti řešení lineární ODR n -tého řádu, 34
- o charakterizaci absolutní a neabsolutní konvergence, 80
- o charakterizaci konvergence nekonečných součinů, 87
- o charakterizaci vnitřku a uzávěru pomocí inkluze, 118
- o implicitní funkci, 177
- základní verze, 170
- o inverzi
 - globální verze, 205
 - lokální verze, 204
- o konvergenci aritmetických průměrů, 83
- o konvergenci mocinné řady, 89
- o Lagrangeových multiplikátorech, 197
 - pro funkcionály, 239
- o limitě složeného zobrazení, 134
- o nabývání extrémů na kompaktu, 135
- o nejednoznačnosti potenciálu na oblasti, 165
- o postačující podmínce globálního

minima, 242
o postačující podmínce pro existenci totálního diferenciálu, 155
o prostoru řešení homogenní rovnice, 37
o přerovnání absolutně konvergentní řady, 80
o regularitě minimizéru, 218
o řešení rovnice ve tvaru totálního diferenciálu, 181
o sjednocení a průniku otevřených a uzavřených množin, 116
o spojitém obrazu kompaktu, 137
o spojitosti složeného zobrazení, 134
o střední hodnotě, 160
o vzoru otevřených množin spojitých zobrazení, 136
o vztahu hromadných a hraničních bodů, 119
o vztahu mocninných a Taylorových řad, 94
o vztahu wronskiánu a lineární nezávislosti řešení lineární ODR, 40
o záměnnosti parciálních derivací, 161
Peanova o existenci řešení ODR, 7, 146
Picard–Lindelöfova o existenci a jednoznačnosti řešení ODR, 7, 142
postačující podmínka existence potenciálu, 165
postačující podmínka pro konvexní funkcionál, 213
postačující podmínka pro lokální extrém, 190
Riemannova o přerovnání neabsolutně konvergentní řady, 80
Weierstrassova aproximační, 139

kontraktivní, 131
pevný bod, 131
regulární, 203

W

wronskián, 38
derivace, 39

Z

zobrazení