

## 5. cvičení

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kuncova/>, [kytaristka@gmail.com](mailto:kytaristka@gmail.com)

### Teorie

**Věta 1** (Lagrangeovy multiplikátory). Nechť  $G \subset \mathbb{R}^2$  je otevřená množina,  $f, g \in C^1(G)$ ,  $M = \{[x, y] \in G, g(x, y) = 0\}$  a  $[x_0, y_0] \in M$  je bodem lokálního extrému funkce  $f$  vzhledem k množině  $M$ . Pak je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

1.  $\nabla g(x_0, y_0) = (0, 0)$
2. existuje  $\lambda \in \mathbb{R}$  splňující  $\nabla f(x_0, y_0) + \lambda \nabla g(x_0, y_0) = (0, 0)$

**Věta 2** (Lagrangeovy multiplikátory 2). Nechť  $G \subset \mathbb{R}^n$  je otevřená množina,  $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(G)$ ,  $m < n$ ,  $M = \{\mathbf{x} \in G, g_1(\mathbf{x}) = 0, g_2(\mathbf{x}) = 0, \dots, g_m(\mathbf{x}) = 0\}$  a  $\mathbf{x}_0 \in M$  je bodem lokálního extrému funkce  $f$  vzhledem k množině  $M$ . Pak je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

1. vektory  $\nabla g_1(\mathbf{x}_0), \nabla g_2(\mathbf{x}_0), \dots, \nabla g_m(\mathbf{x}_0)$  jsou lineárně závislé,  
Jeden vektor je lineárně závislý, jestliže je nulový, dva vektory jsou lineárně závislé, jestliže jeden je násobek druhého.
2. existují  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_m \in \mathbb{R}$  splňující  $\nabla f(\mathbf{x}_0) + \lambda_1 \nabla g_1(\mathbf{x}_0) + \lambda_2 \nabla g_2(\mathbf{x}_0) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ .

### Algoritmus na uzavřených množinách:

Úvaha: spojitá funkce na uzavřené omezené množině vždy nabývá maxima a minima.

1. Otestujeme vnitřek množiny - najdeme stacionární body
2. Otestujeme hranici - Lagrangeovými multiplikátory nebo dosazením na funkci jedné proměnné
3. Otestujeme krajní body hranice
4. Funkční hodnoty všech těchto bodů porovnáme

### Příklady

1. Najděte globální extrémy funkcí na množině  $M$ 
  - (a)  $f(x, y, z) = x - 2y - 2z$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$
  - (b)  $f(x, y) = x^2 + y$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$
  - (c)  $f(x, y) = 4x + 3y - 4$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1\}$
  - (d)  $f(x, y, z) = x - y + 3z$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 4z^2 = 4\}$
  - (e)  $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 1, x^2 + y^2 = 1\}$
  - (f)  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : 2x + 6y = 20\}$
  - (g)  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 - 6xy + 5y^2 - 4\}$

### Zkouškové příklady

2. Najděte globální extrémy funkcí na množině  $M$

- (a)  $f(x, y, z) = xy + yz$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 1\}$
- (b)  $f(x, y, z) = z + e^{xy}$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 = z^2\}$
- (c)  $f(x, y, z) = x^2 + 2xz + y^2 + z$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = y^2 + z^2\}$

3. Najděte globální extrémy funkcí na množině  $M$

- (a)  $f(x, y) = x^4 y$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x^4 + y^4 \leq 16, x \geq -1\}$
  - (b)  $f(x, y) = 2x + 4y$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$
  - (c)  $f(x, y, z) = e^{-z^2}(x^2 + y^2 + xy)$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, |z| \leq 1\}$
  - (d)  $f(x, y, z) = xy + yz$ ,  $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 1\}$
  - (e)  $f(x, y) = (x^2 + 7y^2)e^{-(2x^2 + y^2)}$ ,  $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 \leq 1\}$
4. Určete maximální možný objem kvádrů, jehož hrany jsou rovnoběžné se souřadnými osami, jeden jeho vrchol leží v počátku a diagonálně protilehlý vrchol leží v množině  $M = \{[x, y, z], x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 4x + 2y + z = 2.\}$

### Bonusové příklady

5. Farmář a fařmářka mají 100 m pletiva a rádi by oplotili pozemek pro ovce. Trvají na tom, že pozemek bude mít tvar obdélníku. Ježto je u řeky, stačí jej oplotit ze 3 stran. Jaké bude zadání za pomoci Lagrangeových multiplikátorů?

- (a)  $f(x, y) = xy$ ,  $g(x, y) = 2x + y - 100$
- (b)  $f(x, y) = 2x + 2y - 100$ ,  $g(x, y) = xy$
- (c)  $f(x, y) = xy$ ,  $g(x, y) = x + y - 100$
- (d)  $f(x, y) = x + y$ ,  $g(x, y) = xy - 100$

6. Ve kterém z bodů  $A, B, C, D$  se nachází minimum funkce  $f(x, y) = y$  vzhledem ke křivce na obrázku?

