

(1a)

$$y^1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} -x^2 \\ 2x \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} 1-2 & -1 & x^2 \\ 1 & 3-2 & -2x \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1-2 & -1 & x^2 \\ 0 & \underbrace{-1+(3-2)(2-1)}_{-2^2+4 \cdot 2 - 4} & \underbrace{x^2 - 2x(2-1)}_{x^2+2x-2 \cdot (2x)} \end{array} \right)$$

$$y_2: \quad \begin{aligned} 1^2 - 4 \cdot 2 + 4 &= 0 \\ (2-2)^2 &= 0 \end{aligned} \quad y_{2,4} = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$$

$$\lambda = 2$$

$0+0i$  neu! losen

$$\rightarrow y_{2p} = Ax^2 + Bx + C$$

$$-4y''_{2p} + 4y'_{2p} - 4y_{2p} = x^2 + 2x - 2$$

$$-4Ax^2 + x(8A - 4B) + 4B - 4C - 2A = x^2 + 2x - 2$$

$$\underline{A = -\frac{1}{4}}$$

$$-2 - 4B = 2$$

$$\underline{B = -1}$$

$$-4 - 4C + \frac{1}{2} = -2 \quad \underline{C = -\frac{3}{8}}$$

$$\underline{C = -\frac{3}{8}}$$

$$y_2 = \underline{c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}} - \underline{\frac{x^2}{4}} - x - \underline{\frac{3}{8}}$$

$$y_1 = -2x - (3-2)y_2$$

$$y_1 = -2x - 3y_2 + y_2'$$

$$y_1 = \underline{-c_1 e^{2x} - c_2 e^{2x} x} + \underline{c_2 e^{2x}} + \underline{\frac{3}{4} x^2} + \underline{\frac{x}{2}} + \underline{\frac{1}{8}}$$

$$c_1, c_{1,2} \in \mathbb{Q}$$

Od druhého řádku odečteme třetí řádek a poté od třetího řádku odečteme  $(\lambda - 4)$ -násobek druhého řádku

$$\sim \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & 1 \\ \lambda^2 + 2 & 1 & 0 \\ -\lambda^2 - \lambda - 7 & \lambda - 4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & 1 \\ \lambda^2 + 2 & 1 & 0 \\ -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

V posledním řádku máme nyní rovnici  $-x''' + 3x'' - 3x' + x = 0$ , v matici je tedy rovnou charakteristický polynom této rovnice. Dostáváme tedy řešení

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 t^2 e^t, \quad t \in \mathbb{R}, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Z druhého řádku matice dopočítáme  $y$ :

$$y(t) = -x'' - 2x = -e^t(3c_1 + 2c_2 + 2c_3 + t(3c_2 + 4c_3) + t^2 \cdot 3c_3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Z první rovnice dopočítáme  $z$ :

$$z(t) = e^t(-2c_1 - 3c_2 - 2c_3 + t(-2c_2 - 6c_3) + t^2 \cdot (-2c_3)), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Příklad 3.** Řešte soustavu

$$\begin{aligned} 2y'' + 3z'' - 7y - 6z &= t + 1 \\ 4y'' + 3z'' - 4y - 3z &= 2t. \end{aligned}$$

*Řešení.* Napíšeme si  $\lambda$ -matici s pravou stranou:

$$\begin{aligned} \left( \begin{array}{cc|c} 2\lambda^2 - 7 & 3\lambda^2 - 6 & t + 1 \\ 4\lambda^2 - 4 & 3\lambda^2 - 3 & 2t \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{cc|c} 2\lambda^2 - 7 & 3\lambda^2 - 6 & t + 1 \\ 2\lambda^2 + 3 & 3 & t - 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left( \begin{array}{cc|c} 2\lambda^2 - 7 - (\lambda^2 - 2)(2\lambda^2 + 3) & 0 & t + 1 - (t - 1)^2 + 2(t - 1) \\ 2\lambda^2 + 3 & 3 & t - 1 \end{array} \right) \\ &= \left( \begin{array}{cc|c} -2\lambda^4 + 3\lambda^2 - 1 & 0 & 3t - 1 \\ 2\lambda^2 + 3 & 3 & t - 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Řešení charakteristického polynomu v prvním řádku jsou  $\lambda_{1,2} = \pm 1$ ,  $\lambda_{3,4} = \pm \sqrt{2}/2$ . Tedy řešení homogenní rovnice

$$-2y^{(4)} + 3y'' - y = 0$$

jsou

$$ae^t + be^{-t} + ce^{\sqrt{2}/2t} + de^{-\sqrt{2}/2t}.$$

Partikulární řešení nehomogenní rovnice bude ve tvaru  $y_p(t) = rt + s$ , což po dosazení do rovnice dává  $y_p(t) = -3t + 1$ . Tedy

$$y(t) = ae^t + be^{-t} + ce^{\sqrt{2}/2t} + de^{-\sqrt{2}/2t} - 3t + 1.$$

Z druhé rovnice pak máme

$$\begin{aligned} 3z(t) &= t - 1 - 2y'' - 3y = t - 1 - 2(ae^t + be^{-t} + \frac{1}{2}ce^{\sqrt{2}/2t} + \frac{1}{2}de^{-\sqrt{2}/2t}) \\ &\quad - 3(ae^t + be^{-t} + ce^{\sqrt{2}/2t} + de^{-\sqrt{2}/2t} - 3t + 1) \\ &= 10t - 4 - 5ae^t - 5be^{-t} - 4ce^{\sqrt{2}/2t} - 4de^{-\sqrt{2}/2t}. \end{aligned}$$

(2a)

$$y_1' = y_1 - y_2 - x \quad y(0) = (0, 0)^T$$

$$y_2' = y_1 + y_2.$$

$$\xrightarrow{+} \left( \begin{array}{cc|c} 1-\lambda & -1 & +x \\ -\lambda & 1-\lambda & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 0 & -1 + (1-\lambda)(\lambda-1) & x \\ 1 & \lambda-1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} y_1 & y_2 \\ 0 & -\lambda^2 + 2\lambda - 1 - 1 & x \\ 1 & \lambda - 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\hookrightarrow -y_2'' + 2y_2' - 2y_2 = x \quad y_{2P} = c_1 e^{ix} \sin x + c_2 e^{ix} \cos x$$

$$-\lambda^2 + 2\lambda - 2 = 0 \quad \text{Spec. Ps.}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \quad x = e^{ix} (\cos 0x + 0 \sin 0x)$$

$$\lambda = 1 \pm i \quad 0+0i \text{ merklich}$$

$$\text{bedeute freiem Raum} \quad y_{20} = Ax + B$$

$$y_{2P}' = A$$

$$y_{2P}'' = 0$$

$$A = -\frac{1}{2} \quad -1 - 2B = 0$$

$$B = -\frac{1}{2}$$

$$y_2 = \underline{\underline{c_1 e^{ix} \sin x + c_2 e^{ix} \cos x - \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}}$$

$$y_1 + (1-\lambda)y_2 = 0$$

$$\downarrow$$

$$y_1 = y_2' - y_2$$

$$y_1 = \underline{\underline{c_1 e^{ix} \cos x - c_2 e^{ix} \sin x + \frac{x}{2}}}$$

$$\text{Probe: } 0 = c_2 - \frac{1}{2} \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2}$$

$$0 = c_1$$

$$\text{bedeute } y_1 = -\frac{1}{2} c_1 e^{ix} \sin x + \frac{x}{2}$$

$$y_2 = \underline{\underline{\frac{1}{2} c_1 e^{ix} \cos x - \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}}$$

xclp

(2b)

$$y_1' = y_2 + \sin x$$

$$y_2' = -y_1 + \cos x$$

$$\xrightarrow{(+)} \left( \begin{array}{cc|c} \lambda & -1 & \sin x \\ 1 & 1 & \cos x \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 0 & -1-\lambda^2 & \sin x - \lambda \cos x \\ 1 & 1 & \cos x \end{array} \right)$$

$$-y_2 - y_2'' = \underbrace{\sin x - (\cos x)'}_{2 \sin x} \quad y_{2P} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$-1 - \lambda^2 = 0 \quad \lambda = \pm i$$

$$-1 = \lambda^2$$

PS:  $2 \sin x = e^{ix} (0 \cos ix + 2 \sin ix)$   
*i je Ionen*

$$y_{2P} = x (A \cos x + B \sin x)$$

Insatz:

$$2A \sin x - 2B \cos x = 2 \sin x$$

$$B=0 \quad A=1$$

$$y_2 = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \underline{\underline{x \cos x}}$$

$$y_1 = \cos x - y_2'$$

$$y_1 = x \sin x + \underline{C_1 \sin x - C_2 \cos x}$$

$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

(2c)

$$\begin{aligned}y_1' &= y_1 + 2y_2 + \sin x & y(0) &= (0, 0) \\y_2' &= -y_1 - y_2\end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\text{R2} \rightarrow} \left( \begin{array}{cc|c} 1-\lambda & 2 & -\sin x \\ -1 & -1-\lambda & 0 \\ \hline & & -(\lambda+1) \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 0 & 2+(\lambda+1)(1-\lambda) & -\sin x \\ 1 & 1+\lambda & 0 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} 0 & \lambda^2 + 1 & -\sin x \\ 1 & 1+\lambda & 0 \end{array} \right)$$

$$y_2: \quad \lambda^2 + 1 = 0 \quad y_{2u} = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

$$\lambda = \pm i$$

$$\text{Spec. PS: } -\sin x = e^{0x} (0 \cos 1x - 1 \sin 1x) \\ 0 + 1i \quad \text{je f-ueh. lösung}$$

$$y_p = x^1 (A \cos x + B \sin x)$$

$$y_p'' + y_p = -\sin x$$

$$y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2} x \cos x$$

$$-2A \sin x + 2B \cos x = -\sin x$$

$$\Rightarrow B=0 \quad A=\frac{1}{2}$$

$$\text{Par 2} \quad y_1 = -y_2 - y_2'$$

$$y_1 = (-c_2 + c_1) \sin x + (-c_1 - c_2) \cos x + \frac{-1}{2} (x \cos x + \cos x - x \sin x)$$

Folger.

$$0 = c_1$$

$$c_2 = -\frac{1}{2}$$

$$0 = -c_2 - \frac{1}{2}$$

$$\text{Lösungen} \quad y_1 = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} (x \cos x + \cos x - x \sin x)$$

$$y_2 = -\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} x \cos x$$

x610

(2d)

$$u' = 4u + 3v - 3w$$

$$v' = -3u - 2v + 3w$$

$$w' = 3u + 3v - 2w + 2e^{-x}$$

$$\begin{array}{l} \text{3.} \\ \text{+} \\ \text{(4-3).} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} u & v & w & \\ 4-\lambda & 3 & -3 & 0 \\ -3 & -2-\lambda & 3 & 0 \\ 3 & 3 & -2-\lambda & -2e^{-x} \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 4-\lambda & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 9-(2+\lambda)(4-\lambda) & -9+12-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & -2e^{-x} \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2e^{-x} \end{array} \right) \cdot (-3)$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 4-\lambda & 3 & -3 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 3(1-\lambda) & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 - 3(1-\lambda) & 0 & 6e^{-x} \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 4-\lambda & 3 & -3 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 3(1-\lambda) & 0 \\ 0 & \underbrace{(\lambda-1)(\lambda+2)}_{\lambda^2 + \lambda - 2} & 0 & 6e^{-x} \end{array} \right)$$

$$v: (\lambda-1)(\lambda+2) = 0 \quad w_4 = c_1 e^{\lambda x} + c_2 e^{-2x}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -2$$

$$ps: 6e^{-x} = e^{-x}(6 \cos 0x + 0 \sin 0x)$$

$$v_p = A e^{-x}$$

-1+0i new lösbar

$$v' + v - 2v = 6e^{-x}$$

$$-2Ae^{-x} = 6e^{-x} \quad A = -3$$

$$v = \underline{c_1 e^{\lambda x} + c_2 e^{-2x} - 3e^{-x}}$$

$$w: 3w - 3w' = -v'' + 2v' - v$$

$$k' = -e^{-x}(4e^{-x} - 3c_2 e^{-2x})$$

$$-w' + w = \frac{1}{3}(2e^{-x} - 3c_2 e^{-2x})$$

$$k = e^{-3x}(2e^{-x} - c_2) + c_3$$

$$\text{variance konstant } w_4 = k e^{-x}$$

$$-k'e^{-x} - ke^{-x} + k^2 e^{-x} = 4e^{-x} - 3c_2 e^{-2x}$$

$$w = \underline{2e^{-x} - c_2 e^{-2x} + c_3 e^{-x}}$$

$$u: -3u = (2+1)v - 3w$$

$$u = -\frac{1}{3}(2v + v' - 3w)$$

$$u = \underline{-e^x(c_1 - c_3) + e^{2x}(-c_2) + 3e^{-x}}$$

$$\lambda_1 e_{n-2} \in \Phi$$

(2e)

$$u' = u + v + z + w$$

$$v' = u + v + z + w + 1$$

$$z' = u + v + z + w + 2$$

$$w' = u + v + z + w + 3$$

$$\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1-\lambda & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{(1-1)}} \sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & (1-\lambda)(2-\lambda) & 1 & (1-\lambda)^2 & -(\lambda-1) \\ 0 & \lambda & -\lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda & -1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda^2+2\lambda & 1 & 1 & 1-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2+2\lambda+\lambda & 1 & -\lambda+1-\lambda+2 \\ 0 & 0 & \lambda & -\lambda & -1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda^2+2\lambda & 1 & 1 & 1-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2+2\lambda+\lambda & \lambda & -2\lambda+3 \\ 0 & 0 & -\lambda^2+4\lambda-3(1-\lambda) & 0 & -2\lambda+2 \end{array} \right)$$

determinante

$$-(z'' + 4z') = +1$$

$$+\lambda(-\lambda+4) = 0$$

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 4$$

$$-1 = e^{0x} (-1 \cos 0x + 0 \sin 0x)$$

0+0i ist lösbar

$$z_p = Ax$$

$$z'_p = 4$$

$$z''_p = 0$$

$$4A = +1 \quad A = \frac{1}{4}$$

$$\underline{z = c_1 + c_2 e^{4x} + \frac{x}{2}}$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = -1$$

$$w' = 4c_2 e^{4x} + \frac{3}{2}$$

$$4c_2 e^{4x} + \frac{1}{2} + 1 = w'$$

$$w = \underline{c_2 e^{4x} + \frac{3}{2}x + c_3}$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 = -1$$

$$v' = -1 + z'$$

$$v' = 4c_2 e^{4x} - \frac{1}{2}$$

$$v = \underline{c_2 e^{4x} - \frac{1}{2}x + c_4}$$

$$u - u' = -v - z - w$$

$$-u' + u = -\cancel{c_2 e^{4x}} + \cancel{\frac{1}{2}x} - c_4 - c_1 - \cancel{c_2 e^{4x}} - \cancel{\frac{1}{2}x} - \cancel{c_2 e^{4x}} - \cancel{\frac{3}{2}x} - c_3$$

$$-u' + u = -3c_2 e^{4x} - \frac{3}{2}x - (c_1 + c_3 + c_4)$$

integri. faktor

$$u' - u = c_2 e^{4x} + \frac{3}{2}x + (c_1 + c_3 + c_4) \quad | \cdot e^{-x}$$

$$(u e^{-x})' = 3c_2 e^{3x} + \frac{3}{2}x e^{-x} + (c_1 + c_3 + c_4) e^{-x}$$

$$u e^{-x} = c_2 e^{3x} - (c_1 + c_3 + c_4) e^{-x} - \frac{3}{2} e^{-x} - \frac{3}{2} e^{-x}$$

$$u = \underline{c_2 e^{4x} - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} - c_1 - c_3 - c_4}$$