

**5.6.38. Příklad.** Spočtěte derivaci funkce  $f(x) = x^{\log x}$ ,  $x \in (0, \infty)$ .

*Řešení.* Podle definice obecné mocniny (Definice 6.1.7(c)) platí pro každé  $x \in (0, \infty)$  vztah  $f(x) = e^{\log x \cdot \log x} = e^{\log^2 x}$ . Derivaci spočteme pomocí věty o derivování složené funkce (Věta 5.1.23), tedy

$$f'(x) = e^{\log^2 x} \cdot (\log^2 x)' = e^{\log^2 x} \cdot 2 \log x \cdot \frac{1}{x}, \quad x \in (0, \infty).$$

Pro definiční obor derivace platí  $\mathcal{D}(f') = (0, \infty)$ . ♣

(1a)

**5.6.39. Příklad.** Spočtěte derivaci funkce  $f(x) = \arccos(1 - x^2)$ .

*Řešení.* Vzhledem k tomu, že  $\mathcal{D}(\arccos) = [-1, 1]$  a reálné číslo  $x$  splňuje nerovnost

$$-1 \leq 1 - x^2 \leq 1$$

právě tchdy, když  $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , je  $\mathcal{D}(f) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ . Podle věty pro derivaci složené funkce (Věta 5.1.23), kterou lze použít pro každé  $x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \setminus \{0\}$ , dostáváme

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-1}{\sqrt{1 - (1 - x^2)^2}} (1 - x^2)' = \frac{-1}{\sqrt{2x^2 - x^4}} (-2x) \\ &= \frac{2 \operatorname{sign} x}{\sqrt{2 - x^2}}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

Funkce  $f$  je na svém definičním oboru spojitá, a proto se můžeme pokusit jednostranné limity v bodech množiny  $\{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$  počítat jako limity jednostranných derivací podle věty o limitě derivací (Věta 5.2.10). Dostaneme tak

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \operatorname{sign} x}{\sqrt{2 - x^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \\ f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \operatorname{sign} x}{\sqrt{2 - x^2}} = -\sqrt{2}, \\ f'_+(-\sqrt{2}) &= \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}^+} \frac{2 \operatorname{sign} x}{\sqrt{2 - x^2}} = -\infty, \\ f'_-(\sqrt{2}) &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} \frac{2 \operatorname{sign} x}{\sqrt{2 - x^2}} = \infty. \end{aligned}$$

Definičním oborem  $f'$  je tedy množina  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \setminus \{0\}$ , přičemž hodnoty jednostranných derivací ve zbývajících bodech definičního oboru  $f$  jsou uvedeny výše. ♣

**5.6.40. Příklad.** Dokažte, že pro všechna  $x \neq 0$  platí

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} x.$$

Platí tedy  $\mathcal{D}(f') = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $f'(0)$  neexistuje, ale platí  $f'_+(0) = 1$  a  $f'_-(0) = -1$ . ■

(14)

**5.6.36. Příklad.** Spočtěte derivaci funkce  $f(x) = \min\{x, x^3\}$  v každém bodě  $x \in \mathbb{R}$ , ve kterém existuje. Pokud v některých bodech derivace neexistuje, vyšetřete existenci jednostranných derivací a pokud existují, spočtěte je.

*Řešení.* Funkci  $f$  můžeme vyjádřit ve tvaru

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{pro } x \in (-\infty, -1] \cup [0, 1], \\ x & \text{pro } x \in [-1, 0] \cup [1, \infty). \end{cases}$$

Tedy zřejmě platí

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{pro } x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1), \\ 1 & \text{pro } x \in (-1, 0) \cup (1, \infty). \end{cases}$$

Zbývá vyšetřit derivaci v bodech  $x = 0, \pm 1$ . Protože funkce  $f$  je spojitá v bodě  $-1$ , platí podle věty o limitě derivací (Věta 5.2.10)

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} 3x^2 = 3, \quad f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 = 1.$$

Odtud plyne, že  $f'(-1)$  neexistuje. Podobně lze odvodit, že  $f'(0)$  a  $f'(1)$  neexistují a že platí

$$f'_-(0) = 1, \quad f'_+(0) = 0, \quad f'_-(1) = 3, \quad f'_+(1) = 1.$$

(15)

F

**5.6.37. Příklad.** Spočtěte derivaci funkce

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} & \text{pro } x \neq 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0. \end{cases}$$

*Řešení.* Zřejmě platí  $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$ . Pro  $x \neq 0$  platí, že funkce  $f$  je na jistém okolí bodu  $x$  definována předpisem  $x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ . Derivace v bodě je lokální pojem (Poznámka 5.1.6(e)), a proto pro  $x \neq 0$  platí

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( x^2 \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right)' = (x^2)' \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + x^2 \left( \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right)' \\ &= 2x \sin \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}. \end{aligned}$$

V bodě  $x = 0$  spočteme derivaci podle definice

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{\sqrt[3]{h}} - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{\sqrt[3]{h}} = 0. \end{aligned}$$

Poslední rovnost plyne z Věty 4.2.15, neboť funkce sinus je omezená. Platí tedy  $f'(0) = 0$  a  $\mathcal{D}(f') = \mathbb{R}$ .

L

# Derivace 2

## 22. cvičení

Matematická analýza 1, NMMA101, Ondřej Bouchala

### Řešení:

3.  $f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$ . Výpočtem zjistíme, že zadaná funkce je definovaná na celém  $\mathbb{R}$ . Navíc pro všechna nenulová  $x$  je  $\frac{1-x^2}{1+x^2} \in (-1, 1)$ . Tedy pro  $x \neq 0$  můžeme použít vzorec pro derivaci složené funkce, dostaneme

$$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}}} \cdot \frac{-2x(1+x^2) - (1-x^2)2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2|x|}{x^3 + x}$$

(nezapomeneme, že  $\sqrt{x^2} \neq x$ ). Zbývá vyšetřit, jaká je derivace v nule. Snadno se přesvědčíme, že je  $f$  v nule (a všude jinde) spojitá, a tedy můžeme použít Větu o spojitosti derivace.

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2|x|}{x^3 + x} = 2 \\ f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2|x|}{x^3 + x} = -2 \end{aligned}$$

Tedy v nule derivace neexistuje.

4.  $f(x) = x^2 \exp(-|x-1|)$ . Chceme použít vzorec pro derivaci složené funkce. K tomu je třeba, aby  $-|x-1|$  mělo derivaci. Tu má pro všechna  $x \neq 1$ . Tedy pro  $x > 1$  jest

$$f'(x) = -e^{1-x} x(x-2)$$

a pro  $x < 1$  máme

$$f'(x) = e^{x-1} x(x+2)$$

Snadno ověříme, že je funkce  $f$  v 1 spojitá. Tedy můžeme použít větu o spojitosti derivace, dostaneme

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} -e^{1-x} x(x-2) = 1 \\ f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{x-1} x(x+2) = 3 \end{aligned}$$

Tedy v 1 nemá  $f$  derivaci.

5.  $f(x) = \frac{\sin x}{\sin(x+\frac{\pi}{4})}$ . Zde si nejprve uvědomíme, že v bodech  $-\frac{\pi}{4} + k\pi$  není  $f$  definovaná,

Je-li  $p \in \mathbb{R}_+$  a splňuje-li množina  $M \subset \mathbb{R}$  podmítku  $x \in M \Rightarrow x \pm p \in M$ , říkáme, že funkce  $f$  definovaná v  $M$  je  $p$ -**periodická** (nebo že má **periodu**  $p$ ), platí-li pro každé  $x \in M$  rovnost  $f(x \pm p) = f(x)$ .

Při počítání derivací nám část práce mohou ušetřit tato tři tvrzení:

**Věta 5.8.** Sudá nebo lichá funkce  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  je v bodě  $a \in M$  spojitá zprava (zleva), právě když je spojitá v bodě  $-a$  zleva (zprava).

**Důsledek.** Sudá nebo lichá funkce  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá v bodě  $a \in M$ , právě když je spojitá v bodě  $-a$ .

**Věta 5.9.** Je-li  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  sudá (lichá) funkce a je-li  $a \in M$ , je  $f'_+(a) = -f'_-(-a)$  ( $f'_+(a) = f'_-(-a)$ ), má-li jedna strana rovnosti smysl.

**Důsledek.** Je-li sudá (lichá) funkce  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  diferencovatelná v  $M$ , je  $f'$  funkce lichá (sudá).

**Věta 5.10.** Nechť  $p \in \mathbb{R}_+$  a nechť  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  je  $p$ -periodická funkce; pak platí tato dvě tvrzení:

1. Je-li  $f$  spojitá v bodě  $a \in M$  zleva (zprava, oboustranně), platí totéž v každém bodě  $a + np$ , kde  $n \in \mathbb{Z}$ .

2. Pro každé  $a \in M$  a každé  $n \in \mathbb{Z}$  je  $f'_+(a) = f'_+(a + np)$ ,  $f'_-(a) = f'_-(a + np)$ ,  $f'(a) = f'(a + np)$ , má-li jedna strana příslušné rovnosti smysl.

### Příklad 5.5. Funkce

$$(13) \quad f(x) := \sqrt[3]{\sin x}$$

(1e) je spojitá v celém  $\mathbb{R}$ , ale V.5.4 lze aplikovat jen v bodech  $x \not\equiv 0 \pmod{\pi}$ , protože  $(\text{Id}^{1/3})'(0) = +\infty$  a V.5.4 předpokládá diferencovatelnost. Protože

$$(14) \quad f'(x) = \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{\sin^2 x}} \quad \text{pro všechna } x \notin \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\},$$

protože  $\lim_{x \rightarrow n\pi} \cos x = \cos n\pi = (-1)^n$  a protože  $\sqrt[3]{\sin^2 x}$  konverguje k 0 pro  $x \rightarrow n\pi$  a je kladná všude kromě bodů  $n\pi$ , je podle V.5.5

$$(15) \quad f'(n\pi) = \lim_{x \rightarrow n\pi} f'(x) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases} \quad \text{pro všechna } n \begin{cases} \text{sudá} \\ \text{lichá} \end{cases}.$$

**Příklad 5.6.** Jednostranné derivace  $\pi$ -periodické funkce  $f(x) := \sqrt[3]{|\sin x|}$  lze v bodě 0 počítat přímo z definice:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt[3]{\sin x}}{x} = +\infty, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \left( -\frac{\sqrt[3]{\sin x}}{x} \right) = -\infty;$$

podle V.5.10 je v důsledku toho  $f'_+(n\pi) = +\infty$ ,  $f'_-(n\pi) = -\infty$  pro každé  $n \in \mathbb{Z}$ .

### Příklad 5.7. Funkce

$$(16) \quad f(x) := \lg(|x| - \sqrt{x^2 - 1})$$

**Příklad 4.10.** Vypočtěte derivaci funkce  $f(x) = \arcsin \frac{1-x^2}{1+x^2}$ .

**Řešení.** Zde může být trochu nejasná otázka definičního oboru. Napíšeme-li však nerovnosti

$$\begin{aligned} -1 &\leq \frac{1-x^2}{1+x^2} \leq 1 & | \cdot (1+x^2), \\ -1-x^2 &\leq 1-x^2 \leq 1+x^2, \end{aligned}$$

vidíme ihned, že poslední nerovnost platí pro všechna reálná  $x$  a že tedy  $D_f = (-\infty, +\infty)$ . Vnitřní funkce  $\frac{1-x^2}{1+x^2}$  má zřejmě vlastní derivaci v každém bodě z intervalu  $(-\infty, +\infty)$ . Bohužel však vnější funkce  $\arcsin y$  má nevlastní (jednostranné) derivace v bodech  $-1$  a  $1$ . Při použití věty o derivaci složené funkce se tedy musíme omezit na ta  $x$ , pro která  $\frac{1-x^2}{1+x^2} \neq \mp 1$ . Je

$$\begin{aligned} \frac{1-x^2}{1+x^2} &= \mp 1 & | \cdot (1+x^2), \\ 1-x^2 &= \mp(1+x^2), \\ x &= 0. \end{aligned}$$

Vidíme tak, že derivaci funkce  $f(x)$  můžeme podle věty o derivaci složené funkce vypočítat pro všechna  $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ . Máme

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( \arcsin \frac{1-x^2}{1+x^2} \right)' = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}} \cdot \left( \frac{1-x^2}{1+x^2} \right)' = \\ &= \sqrt{\frac{(1+x^2)^2}{1+2x^2+x^4-1+2x^2-x^4}} \cdot \frac{-2x(1+x^2)-(1-x^2)\cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \\ &= \frac{1+x^2}{2|x|} \cdot \frac{-2x \cdot 2}{(1+x^2)^2} = -\frac{2x}{|x|(1+x^2)} = -\frac{2 \operatorname{sign} x}{1+x^2}. \end{aligned}$$

Funkce  $f(x)$  je očividně spojitá v bodě  $0$  (a tedy je spojitá v bodě  $0$  jak zleva, tak i zprava) a dále platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left( -\frac{2 \operatorname{sign} x}{1+x^2} \right) = 2, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( -\frac{2 \operatorname{sign} x}{1+x^2} \right) = -2. \end{aligned}$$

Podle věty o limitě derivace je tedy  $f'_-(0) = 2$  a  $f'_+(0) = -2$ . Oboustranná derivace  $f'(0)$  tedy neexistuje (viz Věta 4.3). ▲

**Příklad 4.11.** Vypočtěte derivaci funkce  $f(x) = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$ , kde  $a > 0$  je konstanta.

**Řešení.** Snadno zjistíme, že  $D_f = (-a, a)$ , ale že podle Věty 4.1 a 4.2 je možno derivaci počítat pouze na otevřeném intervalu  $(-a, a)$ . Zde platí

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \cdot (-2x) + \frac{a^2}{2} \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}} \cdot \frac{1}{a} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{x^2}{2\sqrt{a^2 - x^2}} + \frac{a^2}{2\sqrt{a^2 - x^2}} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2 - x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sqrt{a^2 - x^2}. \end{aligned}$$

Z (1) a (2) plyne  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n+1)}{n^2} = 0$ . Odtud, z (3) a z věty o aritmetice limit plyne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + \sin(n+1)) \cdot (\sqrt{n^4 + 2} - \sqrt{n^4 + 1}) = \frac{1}{2}.$$

**Příklad B2 :** Použijeme Lebnizova kritéria. Ověřme jeho předpoklady:

- (1) řada má požadovaný tvar,
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{3} - 1) = 0$ ,
- (3)  $\forall n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{3} - 1 \geq \sqrt[n+1]{3} - 1$  (lze snadno odvodit ze zřejmé nerovnosti  $3^{n+1} \geq 3^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ).

Řada tedy konverguje.

**Příklad B3 :** Pišme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\arcsin x}}{\tg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\arcsin x}}{x} \cdot \frac{x}{\tg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\arcsin x}}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tg x}.$$

Víme, že  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tg x} = 1$ . Zabývejme se teď první limitou ve výše uvedeném součinu limit.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\arcsin x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - 1}{\sin 2x} \cdot \frac{\sin 2x}{x} - \frac{e^{\arcsin x} - 1}{\arcsin x} \cdot \frac{\arcsin x}{x} = 2 - 1 = 1.$$

Použili jsme

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$ ,
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ,
- (3)  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$ ,
- (4) sin je prostá funkce na jistém okolí 0,
- (5) arcsin je prostá funkce,
- (6)  $x \mapsto 2x$  je prostá funkce,
- (7) větu o limitě složené funkce ve verzi s podmínkou (P1),
- (8) větu o aritmetice limit.

Dohromady tedy máme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\arcsin x}}{\tg x} = 1.$$

**Příklad B4 :** Funkce arctg i tg mají derivace všude ve svém definičním oboru. Máme tedy

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \tg^4 x} \cdot 2 \tg x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}; \quad x \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z};$$

po úpravě dostaneme

$$f'(x) = \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^4 x + \sin^4 x}; \quad x \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

2a

Platí také  $\lim_{x \rightarrow \pi/2+k\pi} f(x) = \pi/2$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , a  $f$  je tedy spojitá v každém bodě tvaru  $\pi/2 + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Spočtěme

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2+k\pi} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \pi/2+k\pi} \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^4 x + \sin^4 x} = 0.$$

Věta o výpočtu derivace pomocí limity derivace tedy dává (předpoklady jsou splněny!)  $f'(\pi/2 + k\pi) = 0$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Příklad B5 :** Snadno je vidět, že  $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$  a  $f$  je  $2\pi$  periodická a spojitá na  $\mathbb{R}$ . Spočtěme  $f'$ :

$$f'(x) = e^{\frac{2}{3} \sin x} \left( \frac{2}{3} \cos^2 x - \sin x \right), \quad x \in \mathbb{R}.$$


Prozkoumáme-li znaménko  $f'$  obdržíme:

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (5\pi/6, 13\pi/6) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (\pi/6, 5\pi/6) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{\pi/6, 5\pi/6\} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Funkce  $f$  je tedy rostoucí na intervalech tvaru  $(5\pi/6, 13\pi/6) + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Na intervalech tvaru  $(\pi/6, 5\pi/6) + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , je  $f$  klesající. Funkce  $f$  má v bodech  $\pi/6 + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , globální maxima a v bodech  $5\pi/6 + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , globální minima - toto vyplývá z výše uvedeného;  $\mathcal{H}(f) = \langle f(5\pi/6), f(\pi/6) \rangle$ . Funkce nemá žádné asymptoty.



2b

**Příklad D4 :** Zřejmě  $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$ . Platí  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$  pro  $x > 0$ . Vzhledem k tomu, že  $1 - e^{-x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ , tak pro každé  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  máme

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{e^{-x^2} 2x}{\sqrt{1 - e^{-x^2}}} = e^{-x^2} \frac{x}{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}.$$

V bodě 0 počítejme derivaci funkce  $f$  podle definice:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x}.$$

Výpočet poslední limity provedeme nejprve zprava a pak zleva.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{\frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2}}$$

Uvědomme si, že

- (1)  $\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{e^y - 1}{y} = 1$ ,
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 = 0$ ,
- (3)  $-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ,
- (4)  $\sqrt{\cdot}$  je spojitá na svém definičním oboru.

Z věty o limitě složené funkce, (1), (2) a (3) plyne  $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2} = 1$ . Odtud, z (4) a věty o limitě složené funkce obdržíme

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{\frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2}} = 1.$$

Obdobně dostaneme

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} -\sqrt{\frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2}} = -1.$$

Derivace funkce  $f$  v bodě 0 tedy neexistuje. Platí totiž  $f'_+(0) = 1$ ,  $f'_-(0) = -1$ .

**Příklad D5 :** Snadno zjistíme, že  $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Funkce  $f$  je sudá. Zkoumejme tedy funkci  $f$  zatím pouze na intervalu  $(0, +\infty)$ . Pak máme  $f(x) = (\log x)^3 - 3 \log x$ .

Spočtěme limity v „krajních bodech“.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \log x ((\log x)^2 - 3) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \log x ((\log x)^2 - 3) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty. \end{aligned}$$

Pro každé  $x > 0$  platí

$$f'(x) = \frac{3}{x} ((\log x)^2 - 1) \quad \text{a} \quad f''(x) = \frac{3}{x^2} (-(\log x)^2 + 2 \log x + 1).$$

Víme, že

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1,$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$
- (3)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$
- (4)  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$

Z  $(\star)$ , (1)–(4) a z věty o aritmetice limit vyplývá

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 2 \sin(\pi/6 + x)}{\operatorname{tg} x} = 1 - \sqrt{3}.$$

(2c)

**Příklad C4 :** Pro funkci  $f$  platí

$$f(x) = \begin{cases} -1/2, & x \in \langle 2\pi/3, 4\pi/3 \rangle + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \\ \cos x, & x \in ((\pi/3, 2\pi/3) \cup (4\pi/3, 5\pi/3)) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \\ 1/2, & x \in \langle -\pi/3, \pi/3 \rangle + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Z předchozího vyjádření vyplývá, že

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi/3, \pi/3) + k\pi, k \in \mathbb{Z}, \\ -\sin x, & x \in (\pi/3, 2\pi/3) + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Funkce  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$  a proto můžeme podle z předchozího vyjádření vypočítat jednostranné derivace jako příslušné limity derivací:

$$f'_+(\pi/3 + 2k\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi/3+2k\pi+} -\sin x = -\sin(\pi/3 + 2k\pi) = -\sqrt{3}/2,$$

$$f'_-(\pi/3 + 2k\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi/3+2k\pi-} 0 = 0,$$

$$f'_+(\pi/3 + 2k\pi) = 0,$$


$$f'_-(2\pi/3 + 2k\pi) = -\sin(2\pi/3 + 2k\pi) = -\sqrt{3}/2,$$

$$f'_+(4\pi/3 + 2k\pi) = -\sin(4\pi/3 + 2k\pi) = \sqrt{3}/2,$$

$$f'_-(4\pi/3 + 2k\pi) = 0,$$

$$f'_+(5\pi/3 + 2k\pi) = 0,$$

$$f'_-(5\pi/3 + 2k\pi) = -\sin(5\pi/3 + 2k\pi) = \sqrt{3}/2, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



**Příklad E2 :** Označme  $a_n = \sqrt{n^3 + 1} - \sqrt{n^3 - 1}$ . Platí:

$$a_n > 0 \text{ pro každé } n \in \mathbb{N} \text{ a } a_n = \frac{2}{\sqrt{n^3 + 1} + \sqrt{n^3 - 1}} < \frac{2}{n^{3/2}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Řada  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^{3/2}}$  konverguje a proto podle srovnávacího kritéria konverguje i vyšetřovaná řada.

**Příklad E3 :** Pišme

$$\left( \frac{2^x + 8^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left( \frac{1}{x} \cdot \log \left( \frac{2^x + 8^x}{2} \right) \right).$$

Spočítajme nejprve limitu

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\frac{2^x + 8^x}{2})}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\frac{2^x + 8^x}{2})}{\frac{2^x + 8^x}{2} - 1} \cdot \frac{2^x + 8^x - 2}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\frac{2^x + 8^x}{2})}{\frac{2^x + 8^x}{2} - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 8^x - 2}{2x} = 1 \cdot \log 4. \end{aligned}$$

Při výpočtu první limity jsme využili

- (1)  $\lim_{y \rightarrow 1} \frac{\log y}{y-1} = 1$ ,
- (2) výraz  $\frac{2^x + 8^x}{2}$  je na jistém okolí 0 různý od 1,
- (3) větu o limitě složené funkce.

Rovnost

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 8^x - 2}{2x} = \log 4$$

je možno odvodit pomocí l'Hospitalova pravidla nebo také takto:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 8^x - 2}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{2^x - 1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{8^x - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{x \log 2} - 1}{x \log 2} \cdot \log 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{x \log 8} - 1}{x \log 8} \cdot \log 8 \\ &= \frac{1}{2} (\log 2 + \log 8) = \log 4. \end{aligned}$$

Zde jsme užili větu o limitě složené funkce, známou limitu  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$ , prostotu zobrazení  $x \mapsto x \log 2$ ,  $x \mapsto x \log 8$  (viz podmínka (P1) ve větě o limitě složené funkce) a větu o aritmetice limit.

Předchozí výpočty spolu se spojitostí exponenciál dávají

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2^x + 8^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = 4.$$

**Příklad E4 :** Zkoumaná funkce je definována na celém  $\mathbb{R}$  a je na  $\mathbb{R}$  spojitá. Je-li  $x \neq 0$ , můžeme  $f'(x)$  vypočítat pomocí věty o derivaci složené funkce:

$$(2d) \quad f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{1}{(1+x^2)^2}}} \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2 \operatorname{sgn} x}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}}.$$

(20)

V 0 vypočítáme jednostranné derivace pomocí limity derivace (předpoklady příslušné věty jsou splněny):

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \operatorname{sgn} x}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}} = \sqrt{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \operatorname{sgn} x}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}} = -\sqrt{2}.$$

V 0 tedy derivace neexistuje.

**Příklad E5 :** Platí:  $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$ ,  $f$  je spojitá na  $\mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -periodická a lichá. Spočtěme derivace a zkoumejme jejich znaménka:

$$f'(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$f''(x) = -\sin x \cdot \frac{1 + \sin^2 x + 2 \cos^2 x}{(1 + \sin^2 x)^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\pi/2, \pi/2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (\pi/2, 3\pi/2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$


$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (\pi, 2\pi) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, \pi) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Z výše uvedeného vyplývá, že  $f$  je rostoucí na intervalech tvaru  $(-\pi/2, \pi/2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , klesající na intervalech tvaru  $(\pi/2, 3\pi/2) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ; v bodech  $\pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , má  $f$  globální maxima a v bodech  $3\pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , má  $f$  globální minima. Funkce  $f$  je na intervalech  $(0, \pi) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , konkávní a na intervalech tvaru  $(\pi, 2\pi) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , konvexní, v bodech  $k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , má  $f$  inflexní body;  $\mathcal{H}(f) = \langle -\pi/4, \pi/4 \rangle$ ;  $f$  nemá žádné asymptoty.

Takto vypadá graf funkce  $f$ :



To znamená, že  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{n}}{n^3 + \sqrt[2n]{n}}$  neexistuje.

**Příklad F2 :** Funkce arctg je ve svém definičním oboru rostoucí a proto

$$\forall n \in \mathbb{N} : 0 < \arctg 1 \leq \arctg n$$

a také

$$(*) \quad \forall n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{\arctg 1}{n} \leq \frac{\arctg n}{n}.$$

Řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  diverguje a proto diverguje i řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg 1}{n}$ . Odtud, z (\*) a ze srovnávacího kritéria dostaváme, že řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg n}{n}$  diverguje.

**Příklad F3 :** Zde nejde o nic jiného, než o určení asymptoty k funkci  $x \mapsto \sqrt[3]{x^3 + x}$  v  $+\infty$ . Počítejme:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 + x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^2}} = 1 \quad (= a); \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + x} - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x} - x) \cdot \frac{(x^3 + x)^{\frac{2}{3}} + (x^3 + x)^{\frac{1}{3}}x + x^2}{(x^3 + x)^{\frac{2}{3}} + (x^3 + x)^{\frac{1}{3}}x + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(x^3 + x)^{\frac{2}{3}} + (x^3 + x)^{\frac{1}{3}}x + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})^{\frac{2}{3}} + (x^3 + x)^{\frac{1}{3}} + x} = \frac{1}{+\infty} = 0 \quad (= b). \end{aligned}$$

Řešením úlohy jsou čísla  $a = 1$  a  $b = 0$ .

**Příklad F4 :** Pro  $x \neq 0$  platí

$$f'(x) = 2x(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}) + x^2(-\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}).$$

Tento vztah vyplývá z věty o aritmetice derivací a věty o derivaci složené funkce. V bodě 0 počítejme derivaci z definice, tj. počítejme limitu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}) = 0,$$

neboť  $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$  a funkce  $x \mapsto (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x})$  je omezená na jistém prstencovém okolí bodu 0. Platí tedy  $f'(0) = 0$ .

**Příklad F5 :** Snadno zjistíme  $D(f) = \mathbb{R}$  a  $f$  je na  $\mathbb{R}$  spojitá;  $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ . Funkce  $f$  není lichá, není sudá a není periodická. Pro  $f'$  platí

$$f'(x) = (x^2 + 4x + 3)e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

můžeme podle věty o limitě složené funkce a Heineho věty psát

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + \frac{1}{n^2+n})}{\frac{1}{n^2+n}} = 1.$$

Z věty o aritmetice limit a spojitosti odmocniny plyne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{2}{n^4}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}}{1 + \frac{1}{n}} = 2.$$

Dohromady pak máme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n^2 + n + 1) - \log(n^2 + n)}{\sqrt{n^4 + 2} - \sqrt{n^4 + 1}} = 2.$$

**Příklad I2 :** Členy uvažované řady jsou kladné a použijeme-li podílové kritérium, dostaneme:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n+1} + 4^{n+1}}{4^{n+1} + 5^{n+1}} \cdot \frac{4^n + 5^n}{3^n + 4^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{4^n} + 4}{\frac{4^{n+1}}{5^n} + 5} \cdot \frac{\frac{4^n}{3^n} + 1}{\frac{3^n}{4^n} + 1} = \frac{4}{5} < 1. \end{aligned}$$

Zkoumaná řada tedy konverguje podle podílového kritéria.

**Příklad I3 :** Limita čitatele a jmenovatele je rovna 0 a funkce ve jmenovateli i čitateli mají v každém bodě vlastní derivaci. Pokusme se tedy použít l'Hospitalovo pravidlo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{e^{x^3} - 1} \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{e^{x^3} \cdot 3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^{x^3} \cdot 3x} = \frac{1}{3}.$$

Vzhledem k tomu, že limita podílu derivací existuje, tak je i první rovnost v předchozím výpočtu v pořádku a výsledek je roven  $1/3$ .

**Příklad I4 :** Pro hodnoty funkce  $f$  platí

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 \operatorname{arctg}(\sin x), & x \in (2k\pi, (2k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}, \\ x, & x \in ((2k+1)\pi, (2k+2)\pi), k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Odtud již můžeme vypočítat hodnotu derivace všude mimo body ve tvaru  $k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ :

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 4 \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}, & x \in (2k\pi, (2k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}, \\ 1, & x \in ((2k+1)\pi, (2k+2)\pi), k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

(2f)

Funkce  $f$  je na  $\mathbb{R}$  spojitá a jednostranné derivace v bodech  $k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , lze tedy počítat pomocí limit derivací:


$$f'_+(2k\pi) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi^+} \left( 1 + 4 \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \right) = 5,$$

$$f'_-(2k\pi) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi^-} 1 = 1,$$

$$f'_-((2k+1)\pi) = \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi^-} \left( 1 + 4 \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \right) = -3,$$

$$f'_+((2k+1)\pi) = \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi^+} 1 = 1.$$

Z výše uvedeného vyplývá, že funkce  $f$  v bodech tvaru  $k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , nemá derivaci.



**Příklad 15 :** Platí  $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$ . Funkce  $f$  je spojitá na  $\mathcal{D}(f)$ , ale není sudá, ani lichá, ani periodická. Spočtěme  $f'$  a  $f''$  a prozkoumejme jejich znaménko:

$$f'(x) = \frac{x(3+x)}{(1+x)^2} \exp(x/(1+x)), \quad x \in \mathcal{D}(f);$$

$$f''(x) = \frac{5x+3}{(1+x)^4} \exp(x/(1+x)), \quad x \in \mathcal{D}(f);$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -3) \cup (0, +\infty),$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-3, -1) \cup (-1, 0),$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3, -1\};$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-3/5, \infty),$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (-1, -3/5),$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3/5\}.$$

Ve výpočtu jsme využili větu o aritmetice limit pro funkce a vztah

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a),$$

který vyplývá ze spojitosti funkce  $g$  v bodě  $a$ . ■

**5.1.18. Poznámka.** Tvrzení Včty 5.1.17 platí obdobně i pro jednostranné derivace.

**5.1.19. Příklad.** Nechť  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  a  $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Dokažte, že

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + \dots + n a_n x^{n-1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

*Řešení.* Vzorec plyne z Příkladů 5.1.11, 5.1.12 a Včety 5.1.17(a). ♦

Na následujících příkladech ukážeme, že předpoklady Včety 5.1.17 jsou podstatné a není možné je vynechat.

(3a)

**5.1.20. Příklad.** Definujeme funkce  $f$  a  $g$  proměnné  $x \in \mathbb{R}$  předpisy

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sign} x, & x \neq 0, \\ -\frac{3}{4}, & x = 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} -\operatorname{sign} x, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

Dokažte, že  $f'(0)$  a  $g'(0)$  existují, ale  $(f+g)'(0)$  neexistuje.

*Řešení.* Obdobně jako v Příkladu 5.1.14 spočteme, že  $f'(0) = \infty$  a  $g'(0) = -\infty$ . Dále platí

$$f(x) + g(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ -\frac{1}{4}, & x = 0. \end{cases}$$

Opět snadno vypočítáme, že  $(f+g)'_+(0) = \infty$  a  $(f+g)'_-(0) = -\infty$ . Tedy podle Včety 5.1.5  $(f+g)'(0)$  neexistuje. ♦

Předcházející příklad ukazuje, že z existence derivací funkcí  $f$  a  $g$  v bodě  $a$  obecně neplýne existence derivace funkce  $f+g$  v bodě  $a$ . Funkce uvedené v tomto příkladu ovšem nesplňují podmínu Včety 5.1.17(a), totiž že výraz  $f'(a)+g'(a)$  má mít smysl.

Následující příklad ilustruje důležitost předpokladu spojitosti alespoň jedné z uvažovaných funkcí ve Včetě 5.1.17(b).

(3b)

**5.1.21. Příklad.** Nechť funkce  $f$  a  $g$  jsou definovány stejně jako v Příkladu 5.1.20. Dokažte, že výraz  $f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$  má smysl, ale přesto  $(fg)'(0)$  neexistuje.

*Řešení.* Vynásobíme-li funkce  $f$  a  $g$ , dostaneme

$$(fg)(x) = \begin{cases} -1, & x \neq 0, \\ -\frac{3}{8}, & x = 0. \end{cases}$$

Podobně jako v Příkladu 5.1.20 odvodíme, že derivace  $(fg)'(0)$  neexistuje. Výraz  $f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$  však smysl má, protože

$$f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = \infty \cdot \frac{1}{2} + (-\frac{3}{4}) \cdot (-\infty) = \infty.$$

(4)

Také ve Větě 5.1.17(c) je předpoklad spojitosti funkce  $g$  podstatný, jak ukazuje následující příklad.

**5.1.22. Příklad.** Nechť  $f(x) = 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$  a nechť funkce  $g$  je definována předpisem

$$g(x) = \begin{cases} -\operatorname{sign} x, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

Dokažte, že výraz

$$\frac{f'(0)g(0) - f(0)g'(0)}{g^2(0)}$$

má smysl, přesto ale  $(\frac{f}{g})'(0)$  neexistuje.

*Řešení.* Jest

$$\frac{f'(0)g(0) - f(0)g'(0)}{g^2(0)} = \frac{-g'(0)}{g^2(0)} = \frac{\infty}{\frac{1}{4}} = \infty,$$

a tedy výraz

$$\frac{f'(0)g(0) - f(0)g'(0)}{g^2(0)}$$

má smysl. Dále

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \begin{cases} \operatorname{sign} x, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$$

a tedy

$$\left(\frac{f}{g}\right)'_+(0) = -\infty$$

a

$$\left(\frac{f}{g}\right)'_-(0) = \infty.$$

Podle Věty 5.1.5 tedy  $(\frac{f}{g})'(0)$  neexistuje. ■

**5.1.23. Věta** (derivace složené funkce). Nechť funkce  $g$  je spojitá v bodě  $a \in \mathbb{R}$  a má v tomto bodě derivaci. Nechť funkce  $f$  má derivaci v bodě  $g(a)$ . Pak

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a), \quad (5.2)$$

je-li výraz na pravé straně definován.

*Důkaz.* Označme  $b = g(a)$ . Díky existenci derivace  $f'(b)$  nalezneme  $\sigma \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ , takové, že funkce  $f$  je definována na  $B(b, \sigma)$  (Poznámka 5.1.6(a)). Protože  $g$  je spojitá v  $a$ , existuje  $\varrho \in \mathbb{R}$ ,  $\varrho > 0$ , takové, že  $g(B(a, \varrho)) \subset B(b, \sigma)$  (Definice 4.1.18). Funkce  $f \circ g$  je tedy dobře definována na okolí  $B(a, \varrho)$ .

Předpokládejme nejprve, že platí  $g'(a) \neq 0$ . Pak existuje  $\tilde{\varrho} \in (0, \varrho)$  takové, že pro každé  $x \in P(a, \tilde{\varrho})$  platí

$$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \neq 0. \quad (5.3)$$

Tím je důkaz dokončen. ■

**5.1.24. Poznámka.** Ve Větě 5.1.23 je předpoklad spojitosti funkce  $g$  v bodě  $a$  automaticky splněn, je-li  $g'(a)$  vlastní, jak plyně z Věty 5.1.15.

Předpoklad spojitosti vnitřní funkce ve Větě 5.1.23 nelze obecně vynechat, jak ukazuje následující příklad.

**5.1.25. Příklad.** Nechť funkce  $f$  a  $g$  jsou definovány pomocí předpisů

$$f(y) = |y|, \quad y \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} \operatorname{sign} x, & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \\ -\frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

(5)

Dokažte, že výraz  $f'(g(0))g'(0)$  má smysl, ale přesto  $(f \circ g)'(0)$  neexistuje.

*Řešení.* Podobně jako v Příkladu 5.1.14 odvodíme, že  $g'(0) = \infty$ . Dále zřejmě platí  $f'(-\frac{1}{2}) = -1$ . Výraz

$$f'(g(0))g'(0) = f'(-\frac{1}{2}) \cdot g'(0) = (-1) \cdot \infty = -\infty$$

tedy má smysl. Dále platí

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

■ a tedy  $(f \circ g)'(0)$  neexistuje.

**5.1.26. Věta** (derivace inverzní funkce). Nechť  $I$  je nedegenerovaný interval a nechť  $a$  je vnitřním bodem  $I$ . Nechť  $f$  je spojitá a ryze monotónní funkce na  $I$ . Označme  $b = f(a)$ . Pak platí následující tvrzení.

(a) Má-li  $f$  v bodě  $a$  nenulovou derivaci, pak

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

(b) Je-li  $f'(a) = 0$  a  $f$  je rostoucí na  $I$ , pak

$$(f^{-1})'(b) = \infty.$$

(c) Je-li  $f'(a) = 0$  a  $f$  je klesající na  $I$ , pak

$$(f^{-1})'(b) = -\infty.$$

*Důkaz.* (a) Předpokládejme, že funkce  $f$  je na intervalu  $I$  rostoucí. Z Věty 4.3.6 vyplývá, že množina  $J = f(I)$  je interval. Dle Věty 4.3.13 navíc víme, že inverzní funkce  $f^{-1}: J \rightarrow I$  je spojitá a rostoucí. Protože  $a$  je vnitřním bodem  $I$  a  $f$  je rostoucí, je také  $b$  vnitřním bodem  $J$ . Tedy existuje  $\varepsilon \in \mathbb{R}$ ,  $\varepsilon > 0$ , takové, že  $B(b, \varepsilon) \subset J$ . Díky tomu, že  $a$  je vnitřním bodem  $I$  víme, že existuje  $\delta \in \mathbb{R}$ ,  $\delta > 0$ , takové, že  $B(a, \delta) \subset I$ . Ze spojitosti funkce  $f$  v bodě  $a$  plyne, že toto  $\delta$  lze zvolit tak, aby  $f(B(a, \delta)) \subset B(b, \varepsilon)$ . Označme

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad x \in P(a, \delta). \quad (5.8)$$

$$(6) \quad f(x) = \begin{cases} ax+b & x \leq -1 \\ ax^3 + x + 2b & x > -1 \end{cases}$$

(1) funkce musí být spojita:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} ax^3 + x + 2b = a(-1) + b$$

$$-a - 1 + 2b = -a + b \\ \boxed{b = 1}$$

(2) Derivace  $f'_+(1) = f'_-(1)$ . Funkce je spojite když užit všechny

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (ax^3 + x + 2b)' = \lim_{x \rightarrow -1^+} a \cdot 3x^2 + 1 = 3a + 1$$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (ax + b)' = \lim_{x \rightarrow -1^-} a = a$$

$$3a + 1 = a \\ 2a = 1 \\ \boxed{a = -\frac{1}{2}}$$

7. Kde dělá tazatel chybu?

**Given the function:**

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{if } x \geq 0 \\ x^2 - 1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

**Question:** are we justified to say that the derivative at  $f(0)$  exists? If so, what is  $f'(0)$ ? And how do we justify it?

Of course I do realize that the function isn't continuous at  $x = 0$  but still since the slope near  $x = 0$  seems equal near  $0+$  and  $0-$  I wondered why we can't say that  $f'(0) = 0$

**What I tried is this:**

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{(x+h)^2 + 1 - (x^2 + 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{(0+h)^2 + 1 - (0^2 + 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{h^2}{h} = h = 0 \\ f'_-(0) &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{(x+h)^2 + 1 - (x^2 + 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{(0+h)^2 + 1 - (0^2 + 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{h^2}{h} = h = 0 \end{aligned}$$

My conclusion is that since both the right and left limit using the definition of the derivative exist and generate the same answer the limit exists such that  $f'(0) = 0$ .

Apparently this is not true, so what is my mistake?

Pochází z: <https://math.stackexchange.com/questions/1532014/how-to-apply-the-definition-of-a-derivative-with-a-piecewise-function>

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{(0+h)^2 - 1 - (0^2 + 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{h^2 - 1}{h} = \infty$$