
NMFM301 – Statistika pro finanční matematiky

Pořádkové statistiky. Konstrukce intervalových odhadů

Podrobné řešení příkladů z 3. cvičení

A Příklady na cvičení

A1. [Procvičovací]

Nechť X_1, \dots, X_n je náhodný výběr z rovnoměrného rozdělení na intervalu $(0, \theta_X)$, pro $\theta_X > 0$. Sestrojte přesný interval spolehlivosti pro θ_X založený na pořadové statistice $X_{(n)}$.

Řešení:

Distribučná funkcia náhodnej veličiny $X_{(n)}$ (n -tej poradovej štatistiky) je $[F(x)]^n$ a príslušná hustota je $nf(x)[F(x)]^{n-1}$, pričom $F(x)$ a $f(x)$ je distribučná funkcia, resp. hustota náhodnej veličiny X_i .

Navyše pre náhodné veličiny X_1, \dots, X_n z rovnomerného rozdelenia na intervale $(0, \theta_X)$ platí, že transformované náhodné veličiny $\frac{X_1}{\theta_X}, \dots, \frac{X_n}{\theta_X}$ majú rovnomerné rozdelenie na intervale $(0, 1)$.

Náhodná veličina $\frac{X_{(n)}}{\theta_X}$ má preto rozdelenie s distribučnou funkciou

$$F_{(n)}(x) = x^n \quad \text{pre } x \in (0, 1),$$

a $F_{(n)}(x) = 0$ pre $x < 0$ a $F_{(n)}(x) = 1$ pre $x > 1$. Príslušná hustota náhodnej veličiny $\frac{X_{(n)}}{\theta_X}$ je

$$f_{(n)}(x) = nx^{n-1} \mathbb{I}_{\{x \in (0, 1)\}},$$

čo je vlastne hustota Beta rozdelenia s parametrami $\alpha = n$ a $\beta = 1$ ($Beta(n, 1)$). Z definície kvantilu zároveň vieme, že platí

$$P\left[c_{\alpha/2} < \frac{X_{(n)}}{\theta_X} < c_{1-\alpha/2}\right] = 1 - \alpha, \quad (1)$$

kde $c_{\alpha/2}$ a $c_{1-\alpha/2}$ sú príslušné kvantily daného beta rozdelenia. Ich presné hodnoty získame pomocou distribučnej funkcie náhodnej veličiny $\frac{X_{(n)}}{\theta_X}$ nasledovne:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{2} &= P\left[\frac{X_{(n)}}{\theta_X} \leq c_{\alpha/2}\right] = F_{(n)}(c_{\alpha/2}) = c_{\alpha/2}^n; \\ 1 - \frac{\alpha}{2} &= P\left[\frac{X_{(n)}}{\theta_X} \leq c_{1-\alpha/2}\right] = F_{(n)}(c_{1-\alpha/2}) = c_{1-\alpha/2}^n, \end{aligned}$$

kde v každom riadku prvá rovnosť plynie z definície kvantilu, druhá rovnosť z definície distribučnej funkcie, a posledná, tretia rovnosť z konkrétneho tvaru distribučnej funkcie $F_{(n)}(x) = x^n$, pre $x \in (0, 1)$. Pre kvantily teda dostávame rovnosti: $c_{\alpha/2} = \sqrt[n]{\frac{\alpha}{2}}$ a $c_{1-\alpha/2} = \sqrt[n]{1 - \frac{\alpha}{2}}$ a presný interval spoľahlivosti pre parameter $\theta_X > 0$ dostaneme z rovnosti (1) (pomocou vhodných ekvivalentných úprav) v tvare

$$P\left[\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1 - \alpha/2}} < \theta_X < \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right] = 1 - \alpha.$$

A2. [Procvičovaci]

Nechť X_1, \dots, X_n je náhodný výběr z exponenciálního rozdělení s parametrem $\lambda_X > 0$. Sestrojte přesný interval spolehlivosti pro $E X_i = 1/\lambda_X$ založený na náhodné veličině $\sum_{i=1}^n X_i$.

Řešení:

Opět využijeme možnost transformovat původné náhodné veličiny X_1, \dots, X_n . Zároveň využijeme fakt, že exponenciální rozdělení s parametrem $\lambda_X = \frac{1}{2}$ je vlastně Gamma rozdělení s parametry $\frac{1}{2}$ a 1 (t.j. $Exp(\frac{1}{2}) \equiv \Gamma(\frac{1}{2}, 1)$) a součet nezávislých náhodných veličin s takýmto rozdělením má potom Gamma rozdělení, s parametry $\frac{1}{2}$ a n . Postupně teda dostaneme nasledujúce riadky:

$$\begin{aligned} X_1, \dots, X_n &\sim Exp(\lambda_X) \\ \lambda_X X_1, \dots, \lambda_X X_n &\sim Exp(1) \quad (\text{lebo } E[\lambda_X X_i] = \lambda_X E X_i = 1) \\ 2\lambda_X X_1, \dots, 2\lambda_X X_n &\sim Exp\left(\frac{1}{2}\right) \equiv \Gamma\left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ \sum_{i=1}^n 2\lambda_X X_i = 2\lambda_X \sum_{i=1}^n X_i &\sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, n\right) \equiv \chi_{2n}^2 \end{aligned}$$

Posledna rovnost (\equiv) plynie z faktu, že $\Gamma(1/2, n/2) \equiv \chi_n^2$ (t.j., χ^2 rozdelenie s n stupňami voľnosti). S využitím definície kvantilov môžeme napísať nasledujúcu rovnosť:

$$P \left[\chi_{2n}^2(\alpha/2) < 2\lambda_X \sum_{i=1}^n X_i < \chi_{2n}^2(1 - \alpha/2) \right] = 1 - \alpha,$$

kde $\chi_{2n}^2(\alpha/2)$ a $\chi_{2n}^2(1 - \alpha/2)$ sú príslušné kvantily χ^2 rozdelenia s $2n$ stupňami voľnosti. Ekvivalentnými úpravami dostaneme vzťah (a zároveň presný interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu $\mu = E X_i = \frac{1}{\lambda_X} > 0$)

$$P \left[\frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{\chi_{2n}^2(1 - \alpha/2)} < \frac{1}{\lambda_X} < \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{\chi_{2n}^2(\alpha/2)} \right] = 1 - \alpha.$$

Hodnotu $\alpha \in (0, 1)$ volíme dostatočne malú, aby mal interval spoľahlivosti rozumné pokrytie. Najčastejšie voľby pre $\alpha \in (0, 1)$ sú napr. $\alpha = 0.05$, alebo $\alpha \in \{0.1, 0.01, 0.005\}$.

A3. [Procvičovaci]

Nechť X_1, \dots, X_n je náhodný výběr z exponenciálního rozdělení s neznámým parametrem $\lambda_X > 0$.

(a) Pomocí centrální limitní věty sestrojte přibližný interval spolehlivosti pro λ_X .

Řešení:

Interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu $E X_i = \frac{1}{\lambda_X}$ (odvodený vyššie), je možné priamo využiť aj pre odvodenie intervalu spoľahlivosti pre neznámy parameter $\lambda_X > 0$. Jedná sa ale o presný interval spoľahlivosti, pretože sme poznali presné rozdelenie vhodnej štatistiky, v tomto prípade náhodnej veličiny $2\lambda_X \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2$. Namiesto presného rozdelenia ale teraz využijeme asymptotické vlastnosti – konkrétne centrálnu limitnú vetu (CLV), ktorá nám pre súčet nezávislých a rovnako rozdelených náhodných veličin s konečným rozptylom dáva

$$\sqrt{n}(\bar{X} - E X_i) \xrightarrow{D} N(0, \text{var } X_i),$$

kde \bar{X} je klasický výberový priemer. Jedná sa o konvergenciu v distribúcii. Špeciálne pre náhodné veličiny s exponenciálnym rozdelením s parametrom $\lambda_X > 0$ (tak, že $E X_i = \frac{1}{\lambda_X}$) dostaneme z CLV

$$\sqrt{n}\left(\bar{X} - \frac{1}{\lambda_X}\right) \xrightarrow{D} N\left(0, \frac{1}{\lambda_X^2}\right), \quad (2)$$

resp. ekvivalentný zápis v tvare

$$\sqrt{n}\lambda_X\left(\bar{X} - \frac{1}{\lambda_X}\right) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

S využitím kvantilov normálneho (štandardizovaného) rozdelenia môžeme napísať rovnosť

$$P[-u_{1-\alpha/2} < \sqrt{n}(\lambda_X\bar{X} - 1) < u_{1-\alpha/2}] \rightarrow 1 - \alpha,$$

pre $n \rightarrow \infty$. Hodnota $u_{1-\alpha/2}$ je $(1 - \alpha/2)$ kvantil normálneho $N(0, 1)$ rozdelenia. Ekvivalentnými úpravami dostaneme asymptotický interval spoľahlivosti

$$P\left[\frac{1}{\bar{X}} - \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n\bar{X}}} < \lambda_X < \frac{1}{\bar{X}} + \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n\bar{X}}}\right] \rightarrow 1 - \alpha,$$

opäť pre $n \rightarrow \infty$. Čím je rozsah náhodného výberu väčší, tým je pokrytie neznámeho parametru (v pravdepodobnosti) bližšie k požadovanej hodnote $1 - \alpha$.

- (b) Pomocí centrální limitní věty sestrojte přibližný interval spolehlivosti pro $\log \lambda_X$ a z něho odvoďte přibližný interval spolehlivosti pro λ_X .

Řešení:

Opäť nás zaujíma asymptotický interval spoľahlivosti pre neznámy parameter λ_X zostrojený na základe náhodného výberu X_1, \dots, X_n z exponenciálneho rozdelenia $Exp(\lambda_X)$ (tak, že $EX_i = \frac{1}{\lambda_X}$). Využijeme k tomu transformáciu $g(x) = \log(x)$. Keďže stále platí centrálna limitná veta v (2), dostaneme s použitím transformácie aj

$$\sqrt{n}\left(\log(\bar{X}) - \log\left(\frac{1}{\lambda_X}\right)\right) \xrightarrow{\mathcal{D}} N\left(0, \frac{1}{\lambda_X^2} \cdot \left[g'\left(\frac{1}{\lambda_X}\right)\right]^2\right).$$

To vlastne plynie z Taylorovho rozvoju funkcie $\log(x)$ v okolí bodu $x = EX_i = \frac{1}{\lambda_X}$, pretože

$$g(\bar{X}) \approx g(EX_i) + g'(EX_i)(\bar{X} - EX_i),$$

čo po dosadení a jednoduchých úpravách dáva výraz

$$\sqrt{n}\left(\log(\bar{X}) - \log\left(\frac{1}{\lambda_X}\right)\right) \approx \sqrt{n}g'(EX_i)(\bar{X} - EX_i),$$

pričom z CLV už vieme, že náhodná veličina na pravej strane od znamienka ' \approx ' má asymptoticky normálne rozdelenie $N\left(0, \frac{1}{\lambda_X^2} \cdot [g'(EX_i)]^2\right)$. A preto aj ľavá strana má rovnaké asymptotické rozdelenie. Keďže $g'(x) = 1/x$ a $g'(1/\lambda_X) = \lambda_X$, tak dosadením a využitím kvantilov štandardizovaného normálneho rozdelenia dostaneme výraz

$$P\left[-u_{1-\alpha/2} < \sqrt{n}\left(\log(\bar{X}) - \log\left(\frac{1}{\lambda_X}\right)\right) < u_{1-\alpha/2}\right] \rightarrow 1 - \alpha,$$

a jednoduchými ekvivalentnými úpravami dostaneme

$$P\left[-\log(\bar{X}) - \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} < \log(\lambda_X) < -\log(\bar{X}) + \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right] \rightarrow 1 - \alpha,$$

čo je asymptotický interval spoľahlivosti pre neznámy parameter $\log(\lambda_X)$. Aplikovaním exponenciály na všetky tri členy v zátvorke dostaneme aj asymptotický interval spoľahlivosti pre parameter $\lambda_X > 0$ v tvare

$$P\left[\frac{1}{\bar{X}}e^{-\frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}} < \lambda_X < \frac{1}{\bar{X}}e^{\frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}}\right] \rightarrow 1 - \alpha,$$

pre $n \rightarrow \infty$.

A4. [Procvičovací]

Máme-li dva nezávislé náhodné výběry $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda_X)$ a $Y_1, \dots, Y_m \sim \text{Exp}(\lambda_Y)$. Odvoďte přesný interval spolehlivosti pro parametr $\varrho = \lambda_X/\lambda_Y$.

Řešení:

Analogicky, ako v príklade A2 môžeme využiť vhodné transformácie oboch náhodných výberov:

$$\begin{aligned}2\lambda_X X_1, \dots, 2\lambda_X X_n &\sim \text{Exp}(1/2) \equiv \Gamma(1/2, 1) \\2\lambda_Y Y_1, \dots, 2\lambda_Y Y_m &\sim \text{Exp}(1/2) \equiv \Gamma(1/2, 1).\end{aligned}$$

Zároveň platí, že

$$2\lambda_X \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2 \quad \text{a} \quad 2\lambda_Y \sum_{i=1}^m Y_i \sim \chi_{2m}^2,$$

pričom obe náhodné veličiny sú vzájomne nezávislé. S využitím definície F rozdelenia a kvantilov tohto rozdelenia môžeme písať, že

$$\frac{\frac{2\lambda_X \sum_{i=1}^n X_i}{n}}{\frac{2\lambda_Y \sum_{i=1}^m Y_i}{m}} \sim F_{n,m}$$

a tiež

$$P \left[f_{n,m}(\alpha/2) < \frac{\lambda_X}{\lambda_Y} \cdot \frac{m \sum_{i=1}^n X_i}{n \sum_{i=1}^m Y_i} < f_{n,m}(1 - \alpha/2) \right] = 1 - \alpha,$$

kde $f_{n,m}(\alpha/2)$ a $f_{n,m}(1 - \alpha/2)$ sú príslušné kvantily F rozdelenia s n a m stupňami voľnosti. Ekvivalentnými úpravami sa získa presný interval spoľahlivosti pre neznámy parameter (pomer) $\varrho = \lambda_X/\lambda_Y$.