

Příklad Přesnutí vlnové rovnice na kouli ($v: \mathbb{R}^3$)

Přesnutí $u(t, x_1, x_2, x_3)$ rovnice $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0$ hledáme ve tvaru $u(t, x) = v(t, |x|)$.

Pak $\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial v}{\partial r} \frac{x_i}{|x|}$ a $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} \frac{x_i}{|x|} \frac{x_i}{|x|} + \frac{\partial v}{\partial r} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{x_i x_i}{|x|^3} \right)$

Tedy $\Delta u = \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial v}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rv)$, kde $v = v(t, r)$
($0, \mathbb{R}$)

Přesnutí $\square u = 0$ v $(0, +\infty) \times B_R(0)$ jsme
 $u(0, x) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 1$ v $B_R(0)$
 $u(t, \frac{1}{2}) = 0$ na $(0, +\infty) \times \partial B_R(0)$


jsme redukovali na vlnu

$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \frac{k^2}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rv) = 0$ v $(0, +\infty) \times (0, R)$
 $v(0, |x|) = 0$, $\frac{\partial v}{\partial t}(0, \cdot) = 1$ v $(0, R)$
 $v(t, R) = 0$ v $(0, +\infty)$


Naděláme-li rovnici r a označíme $w := rv(t, r)$,
 pak pro w máme

$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - k^2 \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = 0$ v $(0, +\infty) \times (0, R)$
 $w(0, r) = 0$, $\frac{\partial w}{\partial t}(0, r) = r$ v $(0, R)$
 $w(t, 0) = w(t, R) = 0$ v $(0, +\infty)$

Tuto vlnu vyřešíme metodou separace: po jednodušení $R = \frac{1}{2}$. Pak hledá podmínky:



okrajové: δ_{Σ} dokladujeme:



a

$\tilde{w} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin 2\pi k |m| t}{2\pi k |m|}$

$c_n e^{2\pi i m r}$ kde $c_n = \left\langle \tilde{w}_p, e^{-2\pi i m r} \right\rangle = \int_{-1/2}^{1/2} \tilde{w}_p e^{-2\pi i m r} dr$

CVS/2

$$\text{Teđy } c_m = \int_{-1/2}^{1/2} r e^{-2\pi i n r} dr = \int_{-1/2}^{1/2} r (\underbrace{\cos 2\pi n r}_{\substack{\uparrow \\ \text{reals}}} + i \underbrace{\sin 2\pi n r}_{\substack{\uparrow \\ \text{reals}}}) dr =$$

$$= -2i \int_0^{1/2} r \sin 2\pi n r dr$$

per partes

$$= +2i \left[r \frac{\cos 2\pi n r}{2\pi n} \right]_0^{1/2} + 2i \int_0^{1/2} \frac{\cos 2\pi n r}{2\pi n} dr$$

$$= + \frac{(-1)^m i}{2\pi n} + 2i \left[\frac{\sin 2\pi n r}{(2\pi n)^2} \right]_0^{1/2} = \frac{(-1)^{m+1} i}{2\pi n}$$

$$\text{Teđy } (c_0=0) \quad \tilde{w}(t,r) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \underbrace{\frac{\sin 2\pi \xi |m| t}{2\pi \xi |m|}}_{\text{reals } \sin} \underbrace{\frac{(-1)^m i}{2\pi m}}_{\text{reals } i} (\underbrace{\cos 2\pi n r}_{\text{reals}} + i \underbrace{\sin 2\pi n r}_{\text{reals}})$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi \xi |m| t}{2\pi \xi |m|} \frac{(-1)^{m+1}}{-\pi m} \sin 2\pi n r$$

$$\Rightarrow \boxed{w(t,r) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \frac{\sin 2\pi \xi n t}{2\pi^2 \xi n^2} r \sin 2\pi n r}$$