

## EMPIRICKÉ ODHADY

### 6. CVIČENÍ

1. Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z exponenciálního rozdělení  $\text{Exp}(\lambda)$  (tj. s hustotou  $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}\{x > 0\}$ ), kde  $\lambda > 0$  je neznámý parametr. Naším cílem je odhadnout hodnotu distribuční funkce v nějakém daném bodě  $y > 0$ , tj.  $\theta_X = 1 - e^{-\lambda y}$ . Uvažujte následující dva odhady

$$\tilde{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i \leq y\} \quad \text{a} \quad \hat{\theta}_n = 1 - e^{-\hat{\lambda}_n y}, \quad \text{kde} \quad \hat{\lambda}_n = \frac{1}{\bar{X}_n}.$$

- (a) Jaké jsou vlastnosti daných dvou odhadů?
  - (b) Který z odhadů se Vám zdá vhodnější a proč?
  - (c) Nalezněte intervalový odhad pro parametr  $1 - e^{-2\lambda}$ .
  - (d) Nalezněte intervalový odhad pro parametr  $\frac{1}{1 - e^{-2\lambda}}$ .
2. V následující tabulce jsou zachyceny porodní hmotnosti chlapců (naroděných v daném roce v daném regionu).

Hmotnost [kg]	(1.5, 2.0]	(2.0, 2.5]	(2.5, 3.0]	(3.0, 3.5]	(3.5, 4.0]	(4.0, 4.5]	(4.5, 5.0]	(5.0, 5.5]	$\Sigma$
Počet	4	101	769	1904	1651	369	37	3	4838

- (a) Bodově i intervalově odhadněte o kolik je větší pravděpodobnost, že se narodí chlapec s hmotností do 4 kg (včetně) než pravděpodobnost že se narodí chlapec s hmotností do 3 kg (včetně).
  - (b) Bodově i intervalově odhadněte, kolikrát je větší pravděpodobnost, že se narodí chlapec s hmotností do 4 kg (včetně) než pravděpodobnost že se narodí chlapec s hmotností do 3 kg (včetně).
3. Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr.
- (a) Najděte asymptotické rozdělení třetího centrálního momentu  $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^3$ .
  - (b) Na základě znalosti z (a) sestavte intervalový odhad pro  $\mu_3 = \mathbf{E}(X_i - \mathbf{E}X_i)^3$ .
  - (c) Najděte asymptotické rozdělení třetího centrálního momentu  $\hat{\mu}_3$  za předpokladu, že  $X_i$  má normální rozdělení  $\mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$ .
4. Nechť  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení se spojitou distribuční funkcí  $F_X$ . Nechť  $u_X(\beta)$  je  $\beta$ -kvantilem rozdělení  $F_X$  a  $\hat{u}_n(\alpha)$  je empirický (výběrový)  $\alpha$ -kvantil.
- (a) Pro  $\alpha = 0.25$ ,  $\beta = 0.30$  a  $n = 100$  spočítejte (přibližně) pravděpodobnost  $\mathbf{P}(\hat{u}_n(\alpha) > u_X(\beta))$ .
  - (b) Jaká bude pravděpodobnost z (a) pro  $n = 1000$ ?

## OPAKOVÁNÍ Z PŘEDNÁŠKY

**EMPIRICKÁ DISTRIBUČNÍ FUNKCE** Necht'  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F_X$ . Funkci

$$\widehat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i \leq x\}, \quad \text{pro } x \in \mathbb{R},$$

nazýváme empirická distribuční funkce náhodného výběru  $X_1, \dots, X_n$ . Pro tuto funkci platí (pro pevné  $x \in \mathbb{R}$ )

- \*  $n\widehat{F}_n(x) \sim \text{Bi}(n, F_X(x))$ ;
- \*  $\mathbf{E} \widehat{F}_n(x) = F_X(x)$ ;
- \*  $\text{var}(\widehat{F}_n(x)) = F_X(x)(1 - F_X(x))/n$ ;
- \*  $\sqrt{n}(\widehat{F}_n(x) - F_X(x)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathbf{N}(0, F_X(x)(1 - F_X(x)))$ .

**KVANTILY** Uvažujme rozdělení dané distribuční funkcí  $F_X$ . Funkci

$$F_X^{-1}(\alpha) = \inf\{x: F_X(x) \geq \alpha\} \quad \text{pro } \alpha \in (0, 1)$$

nazýváme kvantilová funkce rozdělení  $F_X$ . Hodnotu

$$u_X(\alpha) = F_X^{-1}(\alpha) \quad \text{pro } \alpha \in (0, 1)$$

nazýváme  $\alpha$ -kvantilem rozdělení  $F_X$ .

Necht'  $X_1, \dots, X_n$  je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí  $F_X(u)$ , a necht'  $\alpha \in (0, 1)$ . Potom

$$\widehat{u}_n(\alpha) = \widehat{F}_n^{-1}(\alpha) \quad \text{pro } \alpha \in (0, 1)$$

nazýváme empirickým (výběrovým)  $\alpha$ -kvantilem rozdělení  $F_X$ .

Empirický (výběrový)  $\alpha$ -kvantil  $\widehat{u}_n(\alpha)$  můžeme pomocí pořádkových statistik spočítat následovně. Označme

$$k_\alpha = \begin{cases} \alpha n & \text{pokud } \alpha n \text{ je celé číslo,} \\ \lfloor \alpha n \rfloor + 1 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Empirický (výběrový)  $\alpha$ -kvantil  $\widehat{u}_n(\alpha)$  pak definujeme jako  $k_\alpha$ -tou pořádkovou statistiku náhodného výběru  $X_1, \dots, X_n$ , tedy  $\widehat{u}_n(\alpha) = X_{(k_\alpha)}$ .