

Cvičení 11–12 – Komplexní analýza 2024/2025
Týden 11–12

Úloha 1. Určete následující Laplaceovy obrazy. Funkce $h(t)$ je „dostatečně pěkná“ funkce z L_0 .

- (a) $\mathcal{L}[e^{-it^2}](s)$
 (b) $\mathcal{L}[(t-3)^2 \mathbb{1}(t-3)](s)$
 (c) $\mathcal{L}[(t-1)^2 \mathbb{1}(t-3)](s)$
 (d) $\mathcal{L}[\sin(2t) \mathbb{1}(t-\frac{\pi}{4})](s)$
 (e) $\mathcal{L}[h'''(t)](s)$, kde $h(t)$ splňuje $h(0) = 2$, $h'(0) = 0$, $h''(0) = 3$
 (f) $\mathcal{L}[h'(t) * (t \sin(it))](s)$, kde $h(t)$ splňuje $h(0) = -2$

Úloha 2. Nejprve zapište funkci

$$f(t) = \begin{cases} e^{4t} & \text{pokud } t \in [0, \frac{\pi}{6}), \\ 2 & \text{pokud } t \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{5}), \\ 0 & \text{pokud } t \in [\frac{\pi}{5}, \frac{\pi}{4}), \\ \cos(2t) & \text{pokud } t \in [\frac{\pi}{4}, \infty), \end{cases}$$

pomocí Heavisideovy funkce a poté nalezněte její Laplaceovu transformaci.

Úloha 3. Určete Laplaceův obraz $Y(s)$ řešení (integro-)diferenciální rovnice

- (a)
- $$y''(t) + 2y'(t) - y(t) = 3$$
- s počátečními podmínkami $y(0) = -1$ a $y'(0) = 4$;

- (b)
- $$y''(t) + \int_0^t \tau^3 y(t-\tau) d\tau = e^{-t}$$
- s počátečními podmínkami $y(0) = 0$ a $y'(0) = -2$.

Úloha 4. Určete řešení $y(t)$ diferenciální rovnice, víte-li že její Laplaceův obraz je

- (a) $Y(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)^2}$;
 (b) $Y(s) = \frac{s}{(s+1)(s^2-3s-4)}$.

Úloha 5. Nalezněte Laplaceův vzor $f(t)$ funkce

- (a) $F(s) = \frac{e^{-5s}}{s^4}$;
 (b) $F(s) = \frac{e^{-3s}}{(s-i)^2}$.

Úloha 6. Určete Laplaceovu transformaci periodické funkce $f(t)$ s periodou T , kde

- (a) $T = \frac{3\pi}{4}$ a funkce $f(t)$ je na intervalu $[0, \frac{3\pi}{4})$ zadána předpisem

$$f(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \mathbb{1}\left(t - \frac{\pi}{4}\right);$$

- (b) $T = 5$ a funkce $f(t)$ je na intervalu $[0, 5)$ zadána předpisem

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{pokud } t \in [0, 2), \\ e^{2it} & \text{pokud } t \in [2, 4), \\ 0 & \text{pokud } t \in [4, 5). \end{cases}$$

Úloha 7. Pomocí Laplaceovy transformace nalezněte řešení diferenciální rovnice

$$y''(t) + y'(t) - 2y(t) = e^t$$

splňující počáteční podmínky $y(0) = 1$ a $y'(0) = 0$.

Úloha 8. Pomocí Laplaceovy transformace nalezněte řešení integrodiferenciální rovnice

$$y'(t) + 9 \int_0^t y(\tau) e^{-6(t-\tau)} d\tau = e^t$$

splňující počáteční podmínku $y(0) = 1$.

Laplaceova transformace



Připomenutí.

- Laplaceova transformace funkce $f(t): [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

- Ztotožňujeme funkce $f(t)$ a $f(t)\mathbb{1}(t)$, tj. funkce chápeme jako nulové pro $t < 0$.
- Heavisideova funkce:

$$\mathbb{1}(t) = \begin{cases} 0, & \text{pro } t < 0, \\ 1, & \text{pro } t \geq 0. \end{cases}$$



- Základní aritmetika Laplaceovy transformace:

* \mathcal{L} je lineární.

* Pro $a > 0$ jest $\mathcal{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f(t)]\left(\frac{s}{a}\right)$.

* Pro $a \in \mathbb{C}$ jest $\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) = \mathcal{L}[f(t)](s-a)$.

* Pro $a > 0$ jest $\mathcal{L}[f(t-a)\mathbb{1}(t-a)](s) = e^{-as}\mathcal{L}[f(t)](s)$.

* Pro $a > 0$ jest $\mathcal{L}[f(t)\mathbb{1}(t-a)](s) = e^{-as}\mathcal{L}[f(t+a)](s)$.

[škálování]

[posun obrazu]

[posun vzoru]

[„oříznutí“ vzoru]

- Pár známých obrazů:

* Pro $n \in \mathbb{N}_0$ jest $\mathcal{L}[t^n](s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$. Speciálně $\mathcal{L}[1](s) = \frac{1}{s}$.

* Pro $a \in \mathbb{C}$ jest $\mathcal{L}[e^{at}](s) = \frac{1}{s-a}$.

* Pro $\omega \in \mathbb{C}$ jest $\mathcal{L}[\sin(\omega t)](s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ a $\mathcal{L}[\cos(\omega t)](s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$.

- Vztah Laplaceovy transformace a derivace pro pěkné funkce:

* $\mathcal{L}[tf(t)](s) = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}[f(t)](s)$

* $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)](s) = s^n\mathcal{L}[f(t)](s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$

Speciálně:

$$\mathcal{L}[f'(t)](s) = s\mathcal{L}[f(t)](s) - f(0).$$

$$\mathcal{L}[f''(t)](s) = s^2\mathcal{L}[f(t)](s) - sf(0) - f'(0).$$

$$\mathcal{L}[f'''(t)](s) = s^3\mathcal{L}[f(t)](s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0).$$

[derivace obrazu]

[obraz derivace]

- Konvoluce a Laplaceův obraz konvoluce: Konvoluce funkcí $f, g \in L_0$ je funkce $(f * g) \in L_0$ definovaná jako

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau, \quad t \geq 0,$$

a platí $\mathcal{L}[(f * g)(t)](s) = \mathcal{L}[f(t)](s)\mathcal{L}[g(t)](s)$.

- Pro inverzní Laplaceovu transformaci racionální funkce $F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$, kde $\text{st } P < \text{st } Q$, platí


$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)](t) = \sum_{k=1}^n \text{res}_{s=z_k} F(s)e^{st},$$

kde z_1, \dots, z_n jsou všechny póly funkce $F(s)$.

- Hledáme-li Laplaceův vzor pro funkce ve tvaru $F(s) = G(s)e^{-as}$, kde $a > 0$, postupujeme tak, že nejprve najdeme Laplaceův vzor $g(t)$ pro funkci $G(s)$ a poté (díky pravidlu o posunu vzoru) platí, že $f(t) = g(t-a)\mathbb{1}(t-a)$.

- Obraz $T > 0$ periodické funkce $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ je

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \frac{\mathcal{L}[f(t)(\mathbb{1}(t) - \mathbb{1}(t-T))](s)}{1 - e^{-sT}}$$



Výsledky

Úloha 1: (a) $\frac{2}{(s+i)^3}$

(b) $\frac{2e^{-3s}}{s^3}$

(c) $(\frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s})e^{-3s}$

(d) $\frac{s}{s^2+4}e^{-\frac{\pi}{4}s}$

(e) $s^3H(s) - 2s^2 - 3$

(f) $\frac{2is}{(s^2-1)^2}$

Úloha 2: $f(t) = e^{4t}(\mathbb{1}(t) - \mathbb{1}(t - \frac{\pi}{6})) + 2(\mathbb{1}(t - \frac{\pi}{6}) - \mathbb{1}(t - \frac{\pi}{5})) + \cos(2t)\mathbb{1}(t - \frac{\pi}{4})$

$$F(s) = \frac{1-e^{-\frac{\pi}{6}s+\frac{2\pi}{3}}}{s-4} + 2\frac{e^{-\frac{\pi}{6}s}-e^{-\frac{\pi}{5}s}}{s} - \frac{2}{s^2+4}e^{-\frac{\pi}{4}s}$$

Úloha 3: (a) $Y(s) = \frac{3}{s(s^2+2s-1)} + \frac{2-s}{s^2+2s-1} = \frac{-s^2+2s+3}{s(s^2+2s-1)}$

(b) $Y(s) = \frac{s^4}{(s+1)(s^6+6)} - \frac{2s^4}{s^6+6} = \frac{-2s^5-s^4}{(s+1)(s^6+6)}$

Úloha 4: (a) $y(t) = e^{-2t} - (t+1)e^{-3t}$

(b) $y(t) = \frac{5t-4}{25}e^{-t} + \frac{4}{25}e^{4t}$

Úloha 5: (a) $f(t) = \frac{(t-5)^3}{6}\mathbb{1}(t-5)$

(b) $f(t) = (t-3)e^{i(t-3)}\mathbb{1}(t-3)$

Úloha 6: (a) $F(s) = \frac{1}{1-e^{-\frac{3\pi}{4}s}}(\frac{s}{s^2+1}e^{-\frac{\pi}{4}s} + \frac{1}{s^2+1}e^{-\frac{3\pi}{4}s})$

(b) $F(s) = \frac{1}{1-e^{-5s}}(\frac{1-e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-2s+4i}-e^{-4s+8i}}{s-2i})$

Úloha 7: $y(t) = \frac{4}{9}e^{-2t} + (\frac{5}{9} + \frac{t}{3})e^t$

Úloha 8: $y(t) = \frac{7}{16}e^t + \frac{9(4t+1)}{16}e^{-3t}$