

## DERIVACE FUNKCE

**1.** Nalezněte  $A, B \in \mathbf{R}$  tak, aby na  $\mathbf{R}$  platil vztah

$$\left( A + x - \operatorname{arctg} x + \left( \frac{1}{2}(1+x^2) \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}x \right) \cdot (\log(1+x^2) - 1) \right)' = (Ax+B) \cdot (\operatorname{arctg} x) \cdot \log(1+x^2).$$

**2.** Nalezněte  $A \in \mathbf{R}$  takové, aby pro každé  $x \in (0, \infty)$  platil vztah

$$\left( \log(\cos^2 x + \sqrt{1+\cos^4 x}) + \operatorname{arctg} x + \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) \right)' = A \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^4 x}}.$$

U následujících funkcí spočtěte derivace (i jednostranné, pokud neexistuje oboustranná).

**3.**  $\arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$

**4.**  $x^2 \exp(-|x-1|)$

**5.**  $\frac{\sin x}{\sin(x+\frac{\pi}{4})}$

**6.**  $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg}(\operatorname{tg}^2 x) & \text{pro } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ \frac{\pi}{2} & \text{pro } x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}; \end{cases}$

**7.**  $f(x) = \max\{\min\{\cos x, \frac{1}{2}\}, -\frac{1}{2}\}$

**8.**  $f(x) = \sqrt{1-e^{-x^2}}$

**9.**  $f(x) = \arccos \frac{1}{1+x^2}$

**10.**  $f(x) = \begin{cases} x^2(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}) & \text{pro } x \neq 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0; \end{cases}$

**11.**  $f(x) = x^{(x^x)}$  pro  $x > 0$

**12.**  $f(x) = \max\{x + 4 \operatorname{arctg}(\sin x), x\}$

### NĚKTERÉ VÝSLEDKY A NÁVODY

**1.**  $A = 1, B = 0$

**2.**  $A = -1$

**3.**  $f'(x) = \frac{2 \operatorname{sgn} x}{1+x^2}, x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}; f'_+(0) = 2, f'_{-}(0) = -2$

**7.** Pro funkci  $f$  platí

$$f(x) = \begin{cases} -1/2, & x \in \langle 2\pi/3, 4\pi/3 \rangle + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}, \\ \cos x, & x \in ((\pi/3, 2\pi/3) \cup (4\pi/3, 5\pi/3)) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}, \\ 1/2, & x \in \langle -\pi/3, \pi/3 \rangle + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Z předchozího vyjádření vyplývá, že

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi/3, \pi/3) + k\pi, k \in \mathbf{Z}, \\ -\sin x, & x \in (\pi/3, 2\pi/3) + k\pi, k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Funkce  $f$  je spojitá na  $\mathbf{R}$  a proto můžeme podle z předchozího vyjádření vypočítat jednostranné derivace jako příslušné limity derivací:

$$f'_+(\pi/3 + 2k\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi/3 + 2k\pi+} -\sin x = -\sin(\pi/3 + 2k\pi) = -\sqrt{3}/2,$$

$$f'_-(\pi/3 + 2k\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi/3 + 2k\pi-} 0 = 0,$$

$$f'_+(2\pi/3 + 2k\pi) = 0,$$

$$f'_-(2\pi/3 + 2k\pi) = -\sin(2\pi/3 + 2k\pi) = -\sqrt{3}/2,$$

$$f'_+(4\pi/3 + 2k\pi) = -\sin(4\pi/3 + 2k\pi) = \sqrt{3}/2,$$

$$f'_-(4\pi/3 + 2k\pi) = 0,$$

$$f'_+(5\pi/3 + 2k\pi) = 0,$$

$$f'_-(5\pi/3 + 2k\pi) = -\sin(5\pi/3 + 2k\pi) = \sqrt{3}/2, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

**8.** Zřejmě  $\mathcal{D}(f) = \mathbf{R}$ . Platí  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$  pro  $x > 0$ . Vzhledem k tomu, že  $1 - e^{-x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ , tak pro každé  $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$  máme

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{e^{-x^2} 2x}{\sqrt{1-e^{-x^2}}} = e^{-x^2} \frac{x}{\sqrt{1-e^{-x^2}}}.$$

V bodě 0 počítejme derivaci funkce  $f$  podle definice:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x}.$$

Výpočet poslední limity provedeme nejprve zprava a pak zleva.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{\frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2}}$$

Uvědomme si, že

- $\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{e^y - 1}{y} = 1$ ,
- $\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 = 0$ ,
- $-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ,
- $\sqrt{\cdot}$  je spojitá na svém definičním oboru.

Z věty o limitě složené funkce, (1), (2) a (3) plyne  $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2} = 1$ . Odtud, z (4) a věty o limitě složené funkce obdržíme

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{\frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2}} = 1.$$

Obdobně dostaneme

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} -\sqrt{\frac{e^{-x^2} - 1}{-x^2}} = -1.$$

Derivace funkce  $f$  v bodě 0 tedy neexistuje. Platí totiž  $f'_+(0) = 1$ ,  $f'_-(0) = -1$ .

**9.** Zkoumaná funkce je definována na celém  $\mathbf{R}$  a je na  $\mathbf{R}$  spojitá. Je-li  $x \neq 0$ , můžeme  $f'(x)$  vypočítat pomocí věty o derivaci složené funkce:

$$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{1}{(1+x^2)^2}}} \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2 \operatorname{sgn} x}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}}.$$

V 0 vypočítáme jednostranné derivace pomocí limity derivace (předpoklady příslušné věty jsou splněny):

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \operatorname{sgn} x}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}} = \sqrt{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{2 \operatorname{sgn} x}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}} = -\sqrt{2}.$$

V 0 tedy derivace neexistuje.

**10.** Pro  $x \neq 0$  platí

$$f'(x) = 2x \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) + x^2 \left( -\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} \right).$$

Tento vztah vyplývá z věty o aritmetice derivací a věty o derivaci složené funkce. V bodě 0 počítejme derivaci z definice, tj. počítejme limitu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) = 0,$$

neboť  $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$  a funkce  $x \mapsto (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x})$  je omezená na jistém prstencovém okolí bodu 0. Platí tedy  $f'(0) = 0$ .

**11.** Spočtěme nejprve

$$(x^x)' = (e^{x \log x})' = e^{x \log x} \left( 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} \right) = x^x (\log x + 1), \quad x > 0.$$

Pak dostáváme

$$\begin{aligned} (x^{(x^x)})' &= (e^{x^x \log x})' = e^{x^x \log x} ((x^x)' \cdot \log x + x^x \cdot \frac{1}{x}) \\ &= x^{(x^x)} (x^x (\log x + 1) \log x + x^{x-1}), \quad x > 0. \end{aligned}$$

Při výpočtech jsme využili větu o derivaci složené funkce, větu o derivaci součinu a faktu, že derivované funkce mají ve svých definičních oborech vlastní derivace.

**12.** Pro hodnoty funkce  $f$  platí

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 \operatorname{arctg}(\sin x), & x \in (2k\pi, (2k+1)\pi), k \in \mathbf{Z}, \\ x, & x \in ((2k+1)\pi, (2k+2)\pi), k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Odtud již můžeme vypočítat hodnotu derivace všude mimo body ve tvaru  $k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ :

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 4 \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}, & x \in (2k\pi, (2k+1)\pi), k \in \mathbf{Z}, \\ 1, & x \in ((2k+1)\pi, (2k+2)\pi), k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Funkce  $f$  je na  $\mathbf{R}$  spojitá a jednostranné derivace v bodech  $k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ , lze tedy počítat pomocí limit derivací:

$$\begin{aligned} f'_+(2k\pi) &= \lim_{x \rightarrow 2k\pi+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi+} \left( 1 + 4 \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} \right) = 5, \\ f'_-(2k\pi) &= \lim_{x \rightarrow 2k\pi-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi-} 1 = 1, \\ f'_-((2k+1)\pi) &= \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi-} \left( 1 + 4 \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} \right) = -3, \\ f'_+((2k+1)\pi) &= \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow (2k+1)\pi+} 1 = 1. \end{aligned}$$

Z výše uvedeného vyplývá, že funkce  $f$  v bodech tvaru  $k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ , nemá derivaci.