

IX. Množiny

Shrnutí teorie.

Definice. (Základní pojmy) Bud' $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je *vnitřním bodem* množiny M , jestliže existuje $r > 0$ takové, že $B(\mathbf{x}, r) \subset M$. Množina M se nazve *otevřená* (v \mathbb{R}^n), jestliže je každý její bod zároveň vnitřním bodem. *Vnitřkem* množiny M rozumíme množinu všech vnitřních bodů množiny M , značíme ji $\text{Int } M$ (interior).

Řekneme, že $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je *hraničním bodem* množiny M , jestliže pro každé $r > 0$ platí

$$B(\mathbf{x}, r) \cap M \neq \emptyset \quad \text{a} \quad B(\mathbf{x}, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset.$$

(Body, které jsou uvnitř množiny M splňují první podmínku automaticky a druhou podmínku ihned splňují body mimo množinu M .) *Hranicí* množiny M rozumíme množinu jejich hraničních bodů, značíme ji $H(M)$. *Uzávěrem* množiny M rozumíme množinu $M \cup H(M)$, značíme ji \overline{M} . Nakonec říkáme, že množina M je *uzavřená* (v \mathbb{R}^n), jestliže $H(M) \subset M$.

Prototypy v \mathbb{R}^1 : Množina $[0, 1]$ je uzavřená, $(0, 1)$ je otevřená a $[0, 1)$ není ani jedno.

Tvrzení. (Charakterizace uzavřených množin) Bud' $M \subset \mathbb{R}^n$. Pak je ekvivalentní:

- Množina M je uzavřená.
- Množina $\mathbb{R}^n \setminus M$ je otevřená.
- Pokud posloupnost $\{\mathbf{x}_n\}_n \subset M$ konverguje k \mathbf{x} , pak $\mathbf{x} \in M$.

Tvrzení. (Vlastnosti otevřených a uzavřených množin)

- Prázdná množina a \mathbb{R}^n jsou jediné množiny v \mathbb{R}^n , které jsou otevřené a uzavřené zároveň.
- Libovolné sjednocení/průnik otevřených/uzavřených množin je otevřená/uzavřená množina.
- Konečné sjednocení/průnik uzavřených/otevřených množin je uzavřená/otevřená množina.

Tvrzení. (Triviální a snadná pozorování) Bud' $M \subset N \subset \mathbb{R}^n$. Potom platí:

- Množina $\text{Int } M$ je otevřená, $\text{Int } M \subset M$ a $\text{Int } M \subset \text{Int } N$.
- Množina \overline{M} je uzavřená, $M \subset \overline{M}$ a $\overline{M} \subset \overline{N}$.
- $H(M) = H(\mathbb{R}^n \setminus M)$.
- $H(M) \cap \text{Int } M = \emptyset$.
- $\mathbb{R}^n = \text{Int } M \cup H(M) \cup \text{Int } (\mathbb{R}^n \setminus M)$.
- Množina M je otevřená právě tehdy, když $M = \text{Int } M$.
- Množina M je uzavřená právě tehdy, když $M = \overline{M}$.

Prakticky budeme často pracovat s tzv. úrovněmi množinami.

Tvrzení. (Úrovně množiny) Bud' f spojitá funkce na \mathbb{R}^n a $c \in \mathbb{R}$. Potom platí:

- Množiny $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$ a $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) > c\}$ jsou otevřené.
- Množiny $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\}$ a $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}$ jsou uzavřené.
- Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\}$ je uzavřená.

Pozn. (Kuchařka na určení hranice úrovnových množin). *Uvažujme spojitou $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ a*

$$\mathbb{R}^n = \{f < 1\} \cup \{f = 1\} \cup \{f > 1\} =: A \cup B \cup C.$$

Řekněme, že chceme určit vnitřek, uzávěr a hranici množiny A . Potřebujeme vědět, že

$$H(M) \cap \text{Int } M = \emptyset \quad \text{a} \quad H(M) = H(\mathbb{R}^n \setminus M), \quad M \subset \mathbb{R}^n.$$

Předpokládejme, že $B \subset H(A)$. Platí $H(A) = H(\mathbb{R}^n \setminus A) = H(B \cup C)$. Díky spojitosti f je množina A otevřená a rovná se svému vnitřku, tj. $A \cap H(A) = \emptyset$.

Jelikož C je tedy také otevřená a $B \subset H(B \cup C)$, tak nutně $B \cap \text{Int}(B \cup C) = \emptyset$, a tedy $\text{Int}(B \cup C) = C$. Tedy $\emptyset = \text{Int}(B \cup C) \cap H(B \cup C) = C \cap H(A)$. To říká, že žádný bod z A, C neleží v hranici. Celkem tedy získáváme, že $B = H(A) = H(B \cup C) = H(C)$ a $\overline{A} = A \cup B$.

Příklad 1. [Elementární] Rozhodněte zda jsou zadané množiny otevřené či uzavřené. Najděte jejich vnitřek, uzávěr a hranici.

- | | |
|---|--|
| (a) $M = \{\mathbf{x}\}$, kde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je daný. | (h) $M = (-\infty, +\infty) \subset \mathbb{R}$. |
| (b) $M \subset \mathbb{R}^n$ neprázdná a konečná. | (i) $M = \mathbb{N}$. |
| (c) $M = (0, 1) \subset \mathbb{R}$. | (j) $M = \mathbb{Q}$. |
| (d) $M = [0, 1] \subset \mathbb{R}$. | (k) $M = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. |
| (e) $M = [0, 1) \subset \mathbb{R}$. | (l) $M = \{\frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$. |
| (f) $M = (0, +\infty) \subset \mathbb{R}$. | (m) $M = \{[\frac{1}{n}, 0]; n \in \mathbb{N}\}$. |
| (g) $M = [0, +\infty) \subset \mathbb{R}$. | (n) $M = \{[\frac{1}{n}, 0]; n \in \mathbb{N}\} \cup \{[0, 0]\}$. |

Příklad 2. [Úrovnňové množiny] Rozhodněte zda jsou zadané množiny otevřené či uzavřené. Najděte jejich vnitřek, uzávěr a hranici.

- (a) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x > 0, y \leq 0\}$.
 (b) $M =$ jednotková kružnice v \mathbb{R}^2 .
 (c) $M =$ jednotková kružnice v \mathbb{R}^2 bez bodu $[1, 0]$.
 (d) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} < 1\}$.
 (e) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \geq 9\}$.
 (f) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + e^y > 17\}$.
 (g) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 + 2xy = 5\}$.
 (h) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; |x - y| = x - y\}$.
 (i) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; |x + y| > x + y\}$.
 (j) $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x \geq 0, y > 0, x + y = 2, z \leq 0\}$.

Příklad 3. Rozhodněte zda jsou zadané množiny otevřené či uzavřené. Najděte jejich vnitřek, hranici a uzávěr. Množiny načrtněte.

- (a) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 < x^2 + y^2 < 4\}$.
 (b) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x < y < x + 3\}$.
 (c) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 \leq y \leq x^2 + 1\}$.
 (d) $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; |x| > 1\}$.
 (e) $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, x^2 + z^2 = 1\}$.
 (f) $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 1\}$.
 (g) $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = z\}$.
 (h) $M = \{[t, t, -t] \in \mathbb{R}^3; t \in \mathbb{R}\}$.

Příklad 4.

(a) Najděte $A, B \subset \mathbb{R}$, aby $\text{Int}(A \cup B) \neq \text{Int} A \cup \text{Int} B$.
 (b) Najděte $A, B \subset \mathbb{R}$, aby $H(A \cup B) \neq H(A) \cup H(B)$.
 (c) Najděte $A, B \subset \mathbb{R}$, aby $\overline{A \cap B} \neq \overline{A} \cap \overline{B}$.
 (d) Bud' $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Ukažte, že $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
 (e) Bud' $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Ukažte, že $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
 (f) Bud' $A \subset \mathbb{R}^n$. Ukažte, že $\mathbb{R}^n \setminus \text{Int}(\mathbb{R}^n \setminus A) = \overline{A}$ (a tedy také $\mathbb{R}^n \setminus \overline{A} = \text{Int}(\mathbb{R}^n \setminus A)$).
 (g) Bud' $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Ukažte, že $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int} A \cap \text{Int} B$.
 (h) Bud' $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Ukažte, že $\text{Int}(A \cup B) \supset \text{Int} A \cup \text{Int} B$.
 (i) Najděte funkci f , aby pro nějaké $c \in \mathbb{R}$ byla množina $\{x \in \mathbb{R}; f(x) = c\}$ otevřená.
 (j) Najděte spojitou funkci f , aby pro nějaké $c \in \mathbb{R}$ byla množina $\{x \in \mathbb{R}; f(x) > c\}$ prázdná a zároveň $\{x \in \mathbb{R}; f(x) = c\}$ neprázdná. K určení hraničních bodů tedy nepostačuje pouze zkoumat rovnost namísto nerovnosti.
 (k) Najděte spojitou funkci f na $[1, +\infty)$, aby byla množina $\{f(x); x \geq 1\}$ jednobodová. Spojitý obraz neomezené množiny tedy může být omezená (a uzavřená) množina.

Výsledky - VIII. Uzavřené a otevřené množiny

Příklad 1. [Elementární]

- (a) M je uzavřená a není otevřená. Vnitřek je prázdný a $H(M) = M$.
- (b) M je uzavřená a není otevřená. Vnitřek je prázdný a $H(M) = M$.
- (c) M je otevřená a není uzavřená. Hranice je $\{0, 1\}$, $\overline{M} = [0, 1]$.
- (d) M je uzavřená a není otevřená. Hranice je $\{0, 1\}$, $\text{Int } M = (0, 1)$.
- (e) M není ani otevřená, ani uzavřená. A $\overline{M} = [0, 1]$, $\text{Int } M = (0, 1)$.
- (f) M je otevřená a není uzavřená, $\overline{M} = [0, +\infty)$.
- (g) M je uzavřená a není otevřená, $\text{Int } M = (0, +\infty)$, $H(M) = \{0\}$.
- (h) M je otevřená, i uzavřená, hranice je prázdná.
- (i) M je uzavřená a není otevřená, $H(M) = M$, $\text{Int } M = \emptyset$.
- (j) M není ani uzavřená, ani otevřená. Vnitřek je prázdný a uzávěr je celý prostor.
- (k) M není ani uzavřená, ani otevřená. Vnitřek je prázdný a uzávěr je celý prostor.
- (l) M není ani uzavřená, ani otevřená, $H(M) = M \cup \{0\} = \overline{M}$ a $\text{Int } M = \emptyset$.
- (m) M není ani uzavřená, ani otevřená, $H(M) = M \cup \{[0, 0]\} = \overline{M}$ a $\text{Int } M = \emptyset$.
- (n) M je uzavřená a není otevřená, $H(M) = M = \overline{M}$ a $\text{Int } M = \emptyset$.

Příklad 2. [Úrovnňové množiny]

- (a) Není ani otevřená, $\text{Int } M = \{x > 0, y < 0\}$, $H(M) = \{x = 0 \text{ nebo } y = 0\}$.
- (b) M je uzavřená a není otevřená, $\text{Int } M = \emptyset$, $H(M) = M$.
- (c) M není uzavřená ani otevřená, $\text{Int } M = \emptyset$, $H(M) = M \cup \{[1, 0]\}$.
- (d) M je otevřená, $\text{Int } M = M$, $H(M) = \{x^2 + y^2 = 1\}$.
- (e) M je uzavřená, $\text{Int } M = \{x^2 + y^2 > 9\}$, $H(M) = \{x^2 + y^2 = 9\}$.
- (f) M je otevřená, $\text{Int } M = M$, $H(M) = \{x^2 + e^y = 17\}$.
- (g) M je uzavřená, $\text{Int } M = \emptyset$, $H(M) = M$.
- (h) M je uzavřená, $\text{Int } M = \{x > y\}$, $H(M) = \{x = y\}$.
- (i) M je otevřená, $\text{Int } M = \{x + y < 0\}$, $H(M) = \{x + y = 0\}$.
- (j) M není uzavřená ani otevřená, $\text{Int } M = \emptyset$, $H(M) = \{x \geq 0, y \geq 0, z \leq 0, y = 2 - x\}$.

Příklad 3.

- (a) M je otevřená, $H(M) = \{x^2 + y^2 = 4\} \cup \{x^2 + y^2 = 1\}$. Jedná se o mezikružší.
- (b) M je otevřená, $H(M) = \{x - y = 0\} \cup \{-x + y = 3\}$. Jedná se o prostor mezi dvěma přímkami.
- (c) M je uzavřená, $H(M) = \{y = x^2\} \cup \{y = x^2 + 1\}$, $\text{Int } M = \{x^2 < y < x^2 + 1\}$. Jedná se o prostor mezi dvěma parabolami.
- (d) M je otevřená, $H(M) = \{|x| = 1\}$. Jedná se o dvě oddělené poloroviny.
- (e) M je uzavřená, $H(M) = M$, $\text{Int } M = \emptyset$. Jedná se o průnik dvou válcových ploch.
- (f) M je uzavřená, $H(M) = \{x^2 + y^2 = 1 \text{ nebo } x^2 + z^2 = 1\}$, $\text{Int } M = \{x^2 + y^2 < 1, x^2 + z^2 < 1\}$. Jedná se o průnik dvou (nekonečných) válců.
- (g) M je uzavřená, $H(M) = M$, $\text{Int } M = \emptyset$. Jedná se o plášť rotačního paraboloidu.
- (h) M je uzavřená, $H(M) = M$, $\text{Int } M = \emptyset$. Jedná se o přímku.

Příklad 4.

- (a) Kreslete.
- (b) Kreslete.
- (c) Kreslete.
- (d) Uzávěr zachovává uspořádání množin a uzávěr uzavřené množiny je množina.

- (e) Uzávěr zachovává uspořádání množin.
- (f) Doplněk otevřené je uzavřená a naopak. Interior zachovává uspořádání množina a interior otevřené množiny je množina.
- (g) Použijte vhodně (f), De Morganovy vzorce a (d).
- (h) Interior zachovává uspořádání množin. Interior množiny je největší otevřená množina obsažená v dané množině.
- (i) Typická nespojitá funkce.
- (j) Hodnota maxima.
- (k) $\frac{x}{|x|}$.